

May (S.) No. 178/9

STIRPIUM EUROPÆARUM
EXTRA
BRITANNIAS
NASCENTIUM
SYLLOGE.

QUAS

Partim observavit ipse, partim è *Car. Clusii*
Historia, *C. Bauhini Prod. & Cat. Bas. F. Columnæ*
Ecphrasi, *Catalogis Hollandicar. A. Commelini*,
Altorfinarum M. Hofmanni, *Sicularum P. Boc-*
coni, *Monspeliensium P. Magnoli* Collegit

JOANNES RAIUS.

ADJICIUNTUR

Catalogi rariorum Alpinarum & Pyrenaicarum,
Baldensium, *Hispanicarum Grisei*, *Græcarum*
& Orientalium, *Creticarum*, *Ægyptiacarum*
aliique: Ab eodem.

Martii 27.
1694.

Imprimatur.

Rob. Southwell, R. S. P.

LONDINI:

Prostant apud *Sam. Smith & Benj. Walford*,
Societatis Regiæ Typographos, ad *Insignia Principis*
in *Cœmeterio D. Pauli*. MDCXCIV.

10



Joannes Rayus
Societatis Regiae Socius



Jos: Banks

GENEROSISSIMO VIRO

Amico plurimum honorando

D. EDUARDO BULLOCK, Arm.

JOANNES RAIUS, D. D. D.

CUM Illustrissimo Parenti tuo multis nominibus obnoxius fuerim obpropensum in me animum, perpetuamque & non vulgarem benevolentiam, plurimis quibus immerentem cumulare dignatus est beneficiis testatam, tristissimo obitu ejus nuncio accepto, justo dolori effusis habenis liberiùs indulsi, meamque in illius fato jaeturam veris lachrymis deflevi. Quidni enim id facerem, Amico tanto ac tali orbatus,

cui Pudor, & Justitiæ soror
Incorrupta Fides, nudaque Veritas
Quando ullum invenient parem?

Verum cum Te Paterna virtutis heredem,
omnibusque Naturæ & Fortuna bonis dotatum,
non minus benevolum expertus sim, magnum

D E D I C A T I O.

*inde levamen mens agra sensit, Patrémque in
 Filio vel superstitem, vel redivivum, velut
 in speculo quodam intueri visus sum, & Ami-
 cum non tam amissum quàm mutatum agnovi.
 Hujus gaudii quin alios participes facerem,
 tuumque Favorem & Amicitiam quanti aesti-
 mem publice testarer, mihimet temperare non
 potui. Opportunitatem autem id agendi cir-
 cumspicienti non alia commodior occurrit quàm
 presentis Operis editio; quòd Tibi eo animo
 nuncupatum benevolè acceptes oro, nec ob Ar-
 gumenti ignobilitatem asperneris; cùm &
 Magnates & ipsi etiam Principes Botanices
 Professores publicis stipendiis honoraverint,
 quin & eorum nonnulli, cùm à gravioribus
 curis vacaret, stirpibus contemplandis animum
 oblectare soliti sint; alii iis exquirendis ope-
 ram dare, specièsque à se observatas nominibus
 suis cohonestare dignati; plantis vicissim mu-
 tuum cum fœnore reddentibus, nominibus im-
 positis ad posteros transmissis, salutaris & hu-
 manæ Vitæ utilis inventi honore auctis: ali-
 quos etiam earundem culturam Sceptrorum mo-
 deramini & Dignitati imperiali prætulisse legi-
 mus. Tu verò non tantum ut libello huic pa-
 trocinari digneris orandus es, sed præcipuè ut
 eximium ingenii acumen, quod in Te omnes
 mirantur, non rude illud & incultum, sed in-
 genuis disciplinis elimatum & perpolitum, sir-
 gularem in literis præsertim humanioribus eru-
 ditionem,*

DEDICATIO.

ditionem, raram in ætate juventutem vixdum egressa Prudentiam, ceterasque quibus excellis dotes, difficillimis hisce Temporibus Patriæ impendas ejusque negotia diligenter procures, & commodis studiosè invigiles. Quo factò facilem Tibi ad immortalitatem viam sternes, verumque honorem, hoc est, consentientem bonorum omnium laudem, præmium virtuti debitum, generosis animis naturæ instinctu tantopere expetitur promereberis. Vale.



PRÆFATIO.

Postquam plantarum aliarumque rerum naturalium exquirendi studio maximam Angliæ partem crebris itineribus peragrâssem, Regiones etiam peregrinas invifendi cupido animum meum incesfit, ut quæ ibi nova, & nostris terris incognita nascerentur investigarem: cui ut obsecundarem, itinere Anno *Æra Christiana* 1663. inchoato, & per triennium continuato, *Belgii, Germaniæ, Italiæ, Sicilia, Galliæ* bonam partem obivi & perlustravi. Cujus itineris quis fructus fuerit *Catalogo Stirpium in transmarinis Regionibus* à me observatarum, quæ in *Britannia* nostra vel planè hospites sunt, vel rariùs occurrunt spontanæ Anno 1673. edito Lectorem certiore feci.

Hujusce Catalogi cùm exemplaria omnia jamdudum divendita sunt, cùmque animadverterem iis in locis per quæ iter feci, ob celerem transitum, & moram inibi brevissimam, plurimas species à me præteritas & invisas, quæ in Catalogis *Hollandicarum Jo. Commelini, Altdorfinarum Maur. Hoffmanni,*

P R Æ F A T I O.

manni, Basileensium *C. Bauhini*, Sicularum *Pauli Bocconi*, Monspeliacarum *Pet. Magnoli* habentur, has nostris adjiciendas duxi, & ex omnibus unum Catalogum componendum. Verùm his non contentus ἐργαδιώχτης, & Amicus noster in paucis charus, *D. Tancredus Robinson* ad complendam enumerationem & recensitionem plantarum omnium, quæ intra gyrum peregrinationis nostræ hæctenus à quoquam observatæ & inventæ fuisse, ut species illas quæ adhuc desiderabantur è Clarissimorum Virorum *Caroli Clusii Historia stirpium rariorum*; *Casp. Bauhini Prodro-mo Theat. Bot.* *Fabii Columnæ Minus cognitarum Stirpium Ecphrasi* exciperem & suis locis infererem, mihi Auctor fuit. Cùmque huc usque progressum esset, Amicus idem ut opus hoc latiùs extenderetur ad plerasque omnes plantas præter *Indicas & Americanas* complectendum, privatos *Stirpium rariorum Hispanicarum, Lusitanicarum, Græcarum & Orientalium, Creticarum, Baldensium, Alpinarum & Pyrenaicarum, Agri Romani & Parisini*, Catalogos ut adjicerem suavit & suadendo vicit.

Dices, Quis usus est hujusce operis? quid indè fructûs & emolumentum ad Lectorem redundabit? Nimirum ut sciant, qui iisdem in locis per quæ nos iter fecimus in posterum plantas indagabunt, quas in quibusque

P R Æ F A T I O.

busque species se inventuros expectent, & ut excitentur ad eas diligentius perquirendas, & ad enitendum ne qua species ab aliis observata eorum industriam effugiat. Quòd si in incognitam aliquam, nec sibi antea visam stirpem inciderint, absque difficili scrutinio & fastidiosa plurium librorum evolutione, Catalogum percurrento, ex synonymis & locis additis facillè colligent, an ab aliis antea observata & descripta fuerit, an præterita & omissa, fortè etiam nova & nondum edita sit: adeoque magnum temporis & operæ compendium facient, deque speciebus quas invenerint certiores reddentur à quibus Autoribus, quibúsque nominibus traditæ fuerint. Quin & exercitatoribus magisque versatis in re Botanica, non omnino inutile futurum spero ad memoriam refricandam, & ad ideas specierum fere oblitæ revocandas & ad eas altiùs imprimendas, quæ aliàs vel fortè exciderent, vel diuturnitate temporis evanescerent & obliterarentur.

Catalogi stirpium rariorum *Hispanicarum*, *Lusitanicarum*, *Creticarum*, *Orientalium* in quo etiam *Græcas* complectimur, & *Ægypticarum*, eosdem usus præstabunt, iis qui in regionibus istis peregrinabuntur: quâlibet enim plantâ vel inventâ vel oblatâ, ex synonymis & locis additis an catalogis comprehensâ sit, an nova & indicta probabili saltem conjectura colligent.

Quam-

P R Æ F A T I O.

Quamvis in hisce Catalogis Alphabetico ordine plantas disposuerim, liceat tamen mihi occasione Operis egregii à D. *Augusto Quirino Rivino*, Physiologiæ in *Academia Lipsiensi* Professore, *Introductionis generalis in rem herbariam* titulo, non ita pridem editi, cujus exemplaris pergrato munere me sibi devinctum voluit Celeberrimus Auctor, de Methodo pauca præfari. *Rivini* equidem Opus vehementer laudo, ob curiosè ab Autore observatas & adnotatas florum differentias, ob aptam earundem ad genera constituenda distributionem, ob brevitatem cum perspicuitate conjunctam, ob Latini Sermonis puritatem, ob iconum denique pulchritudinem & exactam cum Archetypis convenientiam. Verùm ignoscet mihi eruditissimus Vir, si ut est ingenium hominum, meæ nimis dispositioni indulgens, eam ut naturis Stirpium magis consentaneam *Riviniæ* præferendam putem. Cùm meam dico, generalem intelligo Herbarum, in eas quarum plantula seminalis vel binis foliis anomalis donatur, vel iisdem caret: harum deinde in tria genera, 1. Earum quæ flore sunt apetalo stamineove. 2. Earum quæ flore sunt petalode, semine nudo, hoc est nullo præter perianthium vasculo incluso aut excepto. 3. Earum quæ flore sunt petalode, semine autem vasculo aliquo præter perianthium tutato.

D. *Rivini*

P R Æ F A T I O.

D. Rivini methodum minùs probo,
I. Quod Distinctionem illam Plantarum generalem in *Arbores* & *Herbas* passim receptam & tot seculorum usu approbatam tollat; *Introductionis* pag. 16. Propterea, inquit, nec mihi religio est, *Arbores*, *Fruticésque* unà cum *Herbis* reducere ad idem genus, si modo naturali conveniunt *Charactere*, &c. Quamvis enim quadrimembrem illam Plantarum divisionem in *Arbores*, *Frutices*, *Suffrutices* & *Herbas* rejiciam, *Fruticésque Arboribus*, *Suffrutices Herbis* adnumerandas putem, quod nullas adhuc certas & characteristicas notas quibus distinguantur hæc genera observaverim; Bimembrem tamen in *Arbores* & *Herbas*, quam & meipsum olim re non satis perpensa respuisse fateor non possum non probare & amplecti, cum inter eas detur sufficiens distinctionis nota, nimirum quòd *Arbores* gemmiparæ sunt, *Herbæ* autem minimè. *Gemma* dicuntur Arborum aut Fruticum fœtus novelli, seu tenelli surculi cum futurorum foliorum inchoamentis, squamosis tegumentis ceu secundis obvoluti, in quibus per hyemem latitant, adversus aeris injurias securi, verèque novo in lucem & conspectum prodeunt. *Arbores* enim omnes aliquo sensu annuæ plantæ dici possunt, cum unicuique nova quotannis ligni tunica superinducatur, quæ vera sequentis

P R Æ F A T I O.

quentis anni arbor est. Hæc enim gemmas æstate concipit, in quibus veluti totidem uteris formantur furculi, tum floriferi, tum foliosi. [Flores namque, non secus quàm reliquæ furculorum partes cum seminum, fructuumve rudimentis intus contentis, tribus aut quatuor mensibus, & interdum etiam dimidio anno aut amplius formantur, antequam in lucem edantur & explicentur.] Hos deinde Arbor quam diximus annua vere & æstate sequenti explicat & ad maturitatem demum perducit: quo factò reliquum vitæ suæ infæcundum transigit, una cum veteri ligno novæ tunicæ sustinendæ inserviens. Quæcunque ergo stirpes hoc modo nova ligni tegumenta quotannis induunt, gemmâsque concipiunt, per hyemem retinent, & sequenti vere explicant, *Arbores* nobis dicuntur, reliquæ omnes *Herbæ*.

Dices, unanimi Botanicorum hujus sæculi consensu ratum esse, notas plantarum characteristics generum discretivas, & species constitutivas, à floribus & fructuum convenientiis & differentiis sumi debere: Hoc autem modo si divides, Plantæ flore, fructu, foliis, convenientes sub diversis generibus disponentur; ut v. g. *Sambucus* & *Ebulus*: *Malva arborea* & *herbacea*; *Pentaphylloides* & *Pentaphyllum*; aliæque plurimæ.

Respon-

P R Æ F A T I O.

Respondeo, me notas hasce à Flore & Fructu desumptas ad Genera subalterna discriminanda utiles esse concedere : primarias autem Plantarum divisiones, à toto earundem habitu & constitutione, aut insigni aliqua proprietate potius desumendas esse existimo, unde & ligneam etiam substantiam pro Nota admitto. Nec mihi valde absurdum aut inconueniens videtur, si sub utroque genere summo *Arboris* & *Herbæ*, subalterna nonnulla cognata inveniuntur, ut v. g. *Malva arborescens* sub Arbore, *herbacea* sub Herba, &c.

Quin & interdum ad genera etiam subalterna constituenda hujusmodi notas iis præferendas existimo quæ à floribus aut fructu desumuntur : Sic *Anemonem nemorosam*, Nemo non (ut opinor) Botanicus naturæ consultus, ob caulem simplicem non ramosum, determinatè seu ex una tantum distinctione foliatum, unicum in summo florem nudum polypetalon gestantem ad *Anemonem*, qua cum in his convenit, potius retulerit, quàm ob solum fructûs similitudinem ad *Ranunculum*, quò à *C. Bauhino* aliisque refertur.

Qui autem *Anemonem nemorosam* *Ranunculi* speciem faciunt, cur non & *Trifolium hepaticum* *Ranunculis* annumerant, cum pari ut loquuntur modo fructificet, nec aliæ notæ repugnent ?

Secun-

P R Æ F A T I O.

Secundò, Cùm Bulbosi generis Herbx natura & constitutione adeò manifestè conveniant, ut ab omnibus tum Botanicis, tum Hortulanis pro congeneribus habeantur, non rectè, mea sententia, eas à se invicem separat & ad diversa genera refert Clariss. *Rivinus*. Bulbosæ enim nonnullæ revera & stricte loquendo hexapetalæ sunt, ut v. g. *Tulipæ*; aliæ ut *Narcissus*, monopetalæ. *Gladiolus* autem *segetum* secundùm ejus methodum duplici nomine ab aliis Bulbosis separandus est, tum quòd flore sit monopetalo, tum quòd eodem irregulari.

Nec in *bulbosis* tantùm, sed & in aliis generibus cognatas herbas distrahit. Sic in *Asperifoliarum* genere *Echium*, quamvis aliis omnibus notis, ut foliis asperis per margines æqualibus, florum spicis antequam aperiantur reflexis & revolutis, seminibus ad singulos flores quaternis, cor in summo (ut *Casalpinus* loquitur) habentibus, conveniant, ob figuram tamen floris irregularem à reliquis disjungit. *Tormentillam* quoque ob florem tetrapetalum à *Pentaphyllis* separare debet; & in Alsines genere tetrapetalas nonnullas à pentapetalis: nec video sanè quomodo *Gentianellam* flore tetrapetaloide, reliquis Gentianellis, quæ omnes flore sunt in quinque lacinias diviso, congenerem facere possit. Cur autem *Scutellariam*

P R Æ F A T I O.

tellariam à reliquis verticillatis separet idoneam me iudice rationem non habet: siquidem notis omnibus cum iis convenit, foliis in caule ex adverso binis, floribus galeatis, seminibus ad singulos flores quaternis, nullo præter perianthium vasculo inclusis; quamvis enim perianthium operculatum sit, operculi tamen labia cum perianthii marginibus non coalescunt, sed connivent tantum.

His tamen, aliisque quæ contra eam obijci possint, non obstantibus, Methodum *Rivinianam* alterâ illâ quæ Plantas *enangiospermas* à Conceptaculi feminalis partibus, aut numero cellularum in quas dividitur, in *Unicapsulares*, *Bicapsulares*, *Quadricapsulares*, *Quinquecapsulares*, &c. distinguit, potiorẽ judico. Ponamus enim *Herbas tricapsulares* distinctum genus esse, & vasculum habere in terna loculamenta divisum, notam esse essentialẽ & caracteristicam hujus generis. Hinc sequetur, multas Plantarum species, quæ ab omnibus Botanicis genere proximo convenire creduntur, genere etiam superiore differre; ut v.g. *Ascyroides Alpini* & *Hypericon montis Olympi Wheeleri* toto genere distabunt à reliquis *Hyperici* speciebus, quod scilicet quinquecapsulares sint, cum reliquis notis cum eisdem convenient. Idem dicendum de *Gos-*

P R Æ F A T I O.

fipio, cujus pleræque species tricapsulares sunt, nonnullæ quinqucapsulares. Idem de *Cisto*, quo in genere si *Chamacistum* complectaris, dantur & tricapsulares & quinqucapsulares & octocapsulares. *Papaver* autem hoc respectu mira varietate ludit. Nonnullæ enim species pro capsula filiquam habent, eamque vel simplicem seu indivisam, vel in bina, terna aut quaterna loculamenta dispartitam. *Papaveris* autem capitati tam *hortensis* quam *sylvestris* capitulum in plurimas cellulas dividitur, incerto numero, usque ad duodecim aut interdum quindecim, prout planta vegetior est aut languidior. Operculi autem stellati radii indicant numerum cellularum in quas Capitulum dividitur.

Deinde, in iis quæ ejusdem manifestè generis sunt vascula seminalia toto, quod aiunt, cælo differunt, nec ullo charactère aut nota generali conveniunt.

Sic in *Leguminosis*, seu flore Papilionaceo donatis, quæ Botanicorum omnium consensu congeneres sunt, notamq; insignem generis indicem præferunt, *florem* nimirum *papilionaceum*, vascula seminalia diversissima sunt, nec ulla communi nota seu tessera generica concordant. In aliis enim floribus singulis singulæ succedunt filiquæ, in aliis geminæ: Aliis filiquæ monospermæ sunt, aliis

P R Æ F A T I O.

aliis dispermæ, aliis polyspermæ : plerisque bivalves sunt, aliis simplices nec in valvas divisæ, ut alias differentias omittam.

Pariter, in *Tetrapetalis*, *perianthiis quadrifoliis deciduis*, quæ in eo omnes conveniunt quòd in caulis & ramorum summitatibus flores plures gestant successivè se aperi-
entes alios supra alios, nullis ad pediculorum exortum foliolis apposis; nulla è vasculis seminalibus nota generica sumi potest. Aliæ enim siliquam productiorem eamque vel membranâ intergerinâ in duobus loculamenta divisam, vel fungosam nec ulla ejusmodi membrana disseptam pro vasculo habent; Aliæ capsulam breviorē, eamque vel indivisam & monospermam, vel divisam dispermam & polyspermam.

Tandem, In genere earum quæ flore sunt composito Herbas flore planifolio naturâ pleno, lactescentes; tam papposas, quàm non papposas, seu ut *Rivinus* loquitur, flore ex flosculis irregularibus tantum composito, ob convenientiam in floribus, foliis & facie externa, necnon succo lacteo, temperamento & viribus, nos rectius, puto, ad unum & idem genus retulimus, quàm alii ob differentiam seminum solius Pappi respectu ad diversa distrahant.

Cum primam nostram Herbarum in tria summa genera divisionem, initio *Methodi*

P R Æ F A T I O.

plantarum novæ exhibitam, quorum *primum* (ut jam diximus) eas continet quæ florem habent vel nullum, vel ἀπέταλον stamineumve; *secundum* eas quæ florem quidem habent πεταλῶδη seu bracteatum, semina autem nullo præter perianthium vasculo connecta: *tertium* eas quæ & florem habent πειλαλῶδη, & vasculum seminibus continendis à natura concessum, præ posteriore illa à plantula seminali petitâ plerisque Botanicis arridere videam; dicam breviter quæ meditationes impulerint ut hanc illi substituere. Cùm animadverterem herbas bulbosas iisque affines cum Graminibus & cognatis in multis convenire, ut v. g. Foliorum texturâ internâ, externâque figurâ, ut quæ plerumque absque pediculis in longum producta essent, fibrisque constarent rectis, non ramosis, per longitudinem extensis, marginisque haberent æquales h. e. nec laciniatos neque crenatos aliòve modo incisos: deinde caulibus plerumque simplicibus seu non ramosis: tandem plantula seminali vel binis foliis lobisque donata, quæ plurimum foliorum, seminalium hortulanis nostris dictorum, specie supra terram efferuntur, interdum intra eam latitant, ut in Pisis aliisque leguminibus; vel lobis hujusmodi carente, & vel unico vel pluribus foliis succedentibus similibus emergente. Cùm, inquam, hæc animadverterem, has & genere

P R Æ F A T I O.

genere inter se convenire, & ab aliis herbis differre agnovi, proinde & unà tradendas & ab aliis separandas censui. Qua in sententia magnopere confirmabar autoritate & exemplo Celeberrimorum Botanicorum *Matthiae Lobelii* & *utriusque Bauhini*, qui & convenientiam hanc animadverterunt & tanti fecerunt, ut ejus intuitu in Historiis suis proximum post Gramina Bulbosis & congeneribus locum dederint, quantumvis præcipuam convenientiæ notam vel nescivisse, vel neglexisse videantur.

Fatendum tamen est, Præter Gramina, Bulbosas, iisque affines, alias etiam Herbas dari quæ plantulam feminalem bifoliam non habent, sed foliis succedentibus similibus è terra exeunt, ut è nobis observatis *Cyclamen*, *Paonium*, *Asparagum*, *Pseudo-phalangium Americanum* flore dipetalo; nec dubito quia plures adhuc nobis inobservatæ superiint. Ex his quæ foliis sunt nervosis, *Pseudo-phalangium*, &c. ad hoc genus propriè pertinent; reliquæ, quæ non admodum multæ sunt, pro Anomalis haberi possunt.

Herbæ hujus generis floriferæ h. e. quæ florem perfectum *πεταλῶδη* proferunt, insigni nota inter se conveniunt & ab aliis differunt; quòd nimirum tricapsulares sint, seu conceptaculum feminale in terna loculamenta divisum obtineant. Has in *Methodo* &
Historia

P R Æ F A T I O.

Historia nostra radicum respectu in Bulbo-
fas & Bulbosis affines distinxi. Receptis
enim Divisionibus adhærere, & Methodum
nostram quantum potui accommodare stu-
dui ; ideoque celebre illud & ab omnibus
agnitum *Bulbosarum* genus retinendum duxi.
Alias enim, nè Iridès bulbosas à tuberosis
aut fibrosis dirimerem satius fuisset à florum
diversitate hujus generis differentias sum-
pisse,

Reliquum Herbarum agmen in tres tur-
mas seu tria genera prædicta notis clavis &
manifestis à se invicem distincta, velut na-
tura ipsa monstrante divisi. Quæri tamen
à nonnullis fortasse potest, quomodo Flos
imperfectus seu stamineus qui perianthio &
staminibus constat, à perfecto seu petalode
certò possit dignosci. Respondeo, In iis
plantis quæ utramque partem, nimirum pe-
tala & perianthium obtinent, res est manife-
sta. Perianthium enim à petalis, quamvis
in nonnullis, ut Ranunculo, Rapistro, &c.
eiusdem coloris sit, & unà etiam decidat,
figurâ tamen, situ & usu faciliè distinguitur :
In aliis quæ altera harum partium carent
florem petalodem voco qui vel defluit, vel
marcescit antequam semen maturescit. Hinc
Plantaginis flores, de quibus aliquandiu hæsi,
pro perfectis habendas censeo, quòd ante
maturitatem seminis contrahantur & exares-
cant :

P R Æ F A T I O.

cant ; *Bistorta* è contra, *Potamogitonis angustifoliae* dictæ, *Frumenti Saracenici*, &c. flores quamvis colore petalodes simulant, quia tamen ad feminis usque maturitatem incorrupti durant, eique continendo vasculi usum præstant, imperfectis & apetalis annumerandas.

Cùm autem staminum mentio in Methodo nostra toties incidat, ostendam breviter stamina unà cum apicibus sumpta superfluum & otiosam partem non esse, sed inprimis utilem & necessariam. Primò, enim, Ratum apud me est Axioma illud, *Deus & Natura*, ordinaria Dei ministra, *nihil faciunt frustra*. 2. Quamvis aliqui, imò plurimi flores foliis illis fugacibus coloratis, quæ nos petala dicimus, carent, Apices tamen plerisque omnibus perfectioribus donantur. 3. In plantis sexu distinctis, iisque quibus flores à fructibus remoti sunt, Juli & flores fructum antevertunt, primo vere, aut saltem prima plantæ germinatione exeuntes, brevi maturescunt & pollinem suum effundentes. 4. Apices intus concavi sunt, & globulorum congeriem continent, quos per maturitatem dehiscunt effundunt. 5. In plantis nonnullis sexu distinctis, v. g. Palma dactylifera fœmina non fructificat nisi mas juxta consitus fuerit : quin & pulverem maris fœminæ aspersum eam fœcundiores reddere tradunt. Ni
enim

P R Æ F A T I O.

enim Ægyptii hoc fecerint (inquit *Prosper Alpinus*) sine dubio fæminæ vel nullos fructus ferent, vel quos ferunt non retinebunt, neque hi maturescent. Nonnullas interim tum arbores, tum herbas, fructum proferre, & ad maturitatem retinere absque mare aut masculo semine asperso non negaverim. Nam & in Avibus, quamvis pleræque absq; maris consortio ova nunquam pariant, aliquæ tamen v. g. *Gallina* absque coitu non rarò id faciunt, quamvis ova subventanea & infæcunda sint. Hinc ego illis assentiri non possum, qui Julos & nucamenta Avellanarum & Juglandium flores non esse contendunt, quoniam sc. ipsis nucibus aliquid flori simile innascitur. Nam efflorescentias illas flores genuinos esse nego, nucamenta affirmo, cum illæ apicibus careant, hæc iis donentur. Apices enim, ut diximus, floris præcipua pars sunt, cum pollinem contineant nostrâ sententiâ spermati Animalium masculo analogum, vi prolifica dotatum, & feminibus fecundandis inservientem. Quæres fortasse. Quid ergo faciunt spurii illi flores seu florum imitamenta? cui usui inserviunt? Respondeo vel ad ornatum, vel fortè ad pollinem prolificum excipiendum, ejusque vim ad semen derivandum.

Cæterum nullam opinor excogitari posse Methodum, quæ non aliquas, nè dicam multas,

P R Æ F A T I O.

tas, anomalias & exceptiones admittat: Methodum intelligo Naturæ convenientem, quæ nec alienas species conjungit, nec cognatas separat. Aliàs enim si vel florum tantum, vel feminum & vasculorum feminalium convenientias & differentias respiciamus, divisionem institui posse concedo, cujus membra omnia absque medio contraria sint, ità etiam ut nulla omnino detur species quæ sub eorum aliquo non contineatur.

Cùm Plantarum in *gymnospermas* & *enangiospermas* divisio antiqua admodum sit, & ipsi etiam *Theophrasto* ulurpata, cùmque nos ad Herbarum summa genera constituenda eâ usi simus, quæret fortasse aliquis, quænam femina nuda censenda sunt, quibusque notis à vasculis inclusis discerni possunt. Cui ut aliqua in parte satisfaciam, dico Primò, Vasculorum feminalium nomine intelligenda esse Conceptacula à Perianthiis distincta: unde Herbas eas quarum femina perianthiis tantum, quantumvis arctè clausis, continentur pro *Gymnospermis* habendas censeo.

Secundò, Me pro vasculo feminali habere quodcunq; (præter perianthium) plura femina continet, proinde *enangiospermas* esse herbas quæ ejusmodi vasculum à perianthio distinctum obtinent. Hinc *Bardane minoris echinos*, ut & *Agrimonia* & *Circæa*, pro vasculis feminalibus habeo, quòd bina intus femina contineant.

C

Tertiò,

P R Æ F A T I O.

Tertiò, Quodcunque per maturitatem aperitur, & semen effundit aut exponit, quamvis unicum tantum cluserit, vasculum feminale censendum esse.

Quartò, Me pro feminibus nudis habere quæcunque per maturitatem singulatim à matribus suis sponte separantur & abscedunt. Conceptacula enim feminum in Plantis, Animalium uteris maximam partem respondent; Semina ipsa fœtibus secundis inclusis. Sicut ergo uteri Animalium non excidunt, sed fœtus tantum unà cum tegumentis seu involucris: Sic in Plantis quicquid excidit semen est, quod adhuc plantæ adhæret vasculum feminale. Hinc Malvarum semina unà cum cortice quamvis laxè adhærente, quia à matribus hoc modo decidunt, pro nudis habeo. Excipiendæ hîc sunt Pomiferæ & Bacciferæ in quibus uteri non aperiuntur aut semen effundunt, sed eo adhuc prægnantes à plantis separantur: item Bardana, Agri-monia, Circæa & fiquæ sunt similes.

Siquis objiciat, in Siliculosis monospermis nonnullis conceptacula non aperiri, sed unà cum feminibus inclusis à matribus separari, nec tamen propterea semina nuda censenda esse. Respondeo, In his, quantum hactenus observaverim, conceptacula feminibus fœta à plantis non abscedunt, sed iis pertinaciter ad ficcitatem usque adhærescunt. De-
inde

P R Æ F A T I O.

inde quamvis in his femina è conceptaculis non excidunt, quia tamen manifestè congeneres sunt stirpibus iis quarum femina è filiquis excluduntur, conceptacula à feminibus distinguenda sunt, quodque intus continetur pro semine nudo accipiendum est, quod continet & includit pro vasculo, quamvis nunquam sponte aperiat: quamquam ego omnium hujus generis vascula tandem aperiri & semen exponere puto. Verum de Methodo, Deo vitam prorogante, virésque & valetudinem largiente, in posterum plura.

Nè cui autem injurius sim, superest agnoscere, me à *Roberto Morisono*, quem secure nimis secutus sum, hallucinatum, Celebratissimum Virum *Casp. Bauhinum* erroris falsò insimulasse, quasi eandem plantam repeteret & bis poneret sub diversis generibus, quòd Campanulam luteam linifoliam *Ger. ico.* pro Synonymo Rapunculi nemorosi angustifolii parvo flore, seu tertio *Tab.* habuerit. Postea enim animadverti, *Gerardum* sive per oscitantiam, sive per incitiam, Campanulæ luteæ linifolæ iconem sub titulo Rapunculi tertii *Tab.* revera posuisse, quod & ab emulatore ejus *Thoma Johnsono* animadversum, & in sua *Gerardi* Historiæ editione emendatum.

Explicatio Nominum abbreviatorum.

- A** *D. & Ad. Lob.* Adversaria Penæ & Lobelii.
Bot. Monsp. Botanicum Monspelienſe Petri Magnol.
C. B. Calpari Bauhini pinax Theatri Botanici.
C. B. prod. Caſp. Bauhini Prodrômus Theatri Botanici.
Cam. Camerarius.
Ceſ. Andreæ Ceſalpini hiſtoria.
Cat. Altd. Catalogus plantarum circa Altdorſium naſcentium à Mauritio Hofmanno editus.
Cat. Ang. Catalogus plantarum Angliæ, &c. à nobis editus.
Cat. Baſ. Caſp. Bauhini Catalogus ſtirpium circa Baſileam naſcentium.
Cat. Hol. Joan. Commelini ſtirpium Hollandicarum Catalogus.
Cat. Rom. Catalogus plantarum Romani agri Rogeri.
Cat. Sic. Catalogus Sicularum rariorum in Epistolis Pauli Boccone.
Cluſ. & Cluſ. hiſt. Caroli Cluſii Hiſtoria ſtirpium rariorum.
Col. Fab. Columnæ Ecphraſis ſtirpium minùs cognitarum.
Dod. Remberti Dodonæi Pemptades.
Fuch. Leonardus Fuchſius.
Ger. & Ger. emac. Joannis Gerardi Hiſtoria plantarum emaculata à Thoma Johnſono.
Gefn. Conradus Gefnerus.
Hort. Pat. Hortus medicus Patavinus à Turre.
Hort. Lugd. Bat. ſeu Leyd. Hortus Lugduno-batavus ſeu Leydenſis à Paulo Hermannò editus.
J. B. Joannis Bauhini Caſpari fratris Hiſtoria plantarum in tres tomos diviſa.
Lob. & Lob. Ob. Lobelii Plantarum obſervationes. *Lob. ico.* Ejusdem icones ſtirpium à Plantino editæ.
Lugd. Hiſtoria Plantarum Lugdunenſis.

Matth.

Matth. P. Andreæ Matthioli Commentarii in Dioscori-
dem.

Park. Joannis Parkinsoni Theatrum Botanicum. Park. parad.
Ejusdem Paradisus terrestris seu Hortus.

Tab. Jac. Theodori Tabernamontani Historia.

Thal. Thalius in Hircinia.

Trag. Hieronymi Tragi Historia.

Zan. & Zanoni. Jacobi Zanoni Historia Botanica.

Quid significant Literæ nominibus non-
nullis præfixæ.

A. **C**atalogum Altdorfinarum stirpium Maur. Hof-
manni.

B. Casp. Bauhini Prodromum vel Catalogum Basileen-
sem.

C. Caroli Clusii historiam stirpium rariorum.
Col. Fab. Columnæ Ecphrasin.

H. Catalogum stirpium Hollandicarum Jo. Commelini.

J. B. Joannis Bauhini Historiam.

M. Petri Magnoli Monspeliense Botanicum.

S. Sicularum rariorum Descriptiones Paul. Boccone.

T. Joannis Baptistæ Triumphetti.

Z. Jacobi Zanoni Historiam Botanicam.

Elenchus

7

*Elenchus Catalogorum hoc volumine
comprehensorum.*

1. **C**atalogus Generalis stirpium à nobis, in Exteris
Regionibus observatarum, adjectione aliarum
plus duplo auctior Pag. 1. ad p. 264
2. Plantæ à nobis collectæ in variis Itinerariis nostris,
præsertim in Italiâ, Siciliâ, Melitâ, Hevetiâ, Gallo-
provincia, &c. p. 265. ad p. 310
3. Plantæ rariores ab Aliis collectæ p. 315
4. Catalogus Sicularum Pauli Bocconi ibid.
5. Helveticarum Joh. Jacob. Wagneri p. 325
6. Agri Romani Jacob. Rogeri p. 329
7. Venetarum Anton. Donati. p. 332
8. Parisiensium Jacobi Cornuti p. 334
9. Montis Baldi Joan. Pona p. 336
10. Hispanicarum Classi, Aliorumque p. 343
11. Pyrenaicarum & Alpinarum Tournefortii p. 367
12. Lusitanicarum Grisei p. 370
13. Supplementum D. Sberard p. 398
14. Græcarum & Orientalium p. 3. ad calcem.
15. Egyptiacarum Alpini, Vestingii p. 22
16. Græcarum Bellonii, Honorii Belli, Alpi-
ni, &c. p. 30

Catalogus

*Catalogus stirpium Europæarum extra
Britannias nascentium in Regionibus
per quas iter fecit Joannes Raius.*

Abies Ger. Park. fœmina five Ἐλάτη θήλεια J. B.
Abies Plinii, & fœmina Theophrasti Clus.
alba five fœmina C. B. Taxi foliis hortu-
lanis nostris. *The Female or Pew-leaved
Fir-Cree.* Materia huic arbori candida: Folia in
extremitate bifida, supernè viridia, subtus cinerea,
utrinque in ramulis Taxicorum modo disposita: Coni
seu strobili sursum spectantes, quorum nucamenta ef-
fuit mense Maio. In Sueviæ & Baviaræ sylvis, inque
Alpibus copiosè provenit.

Speciem quandam Abietis, foliis Taxicorum modo
dispositis, utrinque viridibus, in viridariis Batavicis, enu-
triri nos certiores fecit D. *Tancredus Robinson*, ramulo
secum indè allato, & Amicis Londini ostenso. Hæc for-
tasse species est quam Clariss. Vir *Paulus Hermannus*
pro Abiete mari conis sursum spectantibus C. B. habet in
Catal. Hort. Lugd. Bat. Nobis, ut verum fateamur,
an detur Abies aliqua mas conis sursum spectantibus, à
fœmina Theophrasti distincta h. e. foliis acutis & pun-
gentibus, nondum satisfactum est. Notæ enim illæ,
quod coni sursum spectent, quodque folia Taxicorum mo-
do disposita sint, cum Abieti fœminæ vulgari conveniant,
ad distinctionem non sufficiunt. Præterea, *Du Choul* in
descr. montis Pilati, Abietum quas Sapinos vocant folia
pungentia dici non posse; sed apice modicè incisa scri-
bit. Proinde Abies *du Choul* mas Theophrasti esse non
potest: quam maris suæ synonymam facit C. B. *Bellonii*
librum

librum de coniferis non habeo, verum icon Abietis maris quam ex eo desumptam posuerunt *Dodoneus* & *Gerardus* quamvis folia quidem acuta repræsentat, *Bellonius* tamen se nunquam in Abiete folia pungentia (qualia *Plinius* atque etiam *Theophrastus* Abieti mari attribuunt) deprehendisse scribit. Proinde nec *Bellonii* Abies, si modò recta descripta sit, *Theophrasti* mas erit:

† Abies mas *Theophrasti*. *Picea* Latinorum sive Abies mas *Theophrasti* *J. B.* *Picea Park.* major *Ger.* major prima sive Abies rubra *C. B.* The common fir-Tree, or Pitch-Tree. Cum priore sed copiosius multo.

Col. Abrotanum vulgare *J. B.* mas *Ger.* mas vulgare *Park.* mas angustifolium majus *C. B.* Common Southernwood. *Fabius Columna* hanc speciem in *Aquicolorum* montibus sponte & copiosè fruticare scribit; verum humilem tenuisque sarmenti, bipedalem ad summum. Eandem in hortis *Campoclarensi*um cultam hominis ferè proceritatem adæquantem vidit, crasso rectoque caule fruticosiore.

Abrotanum foemina villosis & incanis foliis *C. B.* *Seriphium Dioscoridis* Abrotani foeminae facie *Ad. Lob.* Hoary Mountain Lavender-Cotton. In Gallo-provincia montis celsi *D. Magdalene* crypta celebris acclivibus, quæ *S. Maximini* oppidum spectat, *Lobelio* & nobis etiam observatum. Abrotano foeminae vulgari simillima est, nisi quòd odoratior, candidior magisque tomentosa, tota minor, sapore non admodò ingrato aut vehementi.

Abrotanum foemina vulgare *Park.* Foemina foliis terebinthis *C. B.* *Chamæcyparissus J. B.* *Ger.* Common Lavender-Cotton. Circa oppidum *S. Cyriaci* [*San Quirico*] in Etruria, atque inde incipiendo ad Statum usque *Ecclesiasticum* seu territorium *Papæ*, secus viam quæ *Romam* ducit, copiosè.

Abrotanum foemina foliis minis incanis *C. B.* 2. *Clus.* à quo, sententiâ nostrâ, non differt specie Abrotanum foemina foliis *Ericæ C. B.* *Park.* *Chamæcyparissus* unguentaria *J. B.* Nostra siquidem planta unguentum redolet, & *Londino* olim ad nos *Abrotani unguentarii* nomi-

nomine missa est; à præcedente autem differt foliis viridioribus, ramis minus frequentibus, candicantibus tamen, & odore mitiore. ~~Greener-leaved-Lavender=Cotton, smelling like Vintment.~~ In collibus saxosis circa molendina Nemausi.

B. Abrotanum campestre incanum Carlinæ odore *C. B. prod.* In Austria ad Lintzium urbem.

Absinthium arborescens *Lob. Park.* arborescens Lobelii *J. B.* Abrotanum foemina arborescens *Ger.* Abrotanum latifolium arborescens *C. B.* *Italica & Siculis Herba bianca. Tree-Wormwood.* In Sicilia, Regno Neapolitano, & Insularum adjacentium rupibus maritimis.

Absinthium Ponticum & Romanum quibusdam *J. B.* Fortè Absinthium Ponticum Creticum grati odoris *C. B.* ~~Roman-Wormwood.~~ Ait Cæsalpinus in collibus argillofis agro Senensi frequens esse Absinthii genus, brevius multò ac tenuius vulgari, paucioribus ramis ac seminibus, odoris ac saporis minus ingrati; cujusmodi & nos ibidem observavimus cum Florentiâ Romam iter faceremus.

Col. Absinthium montanum Abrotoni foeminae flore *Col. mont.* Chamæmeli flore magno *C. B.* In monte D. Mariæ Virginis appellato, non procul Neapoli.

Absinthium Alpinum rarius Artemisiæ folio *Col.* *C. Bauhinus* dubitat annon sit Absinthii maritimi Lavendulæ folio varietas.

B. Absinthium Ponticum repens seu supinum *C. B.* Absinthii Species quibusdam, Chamæmelum chrysanthemum Fuchsi *J. B.* In quibusdam frigidis Helvetiorum montibus *Dod.*

B. Absinthium Alpinum incanum *C. B. prod.* In Valesianorum Alpibus, ut in petris supra *Gemme.* In paucis differt ab Absinthio albo Valesiano.

B. Absinthium Alpinum candidum humile *C. B. prod.* In *Gletzberg* Helvetiorum monte non longè ab Augusta valle.

Absinthium Seriphium Narbonense *Park.* Seriph. tenuifolium maritimum Narbon. *J. B.* Seriph. Gallicum *C. B.* ~~French Sea-Wormwood.~~ Prope portum Li-

burnum in Italia, atque etiam Monspelim in Gallia Narbonensi, & alibi ad Maris Mediterranei litus frequens. Folia huic latiora sunt minúsque incana quam Absinthio maritimo Anglico.

M. Absinthium Santonicum Gallicum C. B. Santonicum vulgare *Lob.* In nostro litore frequens est, cum Seriphio Gallico permixtum, à quo facile distinguitur, ex eo quòd folia longiora, latiora, & minús dissecta habeat. *Bot. Monsp. Append.*

C. Absinthium Alpinum umbelliferum *Clus. hist.* album *Ger. Lob. ico.* Alpinum umbelliferum latifolium C. B. Album seu umbelliferum *Park.* Albis floribus, capitulis squarrosis *J. B.* *White tufted Wormwood.* Nusquam nisi in Austria Stiriaeque celsissimis jugis à Clusio observatum, ut v. g. in Etscherberg & Durrenstein copiosè. Hanc plantam in Catalogo Helveticarum Wagneri invenio.

† Absinthium Ponticum five Romanum vulgare *Park.* Tenuifolium Ponticum Galeni *Ger.* Ponticum vulgare folio inferiùs albo *J. B.* Ponticum tenuifolium incanum C. B. *Roman or Cypress Wormwood.* Duplex habetur, 1. Folio utrinque incano : 2. Fol. supina parte vividiorè. Multis Pannoniae & Austriae locis oritur, inque Viennensi agro cum in salebrosis, tum in saxosis gramineisque desertis agris : in terra reptando radicibus latè se diffundit.

Absinthium tenuifolium Austriacum *Ger. Park.* Austriacum tenuifolium *J. B.* Ponticum tenuifolium Austriacum C. B. *Fine-leaved Wormwood of Austria.* Ad vias non longè à Vienna Austriae, quà ad Neapolin Austriacam itur.

Acanthium Illyricum *Park Ad.* Illyricum purpureum *Ger.* Carduus quibusdam dictus Acanthium Illyricum, aliis verò Onopordon *J. B.* Spina tomentosa altera spinosior C. B. *Cotton-Thistle of Illyricum.* In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi frequens. J. Bauhinus aliisque Botanici insignem altitudinem sex septemve cubitorum huic plantae attribuunt; nos, ut verum fateamur, tam procerum nunquam vidimus.

Acan-

Acanthus sativus *Lob. Ger. Park.* Sativus vel mollis Virgilii C. B. *Carduus Acanthus*, five *Branca ursina* J. B. *Blank Urline* oz *Bears-breech*. In Italia Meridionalibus circa Baias & Neapolin, inque Sicilia copiosè: In Amphitheatro Titi. *Cat. Rom.*

Acarna flore purpuro-rubente patulo C. B. *Park.* *Acanthoides* parva *Apula Col.* *Carlina* annua purpurea *Monspeliensis*, five *Carlina Richeri Botan. Monsp.* *Purple-flower'd small Carlina-Chistle*. In Sicilia propè Messanam, Italia propè Florentiam, & Gallia Narbonensi propè Monspelim, in arenosis; æstate floret. Foliis *Acanthii vulgaris*, sed multis numeris minoribus, floribusque purpureis ab aliis sui generis distinguitur.

Acarna major caule folioso C. B. *Park.* *Acarnæ* similis flore purpureo, *Chamaeleon Salmanticensis Clusio J. B.* *Chamaeleon niger Salmanticensis Clusii Botan. Monsp.* *Dwarf-Chamaeleon-Chistle of Salamanca*. Propè montem S. *Lupi*, non longè ab oppidulo S. *Lupian* dicto, itémque juxta vias, non longè ab oppidulo *Vic*, in valle Frontignana.

Acarna five *Acorna altera* *Apula Col. Park.* *Acarna capitulis* parvis luteis in umbella C. B. Circa *Cirinolam* *Apuliæ* oppidum in agrorum marginibus. An *Carlina sylvestris multicaulis* flore flavo, radice perenni nostra, de qua infra?

Acarna Theophrasti five *Acorna Plinii Col.* In *Campoclarensum* & *Æquicolorum* collibus, secus vias & in incultis.

Acer acutioribus foliis Gesn. hort. *Aceris montani* varietas J. B. An *Acer montanum* tenuissimis & acutis foliis C. B? *Mountain Maple with sharper pointed leaves*. In montibus *Stiriæ*, & in Alpibus *Sabaudicis* propè *Genavam*.

Acer majus folio rotundiore, minùs laciniato, segmentis obtusioribus. *Round-leaved-Elm*. Observavimus primò in *Etruriæ* sylvis non longè à *Viterbo*, postea etiam in montibus *Genavæ* vicinis. Hujus fructum non vidimus, proinde an genuina *Aceris* species sit nondum certo scimus; sed ob folii similitudinem *Acer* esse conjectamur.

- Acer trifolium* C. B. *Creticum trifolium* Park. *Monspessulanum* Lugd. J. B. In sylva Valena propè montem Lupi, item in collibus juxta *Castleneuve* pagum *Monspelio* vicinum. Invenimus primò propè *Gratianopolin* in rupibus juxta pontem quem transivimus eundo à la fontaine que brusle. *Three-leaved Maple*, or *Maple with a tripartite leaf*.
- Acetosa montana maxima* C. B. Max. *Germanica* Park. *Oxalis maxima sylvatica* J. B. *Great Mountain-Sorrel*. In monte *Thuri* propè *Genevam*. Ab *Acetosa maxima Hispanica*, seu *hortensi* majore differt.
- M. *Acetosa rotundifolia hortensis* C. B. *Oxalis Franca* seu *Romana* Ger. *Sativa Franca* seu *Romana rotundifolia* Park. folio rotundiore repens J. B. *Roman* or *French Sorrel*, or *round-leaved Sorrel*. In summitate montis *Lupi*, in ipsis rupium fissuris nascitur prope *facellum*.
- B. *Acetosa rotundifolia Alpina* C. B. In muris *Nosodochii*, quod in monte majore *Bernhardi Helvetiorum* est, provenit.
- C. *Acetosa montana geniculis nodosis* C. B. *Montana maxima* Park. *Oxalis* folio amplissimo, geniculis tuberosis J. B. In jugo *Wechsel* observavit *Clusius*.
- Acetosa Ocimi facie Neapolitana* C. B. *Neapolitana Ocimi* folio Park. *Ocimi facie Neapolitana* *βενεπολιτάνος* Col. *Ocimifolia palustris polyspermos* nostra *Cat. Altdorf*. *Sheeps-Sorrel with Basil-leaves*, and *prickly Seed-Vessels*. In *Sicilia* & Regno *Neapolitano* in vineis & arenosis frequentissima. Quin & in *Germania* invenitur circa *Altdorfium* : vide *Cat. Altd.* Semina triangula perianthio triangulo quasi *tribulaceo* includuntur. *Cat. Rom.*
- M. *Acetosa maritima foliis sinuatis & dentatis* Bot. *Monsp.* *Lapathum maritimum sinuatum* J. B. *Maritimum foetidum* C. B. *Stinking Sea-Sorrel with waved and indented leaves*. In sabulosis monticulis parùm ultra *Cetium montem* collegit D. *Magnol*, quos reptatu suo occupat. Si planta hæc, quod dubito, *Lapathi* species sit, rectè à D. *Magnol* ob aciditatem suam *Acetosis* deputatur.

- Z. *Acetosa tuberosa repens cum maculis sanguineis, Ragusiana Zanom.* Hujus semen accepit à D. *Alex. Balam*, qui à Tingi urbe transmisit. *Lobelianæ Acetosæ tuberosa radice eandem esse existimo.*
Achillea v. Millefolium.
 Acini pulchra species *J. B.* *Clinopodium IV*, five montanum *C. B.* *Austriacum Clus. Park. Fair oz larger Stone-Wasil.* In ascensu montis Juræ propè *Genevam* variis in locis.
Aconitum folio Platani, flore luteo pallescente J. B. II, five *Lycostonum luteum C. B.* *Luteum Ponticum Ger. Luteum Ponticum serotinum Park. Yellow Wolfs-bane.* In colle *la Bassie*, aliisque montibus *Genevæ* vicinis copiosè. Duplex est; *Præcox* quod *Ac. albis pallidisve floribus C. B.* & *Serotinum.*
 A. *Aconitum lycostonum humilius, foliis durioribus, floribus pallidis Cat. Altd.* In montibus supra *Herspruccium.* Jun. floret.
 C. *Aconitum Napello simile, sed minus, coeruleum, præcoxius J. B.* *Violaceum, seu Napellus 2 C. B.* *Violaceum Ger. emac. Lycostonum præcox Park. Lycostonum 4. Tauricum Clus.* In *Tauricis* montium jugis, non procul *Salzburgo* Julio floret. Violet-coloured Monks-hood.
 C. *Aconitum Lycostonum Napello simile, Neubergense, foliis latioribus, flore purpureo J. B.* *Purpureum, seu Napellus tertius C. B.* *Purpureum aliud Park. Purpureum Neubergense Ger. emac. Purple-flowered Monks-hood.* In montis *Neuberg Ducatus Stiriaë* jugo, ad *vaccarum stabula.*
 C. *Aconitum magnum purpureo flore, vulgo Napellus J. B.* *Coeruleum, seu Napellus 1. C. B.* *Napellus verus coeruleus Ger. Verus flore coeruleo Park. Common blew Monks-hood oz Helmet-flower.* In *Sne-alben* & aliorum quorundam montium jugis frequentissimus est.
 C. *Aconitum Lycostonum flore maximo J. B.* *Coerul. purpureo flore maximo, five Napellus 4. C. B.* *Maximum Judenbergense Ger. emac. In Judenberg altissimo totius Stiriaë monte, & in quodam Sneberg jugo, quâ difficillimus est ascensus.* D 4 C. Aco-

C. Aconitum coeruleum minus, seu **Napellus minor** *Park* **C. B.** **Lycostonum coeruleum parvum** *Ger.* **Lyc.** flore coeruleo, galea elatiore, radice bulbosa **J. B.** **Lycost.** **X.** **Thora Italica** *Clus.* Ubertim nascitur ad Monasterium *Neuberg*, supra torrentem qui monasterium alluit; & proxime altissimum illum lacum supra *Gamingam*.

Aconitum coeruleum Autumnale *Park*. **Lycostonum Autumnale**, **Napello simile** **J. B.** **Coeruleum**, **Napelli flore** **C. B.** An potius, **Acon. lycost.** **Napello simile** *Neubergense*, foliis latioribus, flore purpureo **J. B.** ? **Wiem** **Autumnal Wolfsbane**. In sepibus non longè à *Memminga* *Sueviæ* urbe **Aconiti** speciem medio Augusto florentem inveni, bicubitalem & altiorem, valde ramosam, foliis minus dissectis quàm in **Napello** vulgari.

Aconitum Salutiferum seu **Anthora** **C. B.** **Anthora** *Park*. **Anth.** seu **Aconitum salutiferum** *Ger.* **Antithora** flore luteo **Aconiti** **J. B.** **The Counter-poyson to Monkshood**. In jugis montis *Juræ*, præsertim in vertice *Thuri*.

Aconitum hyemale *Ger.* *Park* **I.** sive **unifolium luteum** bulbosum **C. B.** **Ranunculus** cum flore in medio folio, radice tuberosa **J. B.** **Winter Wolfsbane**. **Anemone Bononiensis** nonnullis dicitur, quoniam circa *Bononiam* & per totam etiam *Lombardiam* copiosissimè provenit, mensis *Februarii* initio florens. **Aconitum præcox unifolium**, **Ranunculi** flore, non ineptè dicitur.

Aconitum Pardalianches v. *Thora*.

Adiantum sive **Capillus Veneris** **J. B.** **Verum** seu **Capillus Veneris verus** *Park* **I.** Sive foliis *Coriandri* **C. B.** **Capillus Veneris verus** *Ger.* **True black Maiden-hair**. In humidis & umbrosis rupibus & puteis, & ad aquarum *Scaturigines* in *Italia* & *Galia* *Narbonensi* vulgare. *Cat. Rom.*

Ægilops Narbonensis *Lob.* **Festuca** sive **Ægilops Narbonensis** *Park*. **Festuca Italica** *Ger.* **Gramen Festuæ XIV**, sive **Festuca altera capitulis duris** **C. B.** **Hard-headed Dat-grass**. In *Sicilia*, *Italia* & *Gallia* *Narbonensi* frequentissima habetur.

Agera-

Ageratum purpureum Dalechampii *J. B.* *Purpureum Park.* *Serratum Alpinum C. B.* In rupibus ad radices montis Salevæ, & in ascensu montis Juræ prope Genevam; utrobique copiosè. Malè inscribitur *Ageratum*, cum quò nihil habet similitudinis; flore enim est pentapetalo, simplici, vasculum seminale oblongum post se relinquente.

Ageratum Septentrionalium Lob. Vulgare, sive *Costus hortorum minor Park.* *Foliis ferratis C. B.* *Ager. plerisque, Herba Julia quibusdam J. B.* *Balsamita fœmina sive Ageratum Ger. Waudlin-Tansie.* In *Etruria circa Florentiam & Liburnum*; in Gallia Narbonensi circa Monspelium abundè. Trago & Matth. pro *Eupatorio Mesuæ* habetur. *Cat. Rom.*

Agnus castus Offic. Ag. folio non ferrato J. B. *Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis C. B.* *Vitex seu Agnus castus Ger. Vitex seu Agnus castus folio angusto Park. The Chast-Tree.* In Sicilia & Regno Neapolitano non infrequens. Agnum castum *Officinæ ineptè appellant, non advertentes, castum* nihil aliud esse quàm expositionem *Agni.*

Col. Agrimonia odorata Park. Cam. *Eupatorium odoratum C. B.* Alterum odoratum & aromaticum *Col.* In Sylva & colle quodam prope oppidum Campoclarensium, juxta flumen Austrum respiciens.

Agrimoniæ similis C. B. Agrimonoides Park. Col. Pimpinella folio Agrimoniæ nonnullis. In *Æquicolorum montibus, & ad Matesii radices Septentrionem* respicientes inter vepres.

Aizoon v. Sedum.

Alaternus major seu prior Park. Bourgespine Monspelien- sium, Alaternus Plinii Clusio & Anguillaræ Lob. Spina Bourgi Monspelien sium J. B. Philyca elatior C. B. Ever-green-Privet, by our Gardeners confounded with, and called by the name of Phillyrea. In Italia, præcipuè ad mare inferum, necnon circa Monspelium in collibus Saxosis.

Alaternus angustifolia, foliis profundius sectis. In montosis eundo à Lericio ad Lucam in Italia collegimus. In *Catalogis Hort. Lugd. Bat. Hermannii, & Hort. Anglie.*

Amstelodam. Commelini hanc speciem invenio.
 Col. Alcea folio rotundo laciniato C. B. Peregrina *Chus.*
 Malva montana seu Alcea rotundifolia laciniata Col.
 Supra Matesii montis supercilium, Septentrioni oppositum *Civita Vecchia* dictum, & in *Æquicolorum* montium planis *Rascino* appellatis.

Alcea pentaphyllea *Park.* Pentaphylli folio, vel Cannabino *J. B. V.* Sive Cannabina C. B. Fruticosa cannabina *Ger.* Five-leaved, or Hemp-leaved *Urbain-Mallow.* In aggeribus fossarum circa *Monspelim.*
V. Botan. Monsp. Cat. Rom.

Alcea minor Sicula, flore minore carneo. *Urbain-Mallow* of Sicily with a small flower. E radice alba simplici plures emittit caules, humi procumbentes, hirsutos, superna parte rubentes. Folia ima subrotunda, longis pediculis annexa, quæ in caulibus sunt in tres aut quinque lacinias secta, hirsuta, & circa margines crenata. Flores parvi, quinquefolii, carnei. Semina Malvæ vulgaris. In insula ad Promontorium *Pachynum.*

Alcea villosa *J. B. VIII.* seu hirsuta C. B. Minor villosa *Park.* Small hairy *Urbain-Mallow.* In vinetis circa *Monspelim*, & in sepibus non procul *Genavâ.*

B. Alcea vulgaris minor, foliis in longas lacinias divisis C. B. *Catal. Basil.* Dens leonis & Malva querna *Lon.*
 Ad agros infra *Huningam.*

B. Alchimilla Alpina quinquefolia C. B. *prod.* In monte *S. Bernhardi* majore & *Gottardo* locis humidioribus.
 Alcyonium 4. Dioscoridis v. Bursa marina.

M. Alcyonium spongiosum Officinarum *J. B.* durum, five 1. Dioscoridis Imperato C. B. In litore maris ad montem *Cetium* non semel invenit D. *Magnol.*

Alcyonium 14. C. B. Pila, seu Sphæra marina *J. B.* Sea-balls. Has pilas Arundinum progeniem esse, & quidem foliorum earundem affirmat D. *Lucas Schroekius*, *Ephem. Germ. An. 11.* Obs. 14. Locum vide. Cujuscunque autem originis sunt, in litoribus Maris *Mediterranei* his nihil frequentius.

† Alcyo-

† *Alcyonium* 3. *Dioscoridis* seu *Auricula marina* *Cæs.*
Fungus Auricularis Cæsalpini C. B. Item *Alga mari-*
tima Gallo-pavonis pennas referens ejusdem. The
Turkeys feather. In rupibus aquâ marinâ tectis
 non tantum in Italia & Sicilia, verumetiam in An-
 glia. Fungum *Cerasorum* refert, & inter *Lichenem*
 & Fungum ambigit.

Alkekengi Lon. *Halicacabum* seu *Alkakengi* vulgare
Park. Solanum bacciferum II. Sive vesicarium, quod
 folliculi vesicæ inflatæ similes; vel ut *Plin. l. 21. c. 31.*
 quoniam vesicæ & calculis prodest *C. B.* *Halicacabum*
Ger. Halic. vulgare J. B. Primò in Sylvis in insula
Danubii juxta Viennam Austriæ, deinde in Italia
 prope Romam in scrobibus invenimus. Reperitur eti-
 am circa *Monspelium.* Vid. *Botan. Monsp.*

Allium Alpinum J. B. *Alpinum latifolium* seu *Victoria-*
lis Ger. Anguinum Park. IX. Sive montanum latifo-
 lium maculatum *C. B.* *Victoralis Clus. Broad-*
leaved mountain Garlick. In summis jugis altissimo-
 rum montium Max. *Carthusianorum Coenobio* immi-
 nentium.

C. *Allium montanum bicornè* flore dilutè purpurascen-
 te *C. B.* *Moly montanum latifolium primum Clusii*
Park. Ger. emac. Allium seu Moly montanum latifo-
lium J. B. Hujus locum non addit *Clusius.*

Allium umbelliferum pratense J. B. An *Allium* seu *Moly*
Narcissinis foliis primum Clus? Al. montanum foliis
Narcissi majus C. B? *Moly Narcissinis foliis 1. Ger?*
Narcissinis foliis Park. par. In udis pratis *Genevæ* ul-
 tra flumen *Arve.* *Clusius.* *Moly suum Narcissinis fo-*
liis primum invenit in Leytenberg supra Mandersdorf
 & aliis montibus urbi *Viennæ* vicinis.

C. *Allium petrarum umbelliferum J. B.* *Montanum seu*
Petroscorodon Gesn. hort. mont. foliis Narcissi minus
C. B. *Narcissinis foliis tertium Ger. emac. Burmii*
Rhætorum invenit J. B. qui existimat *Clusium* hanc
 plantam pingere pro *Moly Narcissinis foliis secundo.*
 Cum præcedente invenitur.

M. *Allium petrarum umbelliferum J. B.* Hoc, inquit
P. Magnol, idem esse existimo cum *Allio radice ob-*
 longa

- longa C. B. cùm descriptiones in omnibus ferè conveniant. Invenitur copiosè in monte *Serane*, superato loco dicto *La costè de Meionel*, & Augusto mense floret. C. Bauhinus in loco montoso non longè à Monspelio, qui Hortus Dei dicitur observavit. *Prod.*
- B. Allium montanum radice oblonga C. B. *prod.* In eodem quo præcedens loco. Hanc speciem Monspelii naçti sumus D. *Sweiker* Dantiscani munere.
- Allium Sphærocephalum purpureum Sylvestre J. B. Montanum capite rotundo C. B. Montanum 5. Clusii *Ger. emac.* Moly purpureum Neapolitanum *Park. parad.* In vineis & segetibus circa Genevam, Monspelium, &c.
- Allium Sylv. bicornè purpureum proliferum J. B. Montanum bicornè angustifolium flore purpurascens C. B. Moly montanum Pannonicum bulbiferum secundum Clusii *Park. parad.* In Germania inter Lodehemium & Basileam collegimus. In dumetis circa Cliben *Cat. Bas.* In Austriacis Stiriacisque Alpibus *Clus.*
- Allium Sylvestre bicornè flore obsoleto C. B. Bicornè proliferum, flore intus albescente, cum stria purpurascens externè J. B. Genevæ inter Segetes passim.
- Allium juncifolium Sphærocephalum purpurascens. In arenosis ad Rhodanum fluvium propè Genevam. Descriptionem vide *Hist. nost.* p. 1118. Simplici bulbo est, & capite non prolifero, sed ex flosculis duntaxat composito, quo Cepas imitatur.
- C. Allium flore luteo seu pallido J. B. Montanum bicornè flore pallido odore C. B. Allii montani quarti species 1. Clusii *Ger. emac.* Moly Pannonicum odorato flore *Park.* Circa Posonium Ungariæ, Niclasburg Moraviæ, sed omnium abundantissimè supra Badenses Austriæ thermas.
- M. Allium montanum bicornè flore obsoletiore C. B. Montani quarti 2. Species *Clus.* Moly montani 4. secunda Species Clusii *Ger.* An Allium Sylv. bicornè flo. viridi J. B. In sterilibus herbis propè *La Valette* sub magnis rupibus juxta Ladum amnem Monspelicum

cum Augusto mense cum flore collegit D. *Magnol. &c.*
V. Botan. Monsp.

M. *Allium juncifolium bicornis luteum C. B. Æ-*
state in satorum marginibus supra Boutonetum & alibi.
Botan. Monsp. In Austria prope Stain & Baden. C.B.
prod.

M. *Allium Sylvestre seu Moly minus roseo amplo flore*
Magnol. Figuram hujus & descriptionem vid. in Botan.
Monsp. Plurimum oritur in vineis circa Colombiere &
Memmau, & Maio mense floret.

B. *Allium Sylv. juncifolium capitatum purpurascens C. B.*
Allium caninum 1. Trag. In Saxosis ad ripam Rheni.
Cat. Basil.

Allium Sylvestre perpusillum juncifolium moschatum J. B.
Moly moschatum capillaceo folio C. B. Moschatum
vel Zibettinum Monspelienſe Park. In collibus propè
Monspelium & Sellam novam, aux Garrigues à la Co-
lombiere. Septembri mense floret.

C. *Alnus altera Clus. Folio incano C. B. Park. Hirsuta*
Ger. emac. Hirsuta & incana J. B. Hoary Alder.
Circa Genevam & Montbelgardum variis in locis ob-
ſervavit J. B. In Austriæ & Stiræ montanis ad flu-
mina, inque Danubii insulis circa Viennam Clu-
ſius.

Aloe vulgaris C. B. J. B. Vulgaris seu Sempervivum
marinum Ger. Park Aloes. In Sicilia & Melita insu-
lis in muris & tectis.

Alopecuros Ger. Genuina Park. Gramen Alopecuroi-
des spica rotundiore C. B. Gr. Alopecuros spica bre-
vi J. B. Foxtail. In Sicilia, Italia, & Gallia Nar-
bonenſi, præſertim in arenosis, ut v. g. prope oppidum
Frontignanum, circa Baias, &c.

Gramen Alopecuros minor spica longiore C. B. Cauda
vulpina Monspelienſium Ad. Lob. Spica longior est
præcedentis, & ex multis spicis composita Panici in
modum. Long-spiked Foxtail-grass. Nos in Sicilia
circa Meſſanam collegimus: Lobelius in locis mariti-
mis Meſſelio vicinis ad Magallonam & aquas Ma-
rianas.

Alfine baccifera *Ger.* Scandens baccifera *C. B.* repens baccifera *Park.* Cacubalum quibusdam vel *Alfine baccifera* *J. B.* *Berry-bearing-Chickweed.* In sepibus, primò non longè à Francofurto ad Moenum, postea quoque in Italia & Gallia Narbonensi observavimus. Loca circa Monspelium vide in *Botan. Monsp.*

Alfine folio crasso, an *Alfine foetida* *F. Columnæ Dioscoridea* *J. B.* Primò se nobis obtulit in Liguria circa Portum Veneris, deinde alibi etiam tum in Italia, tum in Sicilia. *Alf. Parietariæ foliis C. B. Phyt. Cynocrambe legitima Dioscot. Park. Cat. Rom.* Ad plateas. In insula Capreis frequens *Col.*

Alfine nemorosa montana maxima nobis. Montana heracea maxima *Col. Park.* Montana latifolia, flore laciniato *C. B.* *The greatest mountain Chickweed.* In Sylvosis ad latera montium Juræ & Salevæ prope Genevam. Hanc speciem in Catalogo exterarum ante 20 annos edito pro *Alfine maxima Hist. Lugd.* habui. *Col. Alfine montana capillaceo folio C. B. Park.* Item *Saxifraga montana Neapolitana Park.* *Alf. Saxifraga angustifolia minima montana Col.* In Saxorum rimis, & rupium cavis umbrosis circa *D. Philippæ antrum Equicolorum.*

Alfine myosotis flore maximo. An *Alfines Myosotis facie, Lychmis Alpina flore amplo niveo D. Lloyd.* In descensu montis propè Lucam versùs Lericium; in itinere à Lericio ad Lucam invenimus, Vere florentem.

M. Alfine aquatica minor & fluitans C. B. Fluviatilis Tab. Ger. Copiosa est in Ledo amne, & Lateræ rivulis *Botan. Monsp. Riber-Chickweed.* An *Alfine longifolia uliginosis proveniens locis J. B.*

S. Alfine maritima longius radicata P. Boccon. Long-rooted Sea-Chickweed. In Sicilia. Foliis variat; uni enim *Herniarie formæ* & magnitudine sunt; alteri verò *Alfines maritimæ Neapolitanæ Col.*

S. Alfine Lotoides Sicula P. Bocc. *Alfine palustris minor, folio oblongo C. B. Prod.* Prope Catanam in palustribus & humentibus locis.

B. *Alfine*

- B. *Alfine palustris minor Serpyllifolia C. B.* An *Alfine palustris Serpylli folio P. Boccon.* In palustribus Alneti circa telonium Wiefæ *Cat. Bas. v. & Cat. Altdorf.* An hæc planta eadem sit *Portulacæ nostræ aquaticæ*, seu *Anagallidi Serpyllifoliæ aquaticæ J. B.* inquirendum.
- S. *Alfine Bononienfis non aculeata P. Bocc.* Bononiæ, & ad vicum *Chantilly* suburbanum vidit *D. Boccone.*
- S. *Alfine Paronychæ facie z. Matthioli P. Bocc.* Exit passim in maritimo litore Modicæ civitatis ad Pachynum Promontorium.

Alfine muscosa quibusdam J. B. Tenuifolia muscosa C. B. Locis humidis ad fontes & aquarum scaturigines in montibus Stiriac, itémque in Jura & Saleva Genevæ vicinis exit, Flos huic tetrapetalos.

Alfine verna Dalechampii Lugd. Caryophyllus arvensis umbelliferus J. B. Arvensis umbellatus Park. Holosteus arvensis Ger. Arvensis umbellatus folio glabro C. B. Umbelliferous Chickweed. Inter segetes prope Lovanium. Vera & genuina *Alfines* species est.

Alfine minor montana magno flore. Hæc Alfinæ minori multicauli similis est, foliis nonnihil angustioribus fortasse ob locum, floribus pentapetalis lacteis minimè bifidis, duplo majoribus. In montibus prope Max. Carthusianorum coenobium in Delphinatu.

A. *Alfine capitulis Lini, cauliculis inflexis C. B. Minima Suffruticis instar Nybægenos dicenda Thal. In pratis montosis & summitate des Buchbergs. Cat. Altd.*

M. *Alfine litoralis graminea Bot. Monsp. App.* Ubi descriptionem vide. In herbidis maritimis eundo ad montem Cetium, ubi stagnum trajicitur, Maio mense copiosè reperitur.

H. *Alfine maritima Neapolitana Col. Park. Maritima flore rubente C. B. Mirum hanc plantam calidiorum regionum incolam in Hollandia reperiri: ibidem tamen à D. Jac. Breynio inventam notat D. Commelinus in Cat. Holl.*

H. *Alfine palustris exigua flosculis albis lanceolatis, Plantaginellæ aquaticæ instar Mentzelii Cat. Holl. Commel.*

B. *Alfine*

B. Alfine Alpina junceo folio C. B. *prod. Park.* In Helvetiis & Genevensium montibus.

B. Alfine Alpina glabra C. B. *prod. Park.* In Helvetiorum Alpibus & monte Spliegel.

B. Alfine Alpina minima glabra C. B. *prod.* Florè tetrapetalo. In monte Fracto & ad thermas Faba-rias.

Althæa frutex 1 *Clusii. Ger.* Frutescens folio rotundiorè incano C. B. Arborecens 7. B. Alth. Olbiæ Galloprovinciæ *Lob.* Nam quam pro Althæa Olbiæ habuerunt Londinenses, Althæa Bryoniæ folio, seu folio acuto, parvo florè C. B. erat. Foliis est Malvæ vulgaris, rotundis, sed mollibus & incanis, flo. magnò incarnato. In rupibus non longè à specu Frontignana, & prope Tolonam. De nominibus hujus plantæ consule *Hist. nost.* p. 603.

C. Althæa flore majore C. B. Pannonica *Park.* Florè grandi lthææ, Thuringica Camerarii 7. B.

C. Althæa Pannonica 3 *Clus.*

C. Althæa laciniato folio C. B. Profundò serrato seu dentato folio 7. B. Per Pannoniam & in Moravia humidis locis & secundum tumulos fitis tres præcedentes species observavit *Clus.*

Alypum montis Ceti, sive Herba terribilis Narbonensium *Ad. Al.* Monspelienfium sive Herba terribilis *Park.* Monspellanum sive Herba terribilis 7. B. Thymelæa foliis acutis, capitulo Succisæ, sive Alypum Monspellensium C. B. In Promontorio Ceti propè Frontignanam copiosè, nec minùs in collibus Saxosis prope S. Chamæ Gallo provinciæ oppidum.

Alyssum minus v. Thlaspi minus.

S. Amarantus Siculus spicatus radice perenni *P. Bocc.* Oritur in locis Catanæ vicinis, & in Hyblæis montibus restibili fecunditate luxuriat. Nos in horto Med. Messanenfi cultam vidimus.

Amarantus luteus *vid.* Stoechas citrina.

Ambrosia *Ger.* quibusdam 7. B. Maritima C. B. Hortensis *Park.* Dak of Cappadocia, inepte, cum nè foliis quidem Quercum referat. In maritimis Etruriæ arenosis.

Amelanchier Lob. *Vitis Idæa tertia Clus. Park.* *Vaccinia alba Ger.* *Diospyros J. B.* *Alni effigie lanato folio minor C. B.* *Whortle-berry=Tree.* In montibus circa Genevam, & in lateribus montium Rheno imminetium.

Ammi vulgare Ger. *vulgatius Lob. Park.* *majus C. B.* *vulgare majus, latioribus foliis, semine minus odore J. B.* *Common Bishops-weed.* In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi in hortis, vineis & pinguioribus arvis nimis interdum frequens. Variat foliis tenuioribus magilve incis, quod & Camerario observatum.

Amygdalus Ger. Park. *Sativa J. B.* *dulcis & amara J. B.* *nam è dulcis semine lato amara interdum provenit, Petro Crescentio observante. Almond=Tree bearing sweet and bitter fruit.* In Italia & Gallia Narbonensi etiam in agris.

H. Anagallis aquatica major folio subrotundo C. B. *aquat. flo. coeruleo, folio subrotundo major J. B.* *Veronica aquat. major folio subrotundo Moris. Cat. Commel.*

H. Anagallis aquat. major folio oblongo C. B. *aquat. flo. coeruleo, fol. oblongo major J. B. Cat. Commel.* Neque hanc, neque præcedentem speciem in Anglia hæcenus observavimus.

Anagyris Lob. *foetida C. B. Park.* *Ger. vera foetida J. B.* In montibus propè Messanam, & alibi tum in Sicilia, tum etiam in Italia. *Stinking Bean-trefoil=Tree.*

Anagyris non foetida major & Alpina C. B. *non foetida, sive Laburnum majus Park.* *Laburnum arbor trifolia, Anagyridi similis J. B.* *Anagyris Ger.* *Bean-trefoil=Tree.* In montibus Jura & Saleva prope Genevam, & alibi in Alpibus Sabaudicis.

Anchusa angustifolia C. B. *Lignosior angustifolia Lob. Park.* *minor lignosior J. B.* *item Libanotidis species ejusdem.* In collibus sterilibus agri Monspeliensis, *aux Garrigues*, propè Castelneuf, &c. *Woody Alkanet.*

Anchusa lutea J. B. Ger. *major, floribus luteis C. B.* *lutea major Park.* *Pellico Alkanet.* In agris

sterilioribus non longè à Lugduno, itinere Genevensi.
Col. Anchusa lutea minor C. B. Park. F. B. echiioides lutea, Cerinthes flore montana Col. Symphytum angustifolium Apulum Park. In saxosis Æquicolorum montibus meridiei expositis.

Anchusa Monspeliensis F. B. IV. seu puniceis floribus C. B. Anch. Alcibiadion Ger. minor purpurea Park. Purple-flower'd Alkanet of Montpellier. In colle arenoso inter Grammontiam Sylvam & Castrum novum, non longe à Monspelio. Cat. Rom.

M. Anchusa lutea minima Lob. ob. The least Yellow Alkanet. Copiosè nascentem invenit D. Magnol in loco dicto la Garrigue du Terrail, & in sterilibus circa Salehovam & la Colombiere. Maio & Junio floret.

Androsace Matthioli v. Fungus petraeus.

Androsaces Matthioli altera F. B. Clus. altera major Matthioli Park. Alsine affinis Androsace dicta major C. B. Androsaces annua spuria Ger. Inter segetes circa Badenses thermas non procul Vienna Austriæ copiosè.

Col. Androsæmum perfoliatum & perforatum C. B. alterum Apulum Col. Park. In calidioribus Cirinolani inculti agri.

Androsæmum foetidum Park. Capitulis longissimis filamentis donatis C. B. Ruta hypericoides quibusdam, Sicilianæ affinis, sive Tragium F. B. Stinking shrubby Tutsan. In Sicilia & Calabria ad aquarum rivos, ubi in satis magnum fruticem adolescit.

Anemone sylvestris secunda Clus. v. Pulsatilla alba.

B. Anemone Alpina alba major C. B. prod. In Blankenstein Austriæ. Burser.

B. Anemone Alpina alba minor C. B. prod. In Taurero Rastadiensis, Austriæ. Burser.

Anemone sylv. alba major C. B. magna alba, plurima parte anni florens F. B. Sylvestris latifolia alba, sive tertia Matthioli. Park. Great wild White Anemone or Windflower. In Germania superiore locum non recordamur. In pratis Pannonicis, & ad Mœnum frequens Clus.

Anemone tuberosa radice *Ger. tenuifolia* simplici flore tertia, sive *Oenantes* foliis, flore violaceo hexaphyllo *C.B.* An Italica latiusculis spinosis foliis 3 Clusii *J.B?* ~~Knobby-rooted Anemone with a bright Purple-flower.~~ Itinere à Lericio ad Massam Liguriæ copiosam vidimus Aprili florentem: postea etiam alibi in Italia. Invenitur etiam in Germania secundum Rhenum inter Moguntiam & Andernacum, inter vepres. *Clus.* B. Angelica Sylvestris hirsuta inodora *C.B. prod.* Ex Lusatia misit Francus.

Anisum *Lob. Ger. Park. J.B.* Anisum Herbariis *C.B.* *Anise.* In Insula Melita magno proventu seritur. Anisum Melitenses *Cuminum dulce* appellant, unde *C. Bauhinus* deceptus *Cuminum dulce* pro distincta Cuminis specie habuit.

Anonis viscosa spinis carens lutea major *C.B.* lutea non spinosa, Dalechampsio *Natrix J.B.* non spinosa lutea major *Park. Great Yellow Camock or Westharrow.* Hanc primò observavimus in arenosis insulæ illius exiguæ, à Promontorio Siciliæ Pachyno dicto non ita pridem impetu maris abruptæ; deinde ad fluvium *Arve* prope Genevam; tandem circa Monspelium copiosè. Flores lutei lineis plerunque rubris virgati sunt, unde Anonis non spinosa flore variegato *C.B.*

M. Anonis viscosa spinis carens lutea latifolia annua *Magnol. Botan. Monsp.* ubi descriptionem vide. Copiosè reperitur ultra antrum Frontignanense sub ilicibus, juxta viam, Augusto & Septembri mensibus cum flore.

M. Anonis spinis carens lutea minor. Ab Anon. viscosa lutea minore *C.B.* differt, quòd flos ei pendulus non sit. Augusto mense florens reperitur in loco dicto *La Garrigue de Perauls*, juxta viam, inter ilices cocci-feras.

Anonis non spinosa parva procumbens lutea *nobis.* An Anonis maritima mitis folio lucido serrato. *Bocc.* In arenosis maris litoribus prope Catanam Siciliæ copiosè. Siliquæ duos intus seminum ordines continent. Integram descriptionem vide *Hist. nost. p. 958.*

Anonis non spinosa purpurea supina minima. In sterilibus Calabriae juxta mare. Nescio an hæc planta à quoquam descripta sit.

Anonis pusilla fruticans Cherleri, trifoliis affinis *J. B.* In collibus sterilibus Narbonensis Galliae inter Ilices, Thymos, aliisque frutices multa.

Col. Anonis lutea sylvestris minima *Col.* spinosa lutea minor *C. B.* montana spinosa lutea minor *Park.* In Æquicolorum incultis depresso aridis locis à Villa Mercato viâ ad molendinum. Quærit *D. Magnol.* annon hæc sit Anonis pusilla glabra fruticans Cherleri.

Anonymus flore Coluteæ *Clus.* Chamæbuxus flore Coluteæ *Ger. C. B.* Chamæbuxus sive Chamæpyxos quibusdam *J. B.* Pseudo-chamæbuxus *Park. Bastard Dwarf-Wor.* Primò observavimus in sylvis Constantiam inter & Scaphusiam, deinde in planitie quadam prope Augustam Vindelicorum, tandem non longe à Tiguro Helvetiæ plurimum, mense Maio florentem.

Hujus varietas floribus albis medio rubescentibus invenitur prope Altdorfum ad saxa humida, quâ ex cœnobio ~~Blankstetten~~ ad proximum montem ascenditur. *Cat. Altd.* D. Jacobus Breynius plantam hanc Polygoni Astragaloides vulgare Buxi folio appellat. *Prod. z.* D. Paul. Hermannus Astragalum humilem Buxifolium Ego cur ad Astragalum referat non satis rationis video, quin potius anomalam & sui generis fruticulum censeo.

Anthyllis leguminosa purpurascens flore *Clus.* Loto affinis flore subrubente *C. B.* Anthyllidis leguminosæ vulgaris varietas *Park.* Purple-flower'd Ladies finger. In agrorum marginibus circa portum Liburnum, & alibi in pascuis Italiæ.

Anthyllis altera herbariorum *Park. v.* Chamæpitys moschata marina incana *v.* Paronychia. leguminosa Hispanica *v.* Trifolium halicacabum & Auricula muris.

M. Anthyllis Dioscoridis *Alpin. exot. Bot. Monsp. App.* Oritur in locis incultis & paludosis quæ æstate exsiccantur prope *Perauls* circa locum dictum *Lou Boulidou.*

dou. Flores pentapetali albi, in extremitate leviter purpurascens reflexi, stylo in medio albo, staminibus apicibus purpurascens donatis.

Anthyllis leguminosa vesicaria Hispanica Park. v. Lotus vesicaria.

M. Anthyllis marina Narbonensium altera Chamæfyces facie Ad. Valentina Clus. Valentina Clusii Ger. maritima, Chamæfyce similis C.B. Anthyllidis species quibusdam J. B. Polygonum Valentinum, five Anthyllis Valentina Clusii Park. Valentia Knot-grass. In maritimis Perauls, & in monte Cetio Maio & Julio mensibus cum flore reperit D. Magnol.

Antirrhinum luteum Ger. luteo flore C. B. flore luteo grandi Cam. flore subluteo Dod. Great Yellow Calves-Snout. Circa Messanam in muris copiosè; unde Petrus Castellus in Catalogo plantarum Messanensium Messanense illud denominat. Invenimus insuper in rupibus non procul à Petra Sancta Hetruriae oppido. Antirrhinum maximum flore flavo amplo, folio lato, non ineptè possit denominari.

Antirrhinum purpureum Ger. majus alterum folio longiore C. B. vulgare J. B. In aggeribus fossarum & ad lepes prope Monspelium abundè. Qu. An & quomodo ab hoc differat Antirrhinum majus flore roseo Cam. hort. quod in agro Monspelienfi crescere notat, nec alibi sibi visum testatur C. B. in Phytop. Cat. Com.

Antirrhinum minus seu medium flore carneo, rictu striato. In Italia & Sicilia copiosè.

M. Antirrhinum album serrato folio J. B. folio dissecto C. B. Copiosè inveni æstate media in ora maritima, vulgo Plage, quæ respondet prædio dicto Arèsquies inter juncos, versùs Miravallem & Frontignanam, inquit D. Magnol. Persimile est Cristæ galli nostræ spicata Messanensi.

M. Antirrhinum saxatile Serpylli folio C. B. prod. Botan. Mansp. ubi descriptionem & iconem ejus vide. Inter rupes montis Capouladou, tum & in locis Garrigues dictis inter Leverune & Pignan copiosum invenit D. Magnol. Maio & Junio mensibus cum flore.

Aparine fructu Coriandri saccharati *Park* Goose-grass with Seed like Coriander Comfits. In insula ad Prom. Pachynum & alibi in Sicilia, necnon circa Monspelium.

M. Aparine minima, vel Rubia Saxatilis minima *Bot. Monsp. App.* ubi descriptionem vide. Æstate floret in alperis circa *la Valette* & *la Colombiere*. Satis accedit ad Rubeolam Saxatilem *C. B. prod.* Sed non est incana. Figura prima Rubiæ angulosæ asperæ *J. B.* illam optime repræsentat.

A. Aparine lavis strigosior odoratior & Saxatilis *Cat. Altd.* An Rubeola Saxatilis *C. B.* Circa *Hohenstein* mensis Junio.

Aphyllanthes Monspeliensium. v. Caryophyllus.

Aphyllanthi affinis &c. v. Scabiosa.

Apium montanum nigrum *J. B. VI.* seu montanum folio ampliore *C. B.* Ejusdem *Ap. VIII.* seu montanum nigrum, ex sententia fratris *J. B.* necnon Daucus *VI.* seu montanus Apii folio minor, adeoque ex una planta tres facit. Apium montanum vulgatus & Apium montanum Parisiensium *Park* Oreoselinum *Ger.* Veeltguta *Dod* nomine Germanico dicta, i. e. Polychreston, ut Cordus eam vocat. Ad latera montis Jura non procul Geneva & in Germaniæ montosis passim.

† Apium petraeum seu montanum album *J. B.* An Daucus montanus Apii folio minor à *C. B.* in *Prodr. depictus*? *Pimpinella Saxifraga hircina* media *Herbariis* nostratibus. In rupibus prope Danubium non longè à Ratisbona; item in monte Jura non procul Geneva.

H. Apium palustre minus cauliculis procumbentibus, ad alas floridum *Herman. Cat. Leyd.* Locis undosis & aquosis Belgii luxuriat.

A. Apium Sylvestre lacteo succo turgens *C. B. Sylv.* five Thysselinum *Ger.* Thysselinum five Apium Sylv. *Park.* Apium Sylv. *Dodonæi*, Thysselinum quorundam, planta lacteo succo turgens, humidis locis proveniens *J. B.* In *Alnetis* n. m. Julio versùs *Offic. laterum*, & post domum pauperum *Cat. Altdorf.* In *Alnetis* juxta *Blæsas Moris.* Habetur etiam in *Cat. Holl.*

Apium

- Apium peregrinum* v. *Daucus tertius* Dioscoridis.
Apocynum latifolium amplexicaule *J. B. v.* *Scammonea*
Monspeliaca.
- B. Aquilegia montana* parvo flore, thalictri folio *C. B.*
prod. In Helvetiorum Alpibus, inque Moravia prope
 urbem *Trevis* in pratis copiosè.
- B. Aquilegia montana* magno flore *C. B. prod.* In monte
 prope thermas *Fabarias* copiosè.
- B. Argemone Alpina lutea* *C. B. prod.* In montis *Snee-*
berg *Austriæ* præruptis. *Burser.*
- Arbor Judæ* *Lob. Ger. Park.* *Judaica arbor* *J. B.* *Sili-*
qua *Sylv. rotundifolia* *C. B.* *Judas-Tree.* Primò
 observavimus in collibus *Romæ* vicinis, *Tyberi* fluvio
 imminentibus, deinde in *Apenninis* montibus. *Mon-*
speli juxta fluvium *la Maussou* versùs *Salenovam*
Martio & *Aprili* mensibus flores profert, qui aceto
 condiuntur. *Botan. Monsp.* Monte *Libano* frequens
Rauwolf.
- † *Arbutus* *Ger. Park.* *Arb. Comarus* *Theophrasti* *J. B.*
Arbutus five *Unedo* *Lob.* *Arbutus* folio serrato *C. B.*
Strawberry-Tree. In *Siciliæ*, *Italiæ* & *Galliæ*
Narbonensis Sylvosis plurima.
- S. Arisarum angustifolium minimum* *P. Boccon.* Ad
Saccam, mediis in faxis, & in saxorum fissuris seu ri-
 mis, in loco *la Pirrera* dicto *D. Boccono* obvia facta
 est.
- S. Arisarum Potamogeiti* folio *Boccon.* Natales illi
Saccæ & *Panormi* in sylvula fratrum *S. Mariæ* à
Jesu.
- Arisarum latifolium* *Park. Ger.* latifolium quibusdam *J. B.*
 latifolium alterum *C. B.* *Broad-leaved friers Cowl.*
 In aggeribus sepium & umbrosis, itinere inter *Mas-*
sam & *Lucam* copiosum vidimus: postea etiam in
 Gallo-Provincia, prope *Tolonam* portum, ad monti-
 um latera. Invenitur etiam circa *Monspelim.* v.
Botan. Monsp.
- M. Aristolochia longa* *J. B. Ger. vera* *C. B. Park.*
Long-rooted Birthwort. In campis circa *Lateram*
 in agro *Monspessulano* copiosè oritur *Botan. Monsp.*

- C. Aristolochia longa altera Clusii *J. B.* longa Hispanica *C. B. Park.* Inter vites regno Valentino frequentissima.
- Aristolochia rotunda *Lob. Ger. J. B.* rotunda vulgatio *Park.* rotunda, flore ex purpura nigro *C. B.* In Italia passim ad sepes & in aggeribus fossarum.
- Aristolochia polyrrhizos *J. B.* Arist. Pistolochia dicta *C. B.* Pistolochia *Ger.* Pistolochia vulgatio *Park.* ~~Many-rooted Birthwort.~~ In agris propè Sellam novam Agri Monspelienfis, sub oleis: alibi etiam in vineis ficcioribus.
- Aristolochia Saracenica *Ger.* clematidis *Park.* clematidis recta *C. B.* clematidis vulgaris *J. B.* ~~Creeping Birthwort.~~ Circa Monspelium in vineis, fossis & aggeribus plus satis luxuriat. Vineis nostris maxime infensa est (inquit *D. Magnol.*) ob tetrum odorem, quem vino communicat.
- S. Aristolochia rotunda altera *P. Bocc. Park.* Clusii *J. B.* rotunda flo. ex albo purpurascente *C. B.* ~~The other round-rooted Birthwort.~~ In Sylvula ad radicem montis Madonix in Sicilia.
- C. Armerius simplici flore Pannonicus *Clus.* barbatus hortensis angustifolius *C. B.* Armerius angustifolius rubens simplex *Park.* Betonica coronaria minus latifolia flore profundè dissecto *J. B.* Armerius suave-rubens *Ger.* In quibuldā pratis *Nemethwayar* vicinis.
- Armeria prolifera *Ger. v. Caryophyllus* prolifer. rubra *Ger. v. Caryophyllus* Sylv.
- Arum venis albis *C. B.* magnum rotundiore folio *Park.* majus Veronense *Lob.* Primò in insulis circa Venetias nobis animadversum, Novembri adhuc mense virens, foliis viridibus, vulgaris duplo majoribus, venis albis, postea & alibi in Lombardia.
- Z. Arundo sacra Rheni Bononiensis Plinio *Zanoni.* Perforatam vocat *Zanoni*, quoniam non penitus solidā est, & medulla plena.
- Z. Arundo sacra vallium Ravennæ *Zanoni.* An Ar. sacra geniculata sive sagittalis *C. B.* In Sylvis & vallibus Ravennensibus.

Asarum

- Asarum* *Lob.* Ger. C. B. *Ʒ. B.* vulgare *Park.* *Asarabacca.* In Sylvis ad latera montis Juræ qua ascenditur ad verticem *Dole.* In monte Muteto & *Monchenstein* prope *Basileam* *Cat. Bas.*
- Asclepias* *Lob.* flore albo Ger. *Park.* C. B. *Ascl.* seu *Vincetoxicum* multis floribus albicantibus *Ʒ. B.* Per Germaniam, Italiam, Galliam *Narbonensem* ad sepes & in dumetis ubique feré. *Swallow-wort* with a white flower.
- M. *Asclepias* nigro flore C. B. Ger. *Park.* flore nigro quorundam *Ʒ. B.* *Black-flower'd Swallow-wort.* Vidit *D. Magnol* in luco *la Colombiere* & *Valena* sylva Maio mense cum flore.
- Aspalathus* secunda *Monspeliensis* *Ʒ. B.* alter *Monspeliensis* *Park.* *Genista-spartium* spinosum majus primum seu flore luteo C. B. In aridis & sterilibus Saxosis collibus circa *Monspelim*, *Nemausum*, & alibi in *Gallia Narbonensi*.
- Asparagus* marinus *Ʒ. B.* marinus crassiore folio *Park.* marit. crassiore folio C. B. palustris Ger. *ελειΘ* seu palustris *Galeno.* Sea or Marsh *Sparagus.* In palustribus prope marinum *Volcarum* stagnum non longè à *Monspelio.* Mihi quidem non visa est hæc planta differre ab *Asparago Sativo*; at *D. Magnol* aliter videtur. Licet enim (inquit) ambo circa *Aquas mortuas*, vulgò *Aigues mortes*, in iisdem fere locis oriantur, istius turiones dulces sunt, maritimi autem amari, folia etiam in isto tenuiora sunt, in maritimo crassiora.
- Asparagus* petraeus sive *Corruda* Ger. petraeus sive *Corruda aculeata* *Park.* *Corruda* *Ʒ. B.* *Asparagus* foliis acutis C. B. Rock or prickly-leaved *Asparagus.* In Italia ad sepes & in dumetis frequens; nec minùs circa *Monspelim* in vinearum sepibus.
- Asparagus* Sylv. aculeatus Ger. aculeatus, spinis horridus C. B. spinosus, sive *Corruda* spinis horrida *Park.* Thorny *Sparagus.* In insula promontorio *Pachyno* adjacente, & alibi in maritimis *Siciliæ.*

Asparagus aculeatus Siculus. *Prickly Sparagus of Sicily.* Ad mare propè Tauromenium in Sicilia. Hunc in Catal. nostro exterarum pro *Asparago Sylv. spinoso* Clusii *Ger.* habuimus. Verùm collata planta cum icone & descriptione Clusiana diversum agnovimus. Descriptionem vide in *Hist. nost.*

Asperula flore coeruleo *Ger. Park.* coerulea arvensis C. B. *Rubia coerulea erectior elatiorve* *J. B.* In monte Saleva inter Segetes, item prope Neapolin Austriacam & Monspelium. *Wlex Woodruff.*

Col. *Asperula verticillata muralis minima* *Col.* muralis minima *Park.* verticillata luteola C. B. In vetustis muris & saxosis locis in castro *Villa* dicto, in Valvensium montibus.

Asphodelus luteus *Ger. J. B.* lut. minor *Park.* luteus & flore & radice C. B. *Yellow Asphodil or Kings-Spear.* In insula ad Promontorium Pachynum & alibi in Sicilia.

† *Asphodelus bulbosus* Dodonæi, seu *Ornithogalum spicatum* flore virente *J. B.* *Asphodelus bulbosus* *Ger.* *Ornithogalum angustifolium majus*, floribus ex albo virescentibus C. B. *Asphodelus bulbosus* Galeni, seu *Ornithogalum majus* flore subvirescente *Park. parad.* *Spiked Star of Bethlehem with a greenish flower.* Inter Segetes unâ circiter leuca à Geneva versùs Salevam montem. Quamvis planta hæc in Anglia oritur, quoniam uno duntaxat quod sciam in loco, eam omittere nolui.

Asphodelus major ramosus flore albo *J. B.* major albus ramosus *Park.* albus ramosus mas C. B. ramosus *Ger.* *Great white branched Asphodil.* In montibus Messanæ imminentibus, atque etiam in collibus saxosis agri Monspelienfis. *Cat. Rom.*

Asphodelus minor *Clus.* albus non ramosus C. B. non ramosus *Ger.* *Great white Asphodil or Kings-Spear not branched.* Circa Syracusas & alibi observavimus. In paucis à præcedente differt, & utrumque eodem titulo comprehendit *P. Magnol.* In Hispan. *Clus.*

Asphode-

Asphodelus minor foliis fistulosis v. *Phalangium Cretæ Salonensis*. *Lancastriæ* verus *Ger. emac.* v. *Pseudo asphodelus*.

Aster Atticus *Italorum* flore purpureo *Park.* *Italorum Lob. Ger.* *Atticus* cœruleus vulgaris *C. B.* *Att.* purpureo & albo flore *J. B.* In asperis *Germaniæ* collibus circa *Rhenum* & alibi. Duplex habetur, latifolius & angustifolius.

Aster purpureus montanus J. B. *Alpinus* cœruleo magno flore *Park.* *montanus* cœruleus magno flore, foliis oblongis *C. B.* *Aster 7. Clusii Ger.* *Wlew mountain Starwort with a large flower.* In summis jugis montis *Juræ*, necnon in montibus maximo *Carthusianorum Cœnobio* imminentibus.

B. Aster cœruleus hirsutus *Austriacus* magno flore *C. B.* *prod.* qui cavendum monet nè cum præcedente confundatur. In *Austria* circa *Kremsam*.

Aster Alpinus longifolius flore purpurascente nobis. *An Asteri montano* purpureo similis *J. B.* *Mountain Starwort with a purplish flower.* In montibus sylvosis maximo *Carthusianorum Cœnobio* vicinis. Ab aliis speciebus distinguitur barbulis florum brevioribus.

Aster Tripolii flore *C. B.* minor angustifolius *Park.* *Atticus Monspelienfis* purpureus angustioribus foliis *J. B.* minor *Narbonensis*, *Tripolii* flore, *Linariæ* folio *Lob.* In prato juxta molendinum *Castri novi*, inque sylva *Valena*, & alibi propè *Monspelim*. Augusto & Septembri mense flos gravem *Croci* odorem spirat *Botan. Monsp.*

Aster Atticus Ger. Caf. *Atticus* luteus verus *Park.* luteus foliolis ad florem rigidis *C. B.* *Chrysanthemum Asteris* facie, foliis circa florem rigidis. *J. B.* *Attick yellow Starwort with prickly leaves about the flower.* In *Italia*, *Sicilia* & *Gallia Narbonensi* ubique fere.

Aster montanus luteus, *Salicis* glabro folio *C. B.* *montanus* foliis *Salicis* *Park. Ger.* *Conyza media* *Monspelienfis*, quibusdam *Asteris Attici* genus, folio glabro rigido *J. B.* In collibus juxta *Castelneuf*, & alibi circa

circa Monspelium. Eundem observavimus in Germania juxta Rhenum ex adverso Manhemii, & in sylvis supra Neapolin Italiæ versùs Camaldulensium cœnobium. Aster Pan. salign. foliis 4. Austriacus 2. *Clus. hist.*

Aster supinus *Park.* luteus supinus Clusii *Ger.* luteus supinus spinosus *J. B.* perperam spinolum appellat. luteus 12. seu supinus *C. B.* Dwarf Yellow Starwort. Prope Massiliam ad maris litus.

Aster lanuginoso folio five 5. *Clus.* luteus lanuginosus *Park.* Austriacus 5. Clusii *Ger.* luteus hirsuto Salicis folio *C. B. J. B.* In Germania ad Rhenum; inque Italia ad margines fossarum inter Liburnum & Pisas, semper in aquosis. *V. Cat. Altd.*

Aster Pannonicus major five 3. Austriacus 1. *Clus.* luteus major foliis Succisæ *C. B.* luteus major Austriacus *Park.* lut. foliis Succisæ *Ger.* Great Yellow Austrian Starwort, with Devils-bit leaves. In montosis non semel observavimus tum in Germania tum in Gallia.

Asteris altera species Apula, an Baccharis *Col?* Aster luteus radice odora *C. B.* Circa Messanam Siciliæ collegimus. Conyzæ species est. Cirinolæ in Sylvula prope D. Rocchi ædem, at in monte Maiella copiosius.

M. Aster Atticus luteus montanus villosus magno flore *C. B.* Aster montanus alter, folio & caule hirsutus *Ad.* In monte *Capouladou* Junio mense cum flore reperitur, tum etiam in campetribus & squalidis montis Lupi. *Bot. Monsp.* Hæc species Oculus Christi dicitur.

Aster angustifolius five 6. Austriacus 4. *Clus.* sextus Clusii *Ger.* luteus, Linaria rigido, glabro folio *C. B.* luteus angustifolius *Park. J. B.* In umbrosis montium urbi Viennæ vicinorum pratis; in ipsis etiam collibus herbos, &c.

Z. Aster Ragusinus Verbasci foliis *Zanoni.* Locum titulus indicat.

Col. Aster cernuus *Col.* cernuus Columnæ *Park.* Atticus, foliis circa florem mollibus *C. B.* In monte S. Mariæ Virginis dicto.

Aster annuus Attico luteo similis, &c. v. Chrysanthemum. M. Astra-

M. Astragalus Monspessulanus *J. B.* *Securidaca minor*
Ad. quoad descript. nam icon est alterius plan-
 tæ. Crescit secus vias, prope *Gigan*, at multo fre-
 quentiùs in locis siccis, vulgo *Garrigues*, circa Sa-
 lenovam, & in elato colle dicto *Ferrand.* ad lævam
 Ladi amnis qua respicit Castrum novum. *v. Botan.*
Monsp.

Astragalus Monspelianus candidior, & *Onobrychis* quo-
 rundam *J. B.* An *Astragalus V.* seu villosus floribus
 globosis *C. B.* ? qui *Astragalum Monspelianum* *Clusii*
 huc refert. purpureus *Lugd.* In rupibus montis Salevæ
 Genevam spectantibus copiosè.

Astragalus quidam montanus vel *Onobrychis* aliis *J. B.*
Onobrychis X. seu floribus vicæ majoribus cœruleo-
 purpurascens, vel foliis *Tragacanthæ C. B.* *Ono-*
brychis 4. *Clusii Park.* montana *4.* *Clusii Ger.* In al-
 tissimo vertice montis Juræ *Thuri* dicto. *Synonyma*
 huic plantæ non conveniunt.

M. Astragalus incanus *Siliqua incurva Botan. Monsp. C. B.*
prod. Sub nomine *Onobrychidis incanæ* describitur.
 In via qua itur ad montem Lupi Aprili mense cum
 flore reperitur, & abunde etiam inter vicas *Affas &*
Fontanes.

C. Astragalus Alpinus Helveticus C. B. *Alpinus Park.*
2. Clus. *Astragaloides Helvetica J. B.* In Canta-
 bris Helvetiorum Alpibus, atque etiam Pannonicis
Clus.

Astragalus major Fuchsi v. Orob. *Sylvaticus.*

Astrantia nigra Lob. nigra seu *Veratrum nigrum* *Diosco-*
ridis Dod. Ger. *Helleborus niger* *Saniculæ folio major*
C. B. Park. *Sanicula* foemina quibusdam, aliis *Helle-*
borus niger J. B. In Sylvis quibusdam non longè à
 Monachio Bavariz, necnon in Salevæ pratis montosis
 urbi Genevæ vicinis. *Wastard black Hellebore or*
Black Mafterwort.

Astrantia nigra Alpina minima nobis. *Helleborus mini-*
mus Alpinus Astrantiæ flore Boccon. In summis mon-
 tium max. *Carthusianorum* coenobio vicinorum jugis.
 Hanc in Catalogo exterarum pro *Helleboro nigro Sa-*
 niculæ

niculæ foliis minore C. B. *Park.* habui, & an differat specie necne mihi nondum planè satisficit. v. *Hist. nost.*

Atractylis Lob. Ger. lutea C. B. flore luteo *Park.* vera flore luteo *J. B.* *The Distaff-Thistle.* In Italia, & Gallix meridionali parte ad vias, & in agrorum marginibus ubique fere.

M. Atriplex Monspessulana cum pulchris involucris *J. B.* sylv. lappulas habens C. B. *Phyt. Park.* Passim circa Monspesium reperitur, inquit *P. Magnol.*

S. Atriplex minima angustifolia maritima P. Boccon. ex *Stoechalibus* insulis allatam habuit. In Hollandia invenitur & à *P. Herman.* *Atrip. marit.* folio integro angustissimo denominatur.

H. Atriplex maritima angustifolia non descr. *Cat. Hol.* An *Atriplex angustifolia maritima dentata* nostra *Hist. p. 193* ? an eadem præcedenti ?

† *Atriplex marina Ger. maritima J. B. maritima lacinia- ta C. B. marina repens Park. Sea-Drache.* In litoribus arenosis maris Mediterranei nusquam non obvia.

Avicularia Sylvii J. B. v. Speculum Veneris.

Auricula muris Camerarii J. B. Anthyllis leguminosa marina Batica vel Cretica, sive Auricula muris Camerarii Park. Loto affinis 4. seu hirsutis circinatis filiquis C. B. In insula ad Promontorium Pachynum ubi Arx præsidio Hispanico tenetur.

Auricula urfi flore purpureo Ger. A. U. sive Primula Veris Alpina flore rubente J. B. Sanicula Alpina purpurea C. B. Primò invenimus in Alpibus non longè à *Pontieba* vico, qui ab ea parte limes est ditionis Venetianæ : postea etiam in clivis maritimis Regni Neapolitani ; tandem in Alpibus *Chambery* inter & max. *Carthusianorum* cœnobium.

C. Auricula urfi flore luteo J. B. Ger. urfi lutea Park. Sanicula Alpina lutea J. B. Yellow Bears-Ears or Dracola's. In *Sneberg, Neuberg, Etscher,* aliisque vicinis *Austriæ & Stirix* Alpibus.

C. Auricula urfi carnei coloris, foliis minimè serratis J. B. urfi 4. Clus. Sanicula Alpina rubescens folio non serrato C. B. In *Sneberg* reliquisque vicinis jugis & *Stirix* Alpibus frequens. C. Au-

- C. Auricula urfi angustifolia, colore rubente *J. B. urfi*
 7. *Clus.* Sanicula Alpina angustifolia C. B. In quibusdam Stiria & Carinthia Alpibus, præsertim Tauro monte & Judenberg jugis.
- C. Auricula urfi minima flore carneo & niveo *J. B. urfi*
 8. minima *Clus.* urfi minima alba *Park.* Sanicula Alpina minima crenata C. B. item Alpina minima nivea *ejusdem.* In summo Sneberg jugo, inque Tauro & Judenberg montibus.
- B. Atriplex sylvestris fructu compresso roseo vel stellato
 C. B. Monspeffuli circa moenia collegit C. B. v. *Hist. nost. p. 192.*

B.

- B** Arba capræ floribus oblongis, Melandryon
 Plinii C. B. Barba capri *J. B. Ger. emac.*
 Ulmaria major seu altera *Park.* Prope Genevam à la Bastie. Invenimus & in Helvetia non longè à Scoephusia,
Balsamita v. Ageratum.
- Barba Jovis frutex C. B. *Clus. Park. &c.* Jovis barba pulchrè lucens *J. B. The Silver Shrub called Jupiters Beard.* In clivis maritimis Etruria & Regni Neapolitani copiosè.
- Bellis sylvatica *J. B. media Sylvestris Ger. Sylv. media,* caule carens C. B. In montibus circa Genevam. *The middle wild Daisie.*
- M. Bellis montana folio obtuso crenato C. B. *Park.* Monspelio habuit C. B. versùs *Vagan, &c.* at D. Magnol in descensu montis Capouladou à las Cambrettes inter rupes umbrosas.
- M. Bellis montana minor *J. B. quæ de hac planta habet D. Magnol in Botan. Monsp. vel in Hist. nostra vide.*
- M. Bellis montana gramineis foliis *Bot. Monsp. App. ubi & descriptionem vide.* In planitie montis *Serane* oritur, & Maio floret.
 T. Bel-

- T. *Bellis minima annua Triumphetti.* In locis Romæ vicinis, præsertim aridis & incultis, & arvis restibilibus mira fecunditate luxuriat, Februario & Martio florens, brevique ex toto deperditur.
- B. *Bellis Alpina minor C. B. prod. rigido folio Park.* In Valesia supra *Gemme* & supra *Thermas fabarias.*
- B. *Bellis montana major folio acuto C. B. Park.* *Bellidis Alpinae* alia species minor, folio non rigido *J. B.* In montibus *Euganeis.*
- B. *Bellis maritima foliis Agerati C. B. Park.* In insulis *Stoechadibus* in arenosis. *Burserus.*
- Bellis Alpina major folio rigido C. B. Park.* *Great Mountain Daisie, or Ox-Eye with a stiff Leaf.* In summis jugis montis *Juræ* copiosè.
- Bellis cœrulea Monspeliaca Ger. cœrulea II. five caule folioso C. B.* *Aphyllanthes Anguillare,* five *Globularia Bellidi* similis *J. B.* *Globularia Monspelienfium, Bellis cœrulea Park.* Circa *Monspelium* plurimis in locis, quin & ad radices montium *Juræ* & *Salevæ* propè *Genevam,* & alibi tum in *Italia,* tum etiam in *Germania.*
- Bellis cœrulea caule nudo C. B.* *Blue Globular Daisie with a naked Stalk.* In *Sylvis* & montibus max. *Carthusianorum* *cenobio* vicinis. Hæc priore elatior est, foliis angustioribus longioribusque caule prorsus nudo; & ab eadem specie diversa, quicquid *J. B.* repugnat.
- Beta *Cretica spinosa Park.* *Cretica* semine spinoso *J. B.* semine aculeato *Ger. minor V. seu Cretica* semine aculeato *C. B.* In insula ad *Promontorium Pachynum Siciliae.* Weet with prickly Seed.
- A. *Betonica major ramosa, Mauritiana dicenda Cat. A'd.* In adfensu ad *Mauritii* montem versus *Meridiem,* & in pratis versus *Septentrionem gegen Schonberg.* Men. Junio & deinceps.
- C. *Betonica flore albo Clus. J. B. C. B. Ger. Park.* In ascensu montis *Neuberg.* *Etscheri* jugis, sed omnium abundantissime supra *Zeehof* ultra *Gamingam* quâ iter est in *Herrenalben* & *Durrenstein.* Adeo in paucis differt à vulgari *Betonica,* ut specie distinctam vix putem.

Bistorta Alpina media C. B. minor Alpina Park. minor seu Alpina *Cam.* in *Matth.* The middle sort of *Wistort* or *Snake-weed*. In herbosis jugis montis Juræ circa *Thuri*. Bistorta nostrate minore Westmorlandica omnibus partibus major est, & ab ea specie distincta.

B. Bistorta Alpina maxima C. B. prod. In altissimis Silesiorum montibus, ut in Sudetorum jugis.

Betonica Alpina hirsuta lutea Hormini foliis. In montibus max. Carthusianorum cœnobio imminentibus collegimus. Descriptionem vid. Hist. nost. p. 547.

Blattaria lutea J. B. lutea minor seu vulgaris Park. lutea folio longo laciniato C. B. flore luteo Ger. *Yellow Moth-mullein*. Variis in locis hanc observavimus tam in Germania quàm Italia & Gallia Narbonensi. Solo floris colore, à satione orto, differt ab hac Blattaria flore albo; siquidem ex semine hujus sato oritur, ut in hortulo nostro Cantabrigiæ sæpius experti sumus. In *Cat. Rom.* invenitur.

Blitum rubrum majus C. B. Ger. pulchrum, rectum, magnum rubrum J. B. *Great red Blite*. In hortis oleraceis circa Monspelium & alibi, sponte an satum nescio.

Blitum rubrum minus an album minus J. B. C. B. Ger. minus Sylv. rubrum Park. *Small red or white Blite*. In vineis, hortis & fimetis circa Monspelium & alibi. Quomodo, & an omnino specie differant Blitum rubrum minus & album minus, mihi non satis constat. Quod in Germania circa Basileam & alibi tam copiosè provenit, videtur esse album minus: quamvis C. B. in Catalogo Basil. utrumque ponit.

Botrys Ger. vulgaris Park. Ambrosioides vulgaris C. B. Botrys plerisque Botanicis J. B. *Dak of Jerusalem*. In arenosis circa Rhenum in Calabria, Florentiam in Etruria, & Nemausum in Gallia Narbonensi.

Botrys verticillata seu Chamædryoides v. Chamædryis foliis laciniatis.

Branca ursina v. Acanthus Sativus.

Briza monococcos Ger. Zea Briza dicta vel monococcos Germanica C. B. Zea monococcos, sive simplex, sive Briza Park. Zea monococcos seu Briza quibus-

- dam *J. B.* In Germania Argentoratum inter & Basileam ejus segetes vidimus.
- B.** Brassica Sylvestris ramosa, tota pene glabra *C. B.* item Sylv. foliis circa radicem Cichoraceis *ejusdem.* Turritis major *Clus.* Turritis major *Ger. Park.* Glabris foliis Cichoroides *J. B.* Great Tower-Mustard. Ad margines Sylvarum cæduarum post Brackensfels Maio. *Cat. Altd.* Circa Basileam in sabuletis ad Rheenum.
- S.** Brassica Sylvestris Fabariæ foliis. *Paul. Boccone* ad Tauromenium invenit. Non differt à Brassica sylvestri secunda *Clusii* nisi radice, quæ huic perennis est.
- B.** Brassica sylvestris Alpina *C. B.* Turritis Alpina *Park.* In montibus Austriæ. *Burserus.* Quæannon eadem sit cum Barbarea murali *J. B.*
- A.** Brassica campestris albo flore *Clus.* camp. perfoliata flore albo *C. B.* Perfoliata Siliquosa *J. B. Ger.* Siliquosa vulgaris seu Brassica campestris *Park.* Codded Chorow-wax with a White flower, or Field-Colewort. In arvis circa Altdorfium Aprili & Maio.
- B.** Bryonia lævis five nigra baccifera *C. B.* In Sylva Huningensi arborescendit, *Cat. Bas.*
- Buglossum angustifolium** *Lob.* angustifolium minus *C. B.* vulgare angustifolium minus *J. B.* minus sativum *Park.* Ad vias & agrorum margines in Italia, Gallia, Germania. Vulgare angustifolium majus circa Messaniam in Sicilia observavi. Narrow-leaved Bugloss. Variat flore albo.
- H.** Buglossum Sylvestre minus alterum & asperius *C. B.* *Park. Cat. Holl. Commel.*
- † **Buphthalmum vulgare** *Ger.* Dioscoridis *C. B.* Narbonense *Clus.* Matthioli, five vulgare Millefolii foliis *Park.* Chamæmelum chrysanthemum quorundam *J. B.* Variis Germaniæ in locis, ut v. g. in muris oppidi Bonnæ non procul à Colonia. In Italia circa Florentiam urbem in alveis torrentium. Supra Augustam in dumetis versus Rheinfelden. *Cat. Basil. True Ox-Eye.*

Buphthal-

Bupthalmum *Cotulæ* folio *C. B.* alterum *Cotulæ* folio *Park.* tenuifolium folio *Millefolii* fere *J. B.* *Chrysanthemum tenuifolium Bæticum Boelii Ger. Yellow Ox-Eye with Camomile leaves.* In arvis circa portum *Liburnum* in Italia. Est hæc etiam ex sententia *J. B.* *Bupthalmum* caule & flore purpurascente *C. B.*

T. Bupthalmum Alpinum flore candido *Triumfetti.* In *Alpibus Castilionensibus* Autumno brevius & non ramosum; in monte *Cavi* æstate cubitale & ramosum.

C. Bupthalmum Dodonæi, aliis consiligo tenuifolia *J. B.* *Bupthalmum* sive *Helleborus niger ferulaceus Ger. Helleborus niger Ferulaceus Park.* niger tenuifolius *Bupthalmi* flore *C. B.* In omnibus apricis collibus, & siccioribus gramineis campis, utriusque *Pannoniæ* & *Austriæ* vulgaris; *Junio* & *Jul.*

Bupleurum folio subrotundo sive vulgatissimum *C. B.* *Auricula leporis umbellâ luteâ J. B. Round-leaved common Hares-Ear.* *Parkinsonus* & *Gerardus* vel hanc speciem omittunt, vel *Bupleurum angustifolium*, minus rectè ut mihi videtur, nuncupant. In *Germaniæ* & *Italiæ* montosis, ad sepes & in dumetis.

Bupleuron latifolium Monspeliense Ger. I. seu folio rigido *C. B. latifolium Park.* *Auricula leporis altera sive rigidior J. B.* In sylvis & dumetis circa *Monspelim* frequens *Stiff-leaved Hares-Ear.*

Bupleurum angustifolium annuum Monspeliense nobis & Magn. angustifolium Dod. angustifolium Monspeliense Ger. Narrow-leaved annual Hares-Ear of Montpellier. In lapidosis circa *Mommau, la Colombière & la Valette* *Julio* & *Augusto* mensibus, imo & serius floret. Specie differt à sequente.

Bupleurum minimum seu *Auricula leporis minima J. B.* An *Bupleurum minimum Col?* angustissimo folio *C. B.* *The least Hares-Ear.* Hanc speciem, quamvis in *Anglia* sponte oriatur, quia tamen rarior est, à *C. B.* autem in *Cat. Basil. præterita*, cum in pascuis propè *Basileam* invenerim, omittere nolui. Inveni etiam circa *Monspelim*,

Bursa marina, & Alcyonii genus 4. Dioscoridis *Cas.* Arancio marino *Imper.* Algæ pomum Monspeliensium *J. B.* Alcyonium XII, sive Bursa marina Cæsalpini *J. B.* *Sea Oranges.* Austro paulò vehementius flante in litore passim conspicitur. *Botan. Monsp.* Ego in litoribus Siciliæ arenosis inveni.

B. Bursa pastoris major folio non sinuato *C. B.* Vid. *C. B.* *Prod.* ubi describitur. Circa Basileam.

† Bursa pastoris major loculo oblongo *C. B.* Draba minima muralis Dioscoridis *Col.* Thlaspi Veronicæ folio Monspeli dicta. *Park.* Locis campestribus & siccioribus ad Bursam, & circa D. Jacobum, & supra *Bruglingen* in collibus, & Rheni ripa. Differt à Paronychia vulgari & *Lob.* foliis & caule majoribus, fructu verò minore, sicuti & flore; & etiam petiolis: nec ità in campestribus pratensibusque locis, sed parietinis saxisque humentibus frequens frigidioribus. Sapor acris admodum etiam virentis in flore & semine. *Col.* Nos medio circiter itinere inter Lucam & Pisas ad sepes observavimus. Invenitur etiam in Anglia.

B. Bursa pastoris Alpina hirsuta *C. B. prod.* In Alpibus Helvetiorum, ut monte *Fraeto* & *Spliegel.*

C.

Cacalia quibusdam *J. B.* folio glabro *Ger.* glabro folio acuminato *Park.* III. seu foliis cutaneis acutioribus & glabris *C. B.* *Smooth-leaved Mountain Coltsfoot.* In sylvis montium Juræ & Salevæ prope Genevam.

C. Cacalia incano folio *Ger.* folio rotundo incano *Park.* foliis crassis hirsutis *C. B.* Cacalia quibusdam *J. B.* In omnibus Austriacis Stiriacisque jugis, ad sylvarum margines inter frutices & umbrosis locis.

Cacubalum *Plinii v.* Alsine baccifera.

Calamintha montana præstantior *Lob. Ger. Park.* Montana, flore magno ex calyce longo *J. B.* magno flore *C. B.*

- C. B. Fatr-flower'd Mountain Calamint.* In montibus prope max. Carthusianorum coenobium. Invenimus & in montosis Etruriæ sylvis.
- Calamintha montana* Acini aut Serpylli foliis. Calaminthæ clinopodii Austriaci foliis, odore Pulegii icon apud *D. Plukenet*, Phytograph. p. 3. huic convenit, nisi quod marginibus prorsus æqualibus pingatur. Invenimus hanc inter plantas nostras siccas, ubi collectam non recordamur.
- C. Caltha palustris* flore pleno *Clus. hist.* In Salzburgeris pratis copiosè. Hanc quamvis pro distincta specie non habeo, quia ramen insignis est varietas omittere nolui, præsertim cum copiosè ibidem provenire dicatur.
- Caltha arvensis* *C. B.* simplici flore *J. B.* *Calendula* simplici flore *Ger.* *Small wild Marigold.* An *Caltha minima* *J. B.* ? Circa Monspelium, Liburnum, &c. ad agrorum margines & inter segetes passim.
- Campanula arvensis* erecta, &c. *C. B. v.* *Speculum Veneris.*
- Campanula minor rotundifolia Alpina* *C. B.* *Round-leaved mountain Bell-flower.* In Alpibus Stiriacis & Carinthiacis. Hujus folia ex rotunditate oblonga sunt & serrata, eo ferè modo quo *Saniculæ* Alpinae guttatae. In monte *Wasserfal*, & circa Castrum *Ramstein* Basiliensium. *Cat. Basil.*
- B. Campanula Alpina latifolia* flore pullo *C. B. prod. Park.* In Alpibus Austriacis, ut *Sneeberg* & aliis *Burgen.*
- B. Campanula rotundifolia minima* *C. B. prod.* In Rhætorum Alpibus inter saxa.
- B. Campanula Serpyllifolia* *C. B. Park.* *Serpyllifolia* Jo. Bauhini *J. B.* In Baldo cum floribus legit *C. B.* in Rhætia æstate florentem *J. B.*
- B. Campanula foliis subrotundis* *C. B.* *Trachelium* foliis subrotundis *Park.* Helmstadio missa fuit à Sigefrido.
- B. Campanula Drabæ minoris foliis* *C. B. Park.* In pratis circa Vallesianorum thermas.

- B. *Campanula foliis Echii floribus villosis* C. B. *Trachelium foliis Echii* Park. In Baldo & Helvetiorum Alpibus Gothardo & Monte fracto.
- Col. *Campanula Alpina Tragopogi folio* C. B. *Trachelium Tragopogi folio* Clus. *Tragopogi folio montanum* F. Columnæ J. B. Park. In D. Mariæ Virginis monte sic vulgò dicto. Col.
- S. *Campanula rotundifolia Caetana longius radicata* Boccon. E rimis saxorum prope Catanam erumpentem invenit D. Boccone.
- Campanula minor foliis Violæ foliorum æmulis, flore coeruleo.* *Blue Bell-flower with Violet leaves.* In insula parva ad Prom. Siciliæ Pachynum.
- Campanula minor folio rotundo, flore coeruleo, pentagono grandi.* In clivis maritimis Regni Neapolitani. Alicubi hirsuta est, alibi glabra.
- Campanula Persicifolia* Ger. Park. angustifolia coerulea & alba J. B. *Rapunculus glaber* 10. seu *Persicifolius* magno flore C. B. *Peach-leaved Bell-flower.* Observavimus hanc prope Spadam urbiculum acidulis celebrem flore albo; in montibus & collibus Genævæ vicinis flore coeruleo.
- Campanula repens flore minore coeruleo* J. B. An *Trachelium* seu *Campanula hirsuta* VIII. seu *Urticæ foliis oblongis, minus asperis* C. B. ? Hujus meminit Clusius in Historia cap. de Trachelio, quem consule. In arvis inter segetes prope Genevam & alibi.
- S. *Campanula hirsuta, Ocimi folio caulem ambiente, flore pendulo* Boccone. Messanæ in loco dicto *lo Ringo* nascitur.
- Campanula* seu *Trachelium* parvum folio *Bellidis subrotundo.* *Round or daisie-leaved Throatwort.* Circa Messanam in collibus. Radix ei alba, simplex, lignosa, annua: Caulis erectus, striatus: Folia alternatim posita, subrotunda, sine pediculis caulibus adnexa. Flores *Trachelii* majoris.
- Campanula montana foliis Succisæ, flore magno.* *Rapunculus montanus* seu *Trachelium montanum* J. B. *Mountain Throatwort with Devilsbit-leaves.* Invenimus inter *Gluckrietz* & *Mertzenschlag* in montibus

tibus Austriam & Stiriam determinantibus.

B. M. Campanula Alpina Linifolia cœrulea C. B. Park. Camp. linif. cœrulea, vel Rapunculus linifolius cœruleus *J. B. flax-leaved Blue Bell-flower.* In monte *Wasserfal. Cat. Basil.* Julio florentem collegit *D. Magnol* sub monte *Capouladou* in ipsis rupibus fluvio adjacentibus. Hanc *D. Magnol* in *App. ad Bot. Monsp.* à minori Alpina rotundioribus imis foliis *Clus.* non esse distinctam arbitrat. v. locum.

Campanula lutea Linifolia v. Linum.

Camphorata hirsuta C. B. Monspel. J. B. major Monspeliensium Park. Monspeliensium an Chamæpeuce *Plinii Lob.* Circa Monspelium, Nemausum, Avenionem & alibi in Gallia Narbonensi.

B. Camphorata glabra C. B. Chamæpeuce & Camphorata minor Lugd. Ad agrorum semitas versùs *Othingen Cat. Basf.*

Camphoratæ congener C. B. Camphorata Monspeliensium, quoad figuram *J. B. Anthyllis altera Italorum Ger.* Camphoratæ congener, sive Anthyllis altera Italorum *Park.* In Italia, Germania & Gallia Narbonensi, in arvis & vervactis frequens.

Capparis spinosa folio rotundo Park. rotundiore folio *Ger.* spinosa, fructu minore, folio rotundo *C. B. Spinosa C. B.* qui species hæc non distinguit. *Caper-Bush.* In muris & rudibus Romæ, Senarum, Florentiæ, & alibi in Italia. Circa Tolonam in Gallo-Provincia colitur.

Capparis spinosa folio acuto C. B. sive specie, sive accidentibus tantum à priore differt, auctore P. Magnol circa Monspelium reperitur. Florum gemmæ antequam explicantur decerptæ & muria conditæ ad nos transportantur, & in acetariis & intinctibus locum habent.

S. Capparis Sicula duplicata spina, folio acuto Boccon. Prope Agrigentum frequens, atque oppidum dictum *la Terra di Palmi,* ubi fruticescentem sæpius vidit *D. Boccone.*

Cardamine Alpina media Clus. Alpini media Clusii Park. Nasturtium Alpinum minus foliis in orbem sparsis

sparsis *C. B.* In Stiria inferioris scopulis ad Coenobium *Neuberg.*

Cardamine impatiens vulgo. *Sium minus impatiens* *Ger.* minimum, Noli me tangere dictum, five *impatiens Nasturtii sylvestris folio* *Park.* In Germania juxta Rhenum locis glareosis ubi aquæ scaturiunt. In Italia prope Salernum.

Carduus Chrysanthemus Narbonensis *Ger.* *Scolymus chrysanthemus C. B.* *Scolymus Theophrasti*, five *Eryngium luteum Narbonensium* *Park.* *Yellow Eringo.* In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensi, ad mare præsertim, frequentissimus.

Carduus Chrysanthemus *Dod.* *Scolymus Theophrasti Hispanicus* *Clus.* Prope oppidulum S. Lupiani eundo ad Pedenatium, & alibi circa Monspelium, loca vide in *Botan. Monsp.* Planta est annua, cum præcedens perennis sit.

Carduus Chrysanthemus procerus Siculus caule eduli. An *Scolymus chrysanthemus Africanus* procerior *Hort. Reg. Paris.* Ad radices montis Ætnæ 8. mil. supra Catanam, ubi vulgus cum aceto & pipere caules ejus crudos comedit.

Carduus sphærocephalus latifolius vulgaris *C. B.* *globosus* *Ger.* *Echinopus major* *J. B.* *The great Globe-Chistle.* In montosis Sylvis prope Viterbum, per quas Romam inde itur.

Carduus cœruleus Sphærocephalus minor *C. B.* *globosus minor* *Ger.* *Echinopus minor* *J. B.* *Crocodilium Monspelienium* *Lugd.* *The lesser Globe-Chistle.* In Gallia Narbonensi vulgatissimus habetur.

Carduus galactites *J. B.* *Leucacantha Monspelienium* *Dalech. Lugd.* ex sententia *P. Magnol. J. Bauhines* *Milk-Chistle.* In Sicilia & Melita insulis; in Italia prope pharum Genuensem, necnon circa Monspelium locis ruderatis & incultis.

Carduus lacteus peregrinus *J. B.* *albis maculis notatus* *exoticus C. B.* *Silybum minus Bæticum* *Park.* In Melita & Sicilia insulis. Color seminis in hoc per maturitatem fuscus est, & minimè albus, ut in peregrino Camerarii, proinde rectius refertur ad *Silybum majus*

majus annuum *Park.* & *Carduus lacteus* major annuus
semine fusco inscribitur.

Carduus lanceolatus ferocior *J. B.* *The fiercer Spear-
Thistle, or white flower'd Spear-Thistle.* Primò
invenimus ad fontem quem vocant ardentem, tri-
bus circiter milliaribus seu leucis à Gratianopoli re-
motum, deinde in itinere ab Aurantia ad Nemausum,
tandem prope montem Lupi tribus Monspelio leucis
distantem. Est ei flos albus & major quàm lanceolato
vulgari; mihi tamen nihilo ferocior visus est quàm
ille.

Carduus parvus J. B. minimus Park. *Carlinæ sylvestris*
alia species *Clus. cur. post.* *Acarna capitulis globosis*
C. B. male. An *Carduus minimus Alpin. exot.* *Small*
reticulate headed Thistle. In palcuis sterilioribus
circa *Puzallu* Siciliæ arcem.

C. Carduus mollis *Lapathi folio Clus. J. B. C. B. Ger.*
Circa secundum *Sneberg* montis jugum inter saxa;
deinde etiam in *Etschero*.

C. Carduus mollis angustifolius Park. mollior humilis an-
gustifolius *Clus. J. B. mollis folio oblongo, Cirsii ca-*
pitulo C. B. In summis *Snealbe* jugis.

C. Carduus mollis laciniato folio J. B. C. B. Park. Clus.
foliis dissectis Ger. In tota illa montium catena quæ
à *Calenberg* & *Danubio* cui imminet ad *Alpes* usque
tenditur, &c.

B. Carduus mollis latifolius Lappæ capitulis C. B. Park.
In *Austriæ* monte *Taurerio Rastadiensium*.

T. Carduus pycnopolycephalos sylvestris Triumphetti. In
umbrosis sylvis ultra *Tusculanos* agros, præsertim quæ
itur *Lavicano Anagniam.* Accedit ad *Carduum po-*
lyacanthum secundum *Ger. emac.*

B. Carduus lanceatus angustifolius C. B. prod. In ne-
more ad pontem *Wiesam.*

B. Carduus pratensis polycephalos angustifolius C. B. prod.
In pratis *Michelfeldensibus* frequens.

Carduus Cirsium dictus folio laciniato nigrius J. B. In
montibus circa *Genevam.* Junio cum flore reperitur
circa lucum *Grammontium,* & in marginibus satorum
circa *Momman* & *Salenovam. Botan. Monsp.*

Carduus

Carduus pratensis Asphodeli radice latifolius **C. B.** bulbosus Monspelienfium **Park.** bulbosus Monspelienfis, five **Acanthus** Sylv. quibusdam foliis laciniatis **J. B.** In pratis Monspelio vicinis, locis udis inter **Narcissos** & **Aristolochias.** **Lob.**

Carduus pratensis latifolius **C. B. Park.** pratensis **Trag.** pratensis **Tragi J. B.** ~~Meadow-Thistle~~ with a pale flower. In pratis Rheno vicinis circa **Argentoratum**, **Basileam**, &c. In omnibus pratis humidis & ad rivulos **Cat. Bas. Cat. Rom.**

B. Carduus pratensis Asphodeli radice, foliis profundè & tenuiter laciniatis **C. B. Card.** circium dictus folio laciniato nigrius cum Asphodeli radicibus bulbosis **J. B.** In pratis **Michelfeldæ** **Cat. Basil.**

M. Carduus stellatus foliis integris ferratis **Bot. Monsp.** Juxta rivulum dictum **Vistre** inter **Candiac** & **Vauvert** à clarissimo Viro **D. Tournefort** inventus est.

Col. Carduus Solstitialis mitior **Apulus Col.** In incultis **Cirinolæ** clivosis aridis copiosè.

Carduus Solstitialis **Ger.** stellatus 4. seu luteus foliis **Cyani C. B.** **Cardui** stellati varietas, **Jacea lutea** **Clusii Lob.** **Spina Solstitialis J. B.** **St. Barnaby's Thistle.** In Italia & Gallia **Narbonensi** ubique ferè, præcipue inter sata.

M. Carduncellus montis Lupi **Ad. Lob. J. B.** **Eryngium** montanum minimum capitulo magno **C. B.** **Eryngoides** seu **Carduncellus montis Lupi Park.** Circa montem **Lupi** (inquit **P. Magnol**) sæpiùs vidimus foliis non spinosis, aliquando leviter spinosis.

Carlina Herbariorum **Lob.** humilis **Park.** acaulos magno flore **C. B.** caulifera & acaulis **J. B.** nam hæ duæ sententiâ nostrâ specie non differunt. **Chamaeleon albus Dioscoridis Ger.** ~~The Great Carlina Thistle~~ with and without Stalks. In Germaniæ pascuis sterilioribus frequens, nec minùs in Italia, Gallia **Narbonensi** & circa **Genevam.**

Carlina sylvestris multicaulis, flore flavo, radice perenni. An **Acarna** flore luteo patulo **C. B.?** **Carlina** sylv. minor **Hispanica Clus?** **Julio** & **Augusto** mensibus in squalidis locis ultra **Salenovam**, circa **Sylvam Valenam**

Valenam & montem Lupi invenit *P. Magnol.* In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi non procul à mari copiosè oritur.

B. *Carvisolia* *J. B. C. B.* Carum pratense *Park.* In Montbelgardensi comitatu inter *Blussans* & *S. Mauritium*, item inter *Dampierre* & pontem *Vaujaucort* *J. B.*

A. *Caryophyllata trifolia major* *Cat. Altd.* an montana vulgari similis *Cam. i. e.* vulgaris majori flore *C. B.?* Locum vide in *Cat. Altd.*

A. *Caryophyllata aquatica altera* *C. B. montana 3. Clus.* flore multiplici. In pratis post Mauritianum nonnunquam Maii initio. *Caryophyllata aquaticæ* varietas potius est quàm Species distincta.

Caryophyllata montana *Park. Ger. montana* flore magno luteo *J. B. VI.* seu Alpina lutea *C. B. Yellow mountain Abens.* In montibus altiss. max. *Carthusianorum* *Coenobio* vicinis. Reperitur etiam, teste *J. B.* in monte *Braulio* *Rhetorum.*

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius *C. B. Betonica coronaria* seu *Caryophyllus sylvestris vulgarissimus* *J. B. Armeria rubra Ger. The most common wild Pink.* In Germania, Italia, Sicilia, Gallia in pascuis passim provenit.

A. *Caryophyllus sylvestris vulgaris angustifolius* *C. B. montanus albus* *Tab.* flore niveo. In arenosis *des Spohnberges* propè *Altdorfum* mense Julio & Augusto.

C. *Caryophyllus sylvestris humilis flore unico* *C. B. Betonica coronaria* seu *Caryophyllea repens rubra* *J. B. sylv. 1. Clus.* In *Hamburgensi* monte, duobus supra *Pofonium*, infra *Viennam* 8. mill.

C. *Caryophyllus sylv. flore magno inodoro hirsuto* *C. B. Caryophylleus sylv. 2. Clus.* In *Sneberg* aliisque *Austriacarum* & *Stiriacarum* *Alpium* jugis frequentissimus.

C. *Caryophyllus sylv. tertius, flore laciniato, staminulis corniculatis odoratis* *C. B. Caryophylleus sylv. 5. Clus. montanus albus* *Ger. emac. Betonica coronaria* minùs ramosa, flore tenuiter fimbriato albo, corniculis duobus emergentibus *J. B.* In *Hamburgensi* monte inter saxa.

C. *Caryo-*

- C. *Caryophyllus simplex supinus latifolius C.B. seu sylv.*
7. Clus. hist. in monte quodam *Niclasburg* Moraviae
 vicino provenire dicitur.
- C. *Caryophyllus Alpinus calice oblongo hirsuto C. B.*
montanus Clusii Ger. Park. *Betonica coronaria*, quæ
Caryophyllus pumilio Tauricus Clusio J. B. In Tauro
Carinthiæ monte, solo tenui & arena splendente re-
 fertur. *Clus.*
- B. *Caryophyllus holosteus Alpinus latifolius C.B. prod.* In
Vallesianorum Alpibus loco Gemme dicto.
- B. *Caryophyllus holosteus Alpinus gramineus C. B. prod.*
 In Alpibus provenit; item in *Austriæ monte Taurero.*
- B. *Caryophyllus arvensis glaber minimus C. B. prod.*
 Hunc circa *Monspelium*, unde *C. B.* habuit, non in-
 venit *D. Magnol.*
- Caryophyllus sylvestris prolifer C. B. prolifer Park.* *Be-*
tonica coronaria squamosa sylvestris J. B. *Armeria*
prolifera Ger. Childing or cluster Pink. Cum
 priore, sed non usque adeo frequens.
- Caryophyllus sylvestris Carinthiacus ruber C. B. i. e. Ca-*
ryophyllus Sylvestris 4. Clus. Pink with a single
flower. In monte *Jura* propè *Genevam.*
- Caryophyllus Sylv. maximus ruber. The greatest wild*
red Pink. Circa *Scaleam* in Regno *Neapolitano.*
- B. *Caryophyllus Sylv. biflorus C. B. prod.* Circa *Gene-*
vam.
- Caryophyllus Sylv. alter flore laciniato odoratissimo C. B.*
Betonica coronaria tenuissimè dissecta, seu Caryo-
phyllea superba elatior vulgaris J. B. Great jagged
wild Pink. In montibus *Genevæ vicinis* sed rariùs
 oritur. Invenimus etiam in *Germaniæ sylvis* quibus-
 dam non longè ab oppido *Weissenberg.*
- B. *Caryophyllus Sylv. flore tenuissimè dissecto C.B.* *Be-*
tonica coronaria seu Caryophyllea, flo. tenuiter laci-
niato, minore albo & rubente J. B. *Superba recen-*
tiorum Ad. Lob. In der Hart, & pratis paludosis circa
Michelfeldam Cat. Bas. In pratis humidis circa *Al-*
lersberg in Junio *Cat. Altd. P. Magnol* in herbidis &
 sterilibus locis circa montem *Lupi* inveniri asserit. Hic
 est *Caryophylli Sylv. Sexti 3. species Clus.*

Cary-

Caryophyllus gramineo folio minimus seu *Saxifraga Cæf.*
Saxatilis 9. seu minimus muralis *C. B.* *Betonica* co-
 ronaria seu *Tunica minima* *J. B.* Circa Genevam,
 Florentiam, Lansbergam, Moguntiam & alibi tam in
 Germania, quàm in Italia copiosè. *Cat. Rom.*

B. *Caryophyllus Sylvestris* strigosior seu *Sylv.* flore mini-
 mo *C. B.* *Saxifraga Antiquorum Lobelii Park.* In
 agris *Cat. Bas.* In Saxosis circa *Uzenhoffen* m. Julio.
Cat. Altd.

M. *Caryophyllus Saxifragus C. B.* *Saxifraga magna Mat-*
thioli Ger. *Saxifragia major Italarum Matthiolo*
Park. *Saxifraga Antiquorum* quibusdam *J. B.* *The*
Saxifrage of the Ancients. In ipsis rupium fissu-
 ris montis *Lupi* quâ Septentrionem spectat Junio mense
 cum flore abunde collegit *P. Magnol.*

M. *Caryophyllus Saxatilis Ericæ* foliis, umbellatis co-
 rymbis *C. B.* Hunc *D. Magnol* in descensu montis
Capouladou à las Cambrettes Junio cum flore frequen-
 tem vidit: apud quem in *Botan. Monsp.* ejus descri-
 ptionem vide, & iconem.

Caryophyllus cœruleus Monspeliensium C. B. Park. *A-*
phyllanthes Monspeliensium J. B. Lob. In collibus
 juxta *Castelneuf*, aliisque sterilibus *Monspelio* vici-
 nis. Vid. & *Botan. Monsp.*

Caryophyllus montanus major flore globoso *C. B.* *Cary-*
ophylleus flos aphyllorcaulos vel junceus major J. B.
Caryophyllus mediterraneus Ger. *Great Christ* or
mountain July-flower. In collibus prope *Mogun-*
tiam.

Cassia poetica. Lob. *Lobelii Ger. poetica Monspeliens-*
ium Park. *Osyris frutescens baccifera C. B.* *Cassia*
lignea Monspeliensium J. B. In Italia ad mare In-
 ferum, itémque circa *Monspelim* plurima.

Catanance Dalechampii flore Cyani, folio *Coronopi J. B.*
Chondrilla cœrulea Cyani capitulis C. B. *Chondrilla*
Sesamoides dicta Park. *Sesamoides parvum Matthioli*
Ger. In aridis & saxosis collibus agri *Narbonensis* pas-
 sim obvia. Invenimus etiam prope *Gratianopolin* eun-
 do ad max. *Carthusianorum cœnobium.* Flore ple-
 no interdum invenitur circa *Monspel.*

Cauca-

Caucalis albis floribus *Ger.* vulgaris albis floribus *Park.* 4. seu arvensis echinato magno flore *C. B.* Lappula canaria flore pulchro magno albo *J. B.* *Bastard.* Parsley with great white flowers. Inter segetes in Germania passim; itémque circa Genevam & Monspelium.

Caucalis maritima supina echinato magno fructu. Lappula canaria seu *Caucalis maritima* *J. B.* 11. seu pumila maritima *C. B.* In arenosis Siciliæ litoribus circa Messanam & alibi.

M. *Caucalis* magno echinato fructu *Park.* *Monspeliaca* echinato magno fructu *C. B.* *Echinophora altera* asperior *πλανήκιστος* *Col.* In satis Salenovæ alibique mense Maio cum flore passim conspicitur. *D. Magnol* cum *C. B.* Lappam boariam *Lugd.* huc refert.

Caucalis minor pulchro semine seu *Bellonii v. Tordylium.*

Caucalis Peucedani folio *Ger.* 12. seu folio *Peucedani* *C. B.* *Park.* *Saxifragiæ tenuifoliæ* affinis, quibusdam *Caucalis* *J. B.* In planitie quadam prope Augustam *Vindelicorum* in Germania.

Cedrus Lycia retusa *Bellonio dicta* *J. B.* baccifera I. seu folio *Cupressi*, fructu flavescente *C. B.* *Cedrus Phoenicea* folio *Cupressi* *Park.* *Oxycedrus Lycia* *Ger.* Ab hac non diversam existimamus secundam speciem *Cedri bacciferæ* *C. B.* ut neque tertiam, cum ipse affirmet eas magnitudine sola differre. Fortè etiam *Sabina baccifera* dicta ab hac non fuerit diversa: Certe hæc nobis *Monspeli* ostensa est pro *Sabina baccifera*. Et nos quoque in eadem planta observavimus inferiores & primos in tenellis plantis ramulos foliis pungentibus & acutis, superiores verò & in adultioribus, obtusis & rotundis vestitos.

Centaurium luteum pusillum *C. B.* minimum luteum *Park.* luteum novum *Col.* *Centaurii lutei* varietas *Ger. emac.* In tecto veteris ædificii *Baiani* piscina mirabilis dicti. Solo floris colore à *Cent.* minore purpureo differre videtur. *Small yellow Cento.*

Centauri-

Centaurium minus spicatum album C. B. *Park.* The lesser spik'd Centory. Monspelii & alibi in Narbonensi Gallia flore purpureo frequens.

Cerinthe asperior flavo flore Ger. major flavo flore *Park.* quorundam, spinoso folio, flavo flore *J. B.* flavo flore asperior C. B. Yellow-flower'd Honeywort. In Italia & Sicilia.

Cerinthe major Ger. major flore luteo & rubro *Park.* quorundam major versicolore flore *J. B.* *Cerinthe* seu *Cynoglossum montanum majus* C. B. Great Mountain Honey-wort with a particoloured flower. Per totam Beticam copiose crescit *Clus.* In montibus sylvosis max. Carthus. coenobio imminentibus. Perennis mihi visa est hæc planta : Semina autem ei minora sunt quam vel purpureæ vulgari annuæ, vel luteæ.

C. *Cerinthe minor* C. B. Ger. minor flavo flore C. B. *Park.* quorundam minor flavo flore *Clus. J. B.* In Austria & Stiria agris copiosè.

Cerasus Sylvestris amara, Mahaleb putata *J. B.* Cer. XV. seu *Ceraso affinis* C. B. *Macaleb* Gesneri Ger. *Machaleb* Germanicum *Park.* qui C. Bauhinum reprehendit, quòd confundat *Machaleb* Matthioli & Gesneri. In sepibus prope Gratianopolin, quà itur à la grand Chartreuse. In sylva Valena quà itur ad pagum Utols abundat Junio mense cum fructu *Botan. Monsp.*

Cerrus minori glande Ger. *Haliphæos* seu *Cerrus* foemina, minore glande *Park.* *Quercus Burgundica calyce hispido* *J. B.* VI. five calyce hispido, glando minore C. B. In Etruria ad lacum Volsiniensem. In sylva Farnesiana propè Romam *Cat. Rom. v. & Clus. Pannon.*

Chamæbalanus leguminosa *J. B.* *Lathyrus arvensis* repens tuberosus C. B. arvensis, five Terræ glandes *Park.* Terræ glandes *Dod. Lod. Ger. Pease Earth-Puts or Earth-mouse.* In arvis circa Genevam & alibi.

Chamæbuxus flore Coluteæ v. Anonymos flore Coluteæ.

C. *Chamæcerasus* *Clus. Ger.* *Cerasus pumila* C. B. *J. B. Park. parad. Dwarf Cherry.* Passim in Pannonia, Austria inferiore & Moravia, editionibus siccisque locis.

Chamæcyparissus v. Abrotanum foemina.

Chamæ-

Chamæcistus v. *Cistus humilis*. Alpina v. *Periclymenum*.

Chamædrys major *Park.* major latifolia *Ger.* major repens *C. B.* Great Germander. In montosis itinere à Vienna ad Venetias. In asperis Palatinatûs, & circa *Belden* ac *Hohenstein* flore purpureo *Cat. Altd.*

Chamædrys vulgaris *Park.* minor *Ger.* minor repens *C. B.* vulgò vera existimata *J. B.* Common Germander. In Germania, Italia, & Gallia frequens. *V. Bot. Monsp. Cat. Basil. & Cat. Altd.*

Chamædrys laciniatis foliis *Park. Lob. ob.* *Chamæpitys foemina* *Ger.* Botrys *Chamædryoides* *C. B.* Bot. verticillata *J. B.* Jagged Germander or Ground-pine. In Germaniæ agris sterilibus, & circa *Genevam* passim.

B. Chamædrys Austriaca foliis tenuissimè laciniatis *C. B. prod.* Ex Austria. *Agerius.*

B. Chamædrys Alpina minima hirsuta *C. B. prod.* In jugis Alpium Helveticarum & Tyrolensium.

A. Chamædrys hederacea seu *Teucrium pratense* foliis hederaceis *Fungerm.* *Chamædrys spuria* sive scutellata repens *C. B.* Im *Pfaffenthal* propè *Altdorfium*, sed rariùs.

A. Chamædrys fruticosa seu *Pseudochamædrys elatior Fungermanni.* An *Chamædrys sylvestris* ramosior *Dod?* aut *Veronica* supina facie *Teucris* pratensis? Differt ab aliis quod ferè lignescat, & ex unica, quam plerunque habet, ala, semper quatuor emittat caules floribus coeruleis & seminibus onustos. Ad arcem *Hollenstein*, sed copiosius am *Obern Sulzberg*, Junio. *Cat. Altd.*

Chamæiris v. *Iris pumila.* *Chamæiasme Alpina* *J. B. v.* Sedum 10. *Clus.*

Chamælinum v. *Linum sylvestre.*

Caryophyllata Alpina *Chamædryos folio Cisti* flore. *Chamædrys spuria montana Cisti* flore *Park.* Alpina flore *Fragariæ* albo *J. B.* Alpina *Cisti* flore *C. B.* *Teucrium Alpinum Cisti* flore *Ger.* Mountain Thyme with Germander-leaves. In Alpibus Carinthiacis, inque montis *Juræ* summis jugis.

Chamæ-

Chamædrys spuria v. *Veronica*.

Chamægenista v. *Genista minor*.

Chamelæa tricoccus *J. B. C. B. Park.* *Arabum tricoccus* *Ger.* ~~Widow~~-*wail*. Inter *Monspelum* & *Frontignanam* in collibus saxosis plurima. Loca particularia vide in *Bot. Monsp.*

Chamelæa Germanica five *Mezereon* *Ger. vid.* *Mezereon*.

Chamæleo albus *Apulus* purpureo flore gummiſer *Col.* albus verus acaulis *Park.* *Carlina acaulis gummiſera* (rectius *Cinara acaulis gummiſera*) *C. B.* In *Apuliæ* *Cirinolæ* ſterilibus devexis *Occidentalibus*.

Chamæleon niger *Dioscoridis* *Maranthæ* *J. B.* niger verus *Park.* niger umbellatus flore cœruleo *Hyacinthino* *C. B.* niger *Ger.* In *Apuliæ* finitimis campeſtribus & ſiccis.

Chamæleon v. *Carduus*.

M. Chamæmelo affine *Buphthalmum* ſegetum altiffimum *J. B.* *Chamæmelum leucanthemum* *Hiſpanicum* magno flore *C. B.* Vulgare eſt in ſatis [circa *Monſpelium*] quod foliorum diviſura, altitudine & majori flore à *Cotulis* facilè diſtinguitur. *Bot. Monſp.*

Chamæmelum Alpinum inodorum *C. B. Park.* *Leucanthemum Alpinum cluſii* *Ger.* In *Judenberg*, *Spittal*, & aliis quibuſdam *Stiriæ* jugis.

M. Chamæmelum maritimum & *Cotula maritima* quibuſdam *Lugd.* ~~Sea~~-*Hayweed* oz *Camomile*. In noſtris maritimis (inquit *D. Magnol*) vulgare eſt, & tota æſtate floret.

Chamæmelum Chryſanthemum v. *Buphthalmum*.

Chamæmepilus *J. B.* *Cotoneaſter folio oblongo ſerrato* *C. B.* *Cotoneaſter Geſneri* *Ger. emac.* in *Append.* ~~Dwarf~~-*Medlar*. In ſummitatibus montis *Juræ*.

Chamæmepilus Geſn. *Cotoneaſter Geſneri* *J. B. Park.* *Cotonaſter folio rotundo non ſerrato*, & *Chamæmepilus Cordi* *C. B.* *Chamæmepilus* *Ger.* *Epimelis* *Lugd.* ~~Round~~-*leaved Dwarf-*Medlar*. In montibus prope *Genevam* & *Rhenum* fluvium.*

Chamænerion Geſneri *Lob.* alterum anguſtiſolium *Ger.* *Lyſimachia Chamænerion* dicta anguſtiſolia *C. B.* *Lyſ. ſiliquoſa anguſtiſolia* *Chamænerion Geſnero* dicta *Park.* *Lyſimachia ſiliquoſa ſpecioſa anguſtiſolia*,

- J. B. Narrow-leaved sweet Willow-herb.* In alveis torrentum & fluviorum, ut Rhodani & Arvæ ad Genevam; & in *Foro Julii* Italiæ abunde.
- C. Chamæpitys Austriaca Clus. Ger. Austriaca Clusii Park. cœrulea Austriaca Clus.* In summo jugo montis cujusdam uno & dimidio milliario Vienna Austriæ distante, tenui nigroque solo.
- Chamæpitys moschata foliis serratis C. B. Chamæp. seu Iva moschata Monspeliensium J. B. Iva moschata Monspeliaca Ger. Anthyllis altera Herbariorum Park. Ivy-leaved sweet Ground-pine.* In saxosis collibus circa Monspelim & alibi in Gallia Narbonensi: item in insula ad Promont. Pachynum Siciliæ.
- Chamæriphes v. Palma minor.*
- Chamælyce Dod. Lob. C. B. J. B. Ger. Park. Small round-leaved Spurge.* In vineis & agris Italiæ, Siciliæ & Gallia Narbonensis.
- Chondrille vel Chondrilla cœrulea J. B. Ch. cœrulea vel purpurea Park. cœrulea Ger. cœrulea altera, Cichorei sylv. folio C. B. Blue Gum-Succory.* In Germania superiore inter Confluentes, & Moguntiam. Circa Monspelim etiam invenitur. Loca vide in *Bot. Monsp.*
- S. Chondrilla Tragopogonoides maritima Boccon.* In arenoso maris litore, inque Catanæ, Agrigenti & Saccæ pastoralibus agris passim obvia.
- Chondrilla lactuceæ Foro-Julienfis.* In Foro Julii via quæ à Vinsona Venetias ducit. Descriptionem v. *Hist. nost. p. 228.*
- Chondrilla bulbosa Park. marina Ger. Cichorium bulbosum J. B. bulbosa seu Chondrilla 2. Dioscor. An Perdicium Theoph. 1. Hist. 11. C. B. Floret mense Aprili prope montem Ceti ad mare. In herbidis locis oræ maritimæ passim inter juncos repit. P. Magnol.*
- Chondrilla lutea J. B. In aggeribus & vineis circa Montem pessulanum, & in muris ipsius urbis. Yellow-flower'd Gum-Succory.* Ad Sonchum lævem vulgarem quàm proximè accedit, & revera Sonchi species est. Fortè Son. lævis in plurimas tenuissimas lacinias divisus *C. B. prod.* Nam locus convenit.
- Chon-

- Chondrilla foliis non dissectis caule nudo *J. B.* Ad radices montis Salevæ, & in arenosis ad fluv. *Arve* propè Genevam. Hæc vera Hieracii species est.
- Chondrilla rara purpurea, &c. v. *Cyanus.*
- Chondrilla juncea *Ger.* juncea viscosa arvensis, quæ prima Dioscoridis *C. B.* viminea *J. B.* viminalibus virgis *Park.* Rush-leaved Gum-Succory. In Germania, Italia, & Gallia Narbonensi in arenosis copiosè.
- Chondrilla viscosa caule foliis obducto *C. B.* viscosa saxatilis caule *synusdopogon Col.* In Sicilia circa Messanam, inque Gallia Narbonensi circa Monspelium.
- † Christophoriana *Lob. Ger.* vulgaris *Park.* Aconitum racemosum, Actæa quibusdam *J. B.* racemosum an Actæa, Plinii *C. B.* ? Herb Christopher. In sylvis montosis ad Rhenum & circa Genevam copiosè.
- C. Chrysanthemum* Valentinum Clusii *Park. Ger.* Buphthalmum lanuginosum foliis Millefolii *C. B.* Buphthalmo tenuifolio simile Chrysanthemum Valentinum Clusii *J. B.* Valentino Regno ad arborum margines, juxta semitas.
- C. Chrysanthemum Alpinum 1. Clusii *Ger. Park.* Alpinum incanum foliis laciniatis *C. B.* Alpinum Judenbergense, Jacobææ affine *J. B.* In Judenberg, Spittal, & aliis quibusdam Stiriaë jugis, m. Jul. & Aug.
- C. Chrysanthemum Alpinum 2. Clusii *Park.* Alpinum, foliis Abrotani multifidis *C. B.* erronee Alpinum Etscherianum, Jacobææ affine *J. B.* In Etscher, Snealben, Veytzalben, & aliis celsis Alpium Stiriaë jugis.
- Chrysanthemum Conyzoides Monspelienfium nobis & *Moris.* Conyzoides Lusitanicum *Breyn.* Aster annuus, Attico luteo similis foliis, ad florem mollibus *Botan. Monsp.* Ast. Atticus odoratus Creticus *Zanoni.* Circa Monspelium sponte & copiosè.
- C. Chrysanthemum Alpinum 3. *Clus.* Ageratum ferula-ceum Dalechampii *J. B.* In cacumine montis Esperon *J. B.* In celsioribus Calcaris & Horti Dei montium Narbonensium jugis. *Lob.* De nominibus hujus plantæ v. *Hist. nost. p. 286.*

Chrysanthemum Bellidis folio Hort. Pat. latifolium J. B.
Hispanicum rotundioribus foliis Par. Bellis lutea 3.
 feu foliis subrotundis C.B. Inter segetes circa Liburnum portum copiosè.

Chrysanthemum Creticum Ger. J. B. Park. majus folio
 in minores lacinias diviso C.B. Candy Corn=Ma-
 rigold. In vineis & hortis oleraceis.

Chrysocome v. Stoechas citrina.

Chrysocome capitulis conglobatis Ger. Helichrysum 9.
 seu sylvestre angustifolium capitulis conglobatis C. B.
Stoechas citrina altera in odora Park. Stoechadi citri-
trinae affinis capitulis parvis, raris, squamosis in pappos
evanescentibus J. B. In muris, saxis & rupium fissuris
circa Monspelium variis in locis.

Cicer sylvestre Matth. Ger. Sylv. multifolium J. B. Sylv.
foliis oblongis hispidis, majus C. B. Sylv. majus Park.
 Inter segetes non longè ab oppido Jay Genevam ver-
 sùs. Glaucis seu Glycyrrhizæ sylvestris potius quàm
 Ciceris species habenda est.

B. *Cicer sylvestre latifolium triphyllon C. B. Sylv. tri-*
phyllon Park. Sylv. latifolium Ger. Sylv. trifolium
J. B. In monte Saleva J. B. & alibi in Alpihus.

Cicer sylvestre alterum triphyllon Park. Sylv. alterum
Lugd. arboreum Indicum perenne Zanoni. Anonis
præcox frutescens flore rubro amplo Moris. In mon-
tibus Delphinatùs. Berard.

Cicer sativum Ger. C. B. arietinum J. B. sativum, five
Arietinum, nigrum, rubrum vel album Park. Chiches
or Chich=Pease. In Italia, Sicilia & Melita in agris
 feruntur, ubi rustici ea dum adhuc viridia sunt & im-
 matura cruda comedunt.

B. *Cicer montanum lanuginosum erectum C. B. prod. In*
Valesia ad thermas Leucenses; & in montibus Fran-
cenhusanis.

Cichorium spinosum Ger. J. B. C. B. Spinosum Creti-
cum Park. Chorny=Surcozy. In insula sæpius me-
morata ad Promont. Pachynum Siciliae,

- Col.** *Cichorium dulce Neapolitanum Park.* *Sonchus latifolius* leviter hirsutus *C. B.* rectius *Hieracium dulce Cichorii foliis.* In umbrosis vallium saxosis, & Septentrionalibus locis *Valvensium.*
- Cichorium pratense vesicarium Park. Col. prat.* hirsutum vesicarium *C. B.* ~~Bladder-Succory.~~ In sepibus & agrorum marginibus à portu Liburno non longè. *Cat. Rom.*
- Cichorium verrucarium five Zacynta Ger. Park.* verrucosum five *Zacynta Hieracii* adnumerandum *J. B.* *Chondrilla verrucaria foliis intybaceis viridibus C. B.* ~~Wart-Succory.~~ Ad ostia Tybridis copiose: item circa Liburnum portum & Florentiam. *Cat. Rom.*
- Cicutaria latifolia hirsuta J. B. palustris alba Park.* palustris latifolia alba *C. B.* palustris latifolia rubra *ejusdem* ab hac fortè non differt specie. In pascuis montosis Juræ & Salevæ montium prope Genevam, præsertim ad rivulos.
- B.** *Cicutaria foetida Tab. latifolia foetida C. B. latifolia foetidissima Lob. Ger. emac.* *Seseli Peloponnesiacum Recentiorum Park.* *Seseli Peloponnesense Matthioli,* five *Cicutaria quorundam J. B.* *Great broad-leaved Bastard Hemlock.* In palustribus circa *Rasch Cat. Altd.* in fimetis *Cat. Basil.*
- A.** *Cicutaria bulbosa C. B. Park.* odorata bulbosa *J. B.* *Pannonica Clus.* *Knobby-rooted Wild Cicely or bastard Hemlock.* In vepretis passim juxta viam Scipionis Maio & Junio. *Cat. Altd.*
- Hujus bulbosos, & aceto, oleo ac sale conditos nonnulli in mensarum deliciis habent, quamvis insalubres & capiti inimici sunt. Prodit etiam in herbidis Viennensis agri locis Clus.*
- Cinara sylvestris Ger. Sylv. latifolia C. B. Scolymus Dioscoridis Park.* *Carduus Scolymus sylvestris J. B.* *Wild-Artichoke.* In Italia & Sicilia, necnon in Gallia Narbonensi propè Monspelium, ubi floribus ejus coaguli vice utuntur ad lac in caseum condensandum.

Circea montana minima. Solanifolia Circea Alpina C. B. Circea minima Col. non ramosa. Cir. Lutetiana minor Park Small Enchanters Nightshade. In Sylvis montosis prope max. Carthusianorum cœnobium. In opacis circa Eutenberg & sub Mauritiano Cat. Altd.

Cirsium foliis non hirsutis, floribus compactis C. B. montanum capitulis compactis Park. Carduus Cirsium Monspelianum, folio glabro longo Matthioli J. B. Gentle Thistle with smooth leaves and compact flowers. Ad Ladum amnem & alibi prope Monspelum.

Cirsium Pannonicum 1. Clusii ad Cirsium Anglicum vulgare proximè accedit, an & quid differat examinent studiosi.

Cirsium montanum capitulis parvis Ger. emac. aliud montanum Park. singularibus capitulis parvis C. B. foliis non laciniatis, virore Brassicæ J. B. 4. montanum 1. Clus. In montanis quibusdam sylvis Pannoniæ, ut supra Pofonium & Nemethwyar, aliisque ad Alpes tendentibus, ut supra Badenses thermas. Huic similem si non eundem circa Plumbinum Etruriæ oppidum observavimus.

C. Cirsium montanum foliis carnosis, bulbosa radice, fortè Lutetianum J. B. maximum Asphodeli radice C. B. max. montanum, incano folio, bulbosa radice feu 5. Clus. In montanis pratis & ad piscinarum udes margines.

C. Cirsium 4. Montanum 2. Clus. Iisdem in locis cum penultima specie.

Cirsium Alpinum, foliis minùs profundè laciniatis, spinis oblongis creberrimis. Descriptionem vid. Hist. nost. p. 307. In Alpibus Carinthiacis & prope Augustam Vindelicorum.

Præter has Cirsii species, Nos in ampla planitie prope Augustam prædictam, quam transivimus eundo ad Monachium Baviaræ, duas Cirsii species observavimus, nescio an à superscriptis omnibus diversas, eas enim non satis accuratè descripsimus.

Priori-flos Cirsii Anglici minoris seu primi *Park.* florifimillimus, & in uno caule, ut in illo, plerunque unicus. Folia verò profundè ad mediam usque costam laciniata, & spinulis horrida, ad modum ferè Cardui viarum vulgarissimi radice repente, pallidè viridia; cùm ibi essemus Aug. 24. nondum defloruerat.

Alteri, quod tum planè defloruerat, folia viridia erant, breviora & latiora quàm præcedenti, in ambitu spinosa, & Hyoseridis masculæ foliis figurâ suâ nonnihil similia. Curiosiores Botanici Augustani orandi sunt, ut plantas hæc indagare, diligentius describere & nos certiores facere, an jam descriptæ, an indictæ sint, dignentur.

B. Cirsium angustifolium C. B. In monte *Wasserfal* prope Basileam. *Cat. Basil.*

Cistus annuus Secundus Clusii *Ger.* annuus flore guttato *Park.* flore pallido, punicante macula insignito C. B. annuus 2. Clusii, flore pallido, punicante maculâ insignito *J. B.* Ad radices montis Vesuvii in pascuis invenimus, at flore non maculato, quales & *Fab. Columna* observavit quamplurimas eodem loco unâ cum maculosis nascentes. Item circa Romam in collibus Farnesianis & in Pineto. *Cat. Rom.*

Cistus foemina *Ger.* foemina Monspeliaca *J. B.* foemina folio Salviæ C. B. *The female or white-flower'd Holy-Rose or Cistus.* Per Siciliam, Italiam & Galliam Narbonensem in sterilibus & saxosis collibus & sylvis. Duplex habetur, elatior & humilior, ut rectè notat C. B.

Cistus mas folio oblongo incano C. B. mas 4. folio oblongo albido *J. B.* mas vulgaris *Park.* mas cum Hypocistide *Ger.* *Male Holy-Rose with a long heavy leaf.* Cum priore.

Cistus ladanifera Monspeliensium C. B. ladanifera seu Ledum Monspeliacum angusto folio nigricans *J. B.* Cistus ledon 5. Clusii *Ger.* Labdanum *Holy-Rose.* In iisdem cum præcedentibus locis sed multò copiosior, & steriliora omnia latè occupans.

M. Cistus mas supinus fimbriatis & sinuatis foliis *Lob.* mas 5. *Clus.* mas dentatus *Ger.* hamilis *Park.* mas 5.

foliis crispis & quodammodo sinuosis *J. B.* mas foliis *Chamædryos C. B.* *Male Holy-Rose with curled leaves.* In sterilibus locis vulgo *Garrigues* dictis inter *Pedenatium* & *Bliteras* nunc *Beziers.*

M. Cistus ledon foliis laurinis *C. B.* *Ledon latifolium Park.* *Ledon latiore folio J. B.* *Ledon i. latifolium Clus.* Versus *Carpoiran* & *Saint Jordi* in incultis, vulgò *Garrigues*, nascitur.

M. Cistus ladanifera Hispanica incana C. B. *C. Ledon i. Clusii Ger.* *Ledon flore maculo nigricante notato J. B.* *Ledon angustifolium Park.* Cum superiore iisdem in locis permixta reperitur. In Hispania frequentissimus habetur.

Cistus humilis five *Chamæcistus Ericæ folio luteus C. B.* *Chamæcistus Ericæ foliis Park.* *Helianthemum tenuifolium glabrum flore luteo J. B.* *Smooth fine-leaved Yellow Dwarf-Cistus or Sun-flower.* Ad radices montis *Juræ* inque collibus saxosis circa *Monspelim* & *Genevam.*

Ab hoc diversum facit *J. Bauhinus*

Cistum humilem seu *Helianthemum folio Thymi incano*, quod putat *Lobelium* miscere cum *Helianthemo tenuifolio glabro*. Has similes esse plantas, diversas tamen diligentius consideranti asserit. Ast *Lobelius* reprehendendus non est : nos enim in eadem planta vidimus inferiora folia tenuissima, qualia ferè *Camphorata Monspeliensium* : Superiora autem longè diversa viridia, & præcedentis foliis planè eadem. Postea tamen circa *Massiliam* *Helianthemum* speciem invenimus, cujus folia omnia tenuissima, *Camphorata* similia, & glabra erant. Locum circa *Monspelim v. in Botan. Monsp.*

Præcedens etiam planta duplex est erectior & humilior, quæ, ex observatione *D. Magnol*, non tantum magnitudine differunt, sed & modo conservandi Seminis : Siquidem Erectioris capsula dum aperitur, decidit statim semen, sicut aliis accidit ; at in humiliori quamvis capsula aperta sit, & prona versus terram, manet tamen semen q. capsulæ adhærens.

M. Cistus

- M. *Cistus humilis* foliis minoribus & incanis C. B. *Cistus humilis* Clusio, sive *Helianthemum* omnino candicans, flore nunc albo, nunc pallido *J. B. Chamæc.*
4. Clus. In monte propè *Castelneuf* & in sterilibus circa *Salenovam*. *J. B. Bot. Monsp.*
- Cistus humilis* foliis *Thymi* incanis C. B. *Helianthemum* flore albo, folio angusto hirsuto *J. B. angustifolium Park. Ger.* An *Chamæc. V. Clus?* Propè *Montspe- lium* in collibus *Castro novo* adjacentibus, atque etiam circa *Nemausum*. Folia hujus oblonga sunt, incana, figura sua ad *Rorismarini* folia accedentia, nisi quod breviora sint.
- C. *Cistus humilis serpyllifolia* floribus carneis C. B. *Chamæcistus Serpylli* folio, flore carneo *Park. Serpyllifolius Ger. 7. Clus.* In summis *Sneberg*, *Snealben* & aliis *Austriacarum* *Stiriacarumque* *Alpium* superciliis, tenui solo inter saxa.
- † *Cistus humilis* sive *Helianthemum* folio *Pilosellæ* minoris *Fuchsi* *J. B.* Ad latera & radices montis *Salvæ* propè *Genevam* copiosè. A. D. *Newton* in *Anglia* inventa est hæc planta v. *Synopsin stirp. Brit. no- stram.*
- C. *Cistus humilis angustifolius* *Ger. Chamæcistus 6. Clus.* angustifolius flore luteo *Clusii J. B. angustifolia C. B.* Nusquam nisi in monte *Badensibus* thermis imminenti, 4 à *Vienna* mill. & in monte *Hamburgensi* 2 à *Posonio* mill. pauculas plantas invenit *Clusius*.
- M. *Cistus humilis* seu *Helianthemum* folio *Sampsuchi*, capitulis valdè hirsutis *J. B.* An *Cistus* folio *Majoranæ* C. B. Juxta *Monspeli* patibulum magnâ copiâ fruticat, *Cisti folio Majoranæ* nomine notus. *Botan. Monsp. Cat. Rom.*
- M. *Cistus humilis* seu *Chamæcistus Serpylli* folio nigricante, flore aureo odorato *J. B.* Circa *la Colom- biere* & fontem *Piquet* copiosè floret. Plurimos in ramulis habet flores triplo minores *Helianthem*i vulgaris.
- M. *Cistus humilis Serpyllifolia* *Ger. Chamæcistus* repens *Serpyllifolia* lutea C. B. *Serpylli* folio, flore luteo *Park. 2. Clus.* Juxta viam quâ à *Som- mieres* itur *Alex* in incultis. Hic *D. Magnol Chamæ-*

Chamæcistus Serpylli folio nigricante, flore aureo odorato *J. B.* ab hac cujus Synonyma dedimus distinguit. Mihi certe neutra species cognita est; proinde non habeo quid dicam. Descriptionem *Cisti Helianthem*i flore parvo luteo huic melius quadrare existimat.

M. Cistus humilis seu *Chamæcistus Nummulariæ* folio *Bot. Monsp.* *Helianthemum* ad *Nummulariam* accedens *J. B.* Elegantissimus est iste *Chamæcistus*, quem in devexis locis montis *Capouladou* invenit *P. Magnol.*

M. Cistus humilis sive *Chamæcistus* foliis *Myrti* minoris incanis *C. B.* foliis *Myrti Tarentinæ* canis vel cinereis *J. B.* *Chamæc.* 3. *Clus.* latifolius *Park.* humilis latifolius *Ger.* In monte *Capouladou* prope *Monspeli*um sæpius vidit *P. Magnol.* Junio mense cum flore.

M. Cistus annuus folio *Ledi*, flore luteo *J. B.* annuus longifolius *Lobelii* *Ger.* annuus folio *Ledi* *Park.* *Ledi* folio *C. B.* In loco dicto *La garrigue dau Tarrall*, & circa *Salenovam* in herbidis incultis ultra pontem sæpius collegit *D. Magnol.*

M. Cistus Plantaginis folio *C. B.* *Tuberaria* major *Myconi* *J. B.* In *Sylva Grammontia* prope *Monspeli*um, & in incultis locis versus *Vauvert* pagum, Maio mense florens. Radix vivax plura capitula cum foliis hirsutis producit, quæ in caule glabra sunt. Hanc à minori diversam esse agnoscit *P. Magnol* in *App.* ad *Bot. Monsp.*

Clematis sive *Flammula surrecta* alba *J. B.* *Clematis* 6. seu *Flammula recta* *C. B.* *Flammula Jovis* surrecta *Ger.* *Park.* *Upright Virgins Bower.* In sepibus ad montes prope *Ratisbonam* in *Germania.*

Clematis sive *Flammula repens* *C. B.* *Clem.* seu *Flammula scandens tenuifolia* alba *J. B.* *Clematis urens* *Ger.* urens flore albo *Park.* *Creeping Climber or Virgins Bower.* Circa *Monspeli*um in collibus saxosis. In pratis maritimis humi sparsa, tenera & humilis visitur. Hæc est *Clematis maritima repens* *C. B.* & *Clematis parva* in montibus prope *Castleneuve* *J. B.*

C. Clematis Bætica *Ger.* *Bætica* *Clusii* *J. B.* *sylv.* altera *Bætica* *Park.* peregrina foliis *Pyr*i incisfis *C. B.*
Inve-

nit Clusius inter Afindum vulgo *Medina Sidonia* & Calpen secundum fluentia, aliisque Baticæ in locis, men. Jan. cincinnos explicantem. Habetur & in Sicilia *Cat. Sic. Boccon.*

C. Clematis Pannonica *Ger.* cœrulea Pannonica *Clus. Park.* Pannonica flore cœruleo surrecta *J. B.* Clematidis cœrulea surrecta *C. B.* In pratis circa *Stampfen* duobus ultra *Polonium* Ungariæ milliariibus.

B. Clematis Alpina Geraniifolia *C. B. prod.* Ex Austriæ montibus attulit *Burserus.* In altioribus *Baldi* rupibus nascitur.

Clematis Daphnoides major *C. B. ma.* flore cœruleo & albo *J. B.* Daphnoides seu Vinca Pervinca major *Ger.* Daphnoides seu Vinca Pervinca major. *Park. Great Periwinkle.* Circa *Monspelium* variis in locis; in umbrosis latorum & vinearum sepibus.

Clinopodium *v. Acinos.*

Clinopodium Alpinum *Park.* Chamædryi vulgari falsæ aliquatenus affinis, & Clinopodium Alpinum *Ponæ J. B.* Teucrium Alpinum coma purpureo-cœrulea *C. B.* In suprema parte montis *Juræ*, & in Alpibus *Sabaudicis.*

Cneorum *Matth. v. Thymelæa minor Cordi.*

Cnicus sativus seu Carthamum Officin. *C. B.* Cnicus five Carthamus sativus *Park.* Carthamus five Cnicus *J. B. Ger. Bastard-Saffron.* Ab agricolis *Spirrensibus* & *Argentinesibus* quotannis inter æstivas fruges seritur.

C. Cnicus alter perennis *Clusii Park.* alter cœruleus *Ger.* cœruleus asperior *C. B.* Cnicus five Carthamus flore cœruleo *J. B.* Circa *Cordubam* in segetibus & in agro *Hispalensi* *Maij* & *Jun.* florentem invenit *Clusius.* Reperitur & in *Sicilia*, & circa *Romam.* *Cat. Sic. Boccon. Cat. Rom.*

Coccigria aut Coggygia *v. Cotinus.*

Colchicum Neapolitanum Fritillanicum *Park.* floribus Fritillariæ intar tessellatis *C. B.* Colchicum Neapol. *Clus. hist. App. 1.*

C. Colchicum Pannonicum album *Park.* polyanthes album *J. B.* candidum multiflorum *C. B.* In pratis quibusdam *Viennæ Austriæ* vicinis.

Colus

Colus Jovis v. Horminum luteum.

Colutea Ger. vesicaria C. B. *f. B.* vesicaria vulgaris *Park.* *Bastard Senna.* In Italia multis in locis reperitur; in ascensu montis Vesuvii plurima inter cineres & pumices, ubi nulla ferè alia planta oritur. Habetur etiam in confiniis agri Monspeliaci.

Colutea Scorpioides Ger. *f. B.* Scorpioides major *Park.* filiquosa sive Scorpioides major C. B. In collibus circa Salernum, Genevam & Monspelium.

C. Colutea Scorpioides humilis Ger. *f. B.* humilior *Park.* filiquosa minor C. B. Ad *Calenberg* vicinisque Viennæ montibus abunde; ut & in Pannoniæ montanis.

C. Colutea Scorpioides minor coronata C. B. Scorpioides montana Clusii Ger. Scorpioides quædam seu Polygalo Cortusi similis planta, sed major *f. B.* Scorpioides 2. seu altera *Clus.* In montium qui à Danubio & Calenberg illi imminenti ad Alpes extenduntur radicibus.

B. Colutea scorpioides maritima glauco folio C. B. *prod.* In maritimis propè Terracinam.

Colutea minima sive Coronilla Ger. Polygala Valentina Clusii *Park.* Coluteæ parva species Polygala Valentina Clusii *f. B.* Polygala altera C. B. In clivis maritimis prope Salernum, atque etiam in Etruscis.

M. Colutea Scorpioides coronata *Lob.* Polygala major montana *Park.* Valentina 2. *Clus.* an major Massiliotica C. B? In monte Cetio inter alia arbuta versùs mare Maio florentem invenit *D. Magnol*, & in Sylva Valena circa *Caravettes*.

Colutea caule Genistæ fungoso *f. B.* Polygala I. seu major Massiliotica C. B. Polygala Valentina 3. *Clus.* Valentina marina Clusii *Park.* sub quinta. In Galloprovinciæ clivis montosis prope oppidum *S. Chamas*.

Consolida media Genevensis *f. B.* An Consolida media cœrulea Alpina C. B? Bugula Alpina cœrulea *Park.* Floribus & summitatibus est cœruleis, non repens. Ad agrorum margines circa Genevam & Basileam copiosè.

Consolida major v. Symphytum.

Consolida regalis v. Delphinium.

H. Con-

H. *Convolvulus major purpureus* N.D. *Cat. Hol. Commel.*
non aliter puto differt à *Convolvulo* majore vulgari
flo. albo quàm floris colore.

T. *Convolvulus maritimus serpens spicæfolius* *Triumfetti.*
Juxta oram maritimam, quà à Centum-cellis Romam
itur, in eminentiore quodam loco lateralem velut limi-
tem viæ præsignante.

Convolvulus Althææ folio *Park.* argenteus *Althææ folio*
C. B. Ger. emac. peregrinus pulcher folio *Betonicæ* *J. B.*
Bindweed with Marshmallow leaves. Circa Mes-
sanam in lingula illa Fretum Siculum & portum Mes-
sanensem intercurrente, inter frutices copiosè.

Convolvulus cœruleus minor folio oblongo *Ger. VII.* seu
peregrinus cœruleus folio oblongo *C. B.* an minor
cœruleus *Hispanicus* *Park?* In insula ad Promont. Si-
cilix *Pachynum.*

Convolvulus spicæfolius *Park.* minimus *spicæfolius* *Ger.*
Ad Lob. *Linariæ folio* *C. B.* *Volvulus terrestris* *J. B.*
In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi vulgarissima.

M. *Convolvulus spicæfolius argenteus radice repente*
Botan. Monsp. In incultis sterilibus ultra la *Colombiere,*
quà itur ad fontem *Piquet*; & circa Salenovam.

S. *Convolvulus Sículus minor flore parvo auriculato* *Bocc.*
Circa Catanam frequenter collegit *D. Boccone,* item
circa Panormum, sed rariùs.

Conyza mas *Theophrasti,* major *Dioscoridis* *C. B.* major
verior *Dioscoridis* *Park.* major *Monspeliensis* odorata
J. B. odorata. *Ger. Great true fleabane of Dios-*
corides. In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi passim.

Conyza minor vera *Ger. J. B.* minor vera *Ponæ* *Park.*
fœmina *Theophrasti,* minor *Dioscoridis* *C. B.* *The*
lesser or female fleabane of Theoph. Circa
Monspelim & in Italia ad mare inferum.

H. *Conyza Pannonica lanuginosa* *C. B.* *Austriaca* 3.
Clusii *Ger.* *Asteri montano hirsuto* magno flore seu
Oculo Christi similis, si non idem, sive *Conyza* 3.
Clusii *J. B. Cat. Holl. Commel.* Dissentiunt inter se
Botanici de hac planta. v. *Hist. nost. p. 262.* In
Austria copiosè provenit. v. *Clus. hist. p. 20.*

C. *Conyza*

- C. Conyza Alpina *J. B.* Jacobæa latifolia Pannonica altera *Park* Alpina foliis rotundis ferratis C. B. Pannonica *A. Clus.* In Austriacis Stiriacisque Alpibus, præcipue secundum rivulos & fluenta.
- B. Conyza cœrulea Alpina major C. B. *Park* In monte S. Bernhardi.
- B. Conyza cœrulea Alpina minor C. B. *prod. Park* In monte Gothardi.
- B. Conyza aquatica Asteris flore aureo C. B. *prod.* In Vallesia prope Sedunum ad aquas.
- Conyza caulibus rubentibus tenuioribus, flore luteo nudo *Botan. Monsp.* Hæc planta est cujus in Catalogo exterarum An. 1673. edito meminimus sub titulo Conyze cujusdam marinæ prope *Perauls* non longè à Monspelio. Hanc eandem esse cum Conyza annua Sicula lutea, foliis atro-virentibus, caule rubente *Bocconi* affirmat *D. Plukenet*: non consentit *D. Magnol*.
- S. Conyza Melitensis retusis foliis *Bocconi*. Inter difficultates & acclives ascensus saxorum & cautium Melitæ Insulæ, sub Capucinatorum cœnobio.
- Conyze erectæ majoris novam speciem in Insula ad Promontorium Pachynum Siciliæ observavimus quidem, non tamen descripsimus.
- Conyza marina *Lugd. J. B.* Chondrilla bulbosa Conyze facie, foliis angustioribus C. B. In planitie quadam non longè à monte *Lupi*, secus vias. *P. Magnol* hanc plantam Conyzam tuberosam luteam foliis angustis & rigidis non ineptè nuncupat.
- Coris cœrulea maritima C. B. cœrulea Monspeliaca *Ger.* Monspeliensium *Park*. Monspessulana purpurea *J. B.* In arenosis maris litoribus prope montem Ceti, & alibi. v. *Bot. Monsp.*
- Corruda v. Asparagus.
- Cornus mas *Ger.* sylv. mas C. B. mas fructu rubro *Park*. *The Wild Cornelian Cherry-Tree.* In sepibus Pedemontanis & Mediolanensibus frequens. Circa Romam in sylva Farnesiana.
- M. Coriandrum minus testiculatum C. B. minus odorum *J. B. Park*. alterum minus odorum *Ger.* *Testiculate Coriander.* Junio mense nobis occurrit in
fato.

fatorum marginibus extra urbis portam dictam *lou Peirou*.

Coronopus foliis acutis in margine dentatis. *Plantagini* affinis *Bibinella* Siciliae herbula *J. B.* *Coron.* *Prochytæ* insulæ *Col. Park.* *Cor.* *Sylvestris* hirsutior *C. B.* An *Plantago* altera angustifolia serrata *Clus. cur. post. Park?* Prope Messanam in lingula illa quæ portum efficit, & alibi in Sicilia.

Col. *Coronopus* minimus tenuifolius maritimus *Col. tenuif. maritimus Park.* marit. tenuifol. lævis *C. B.* In moeniis Castri Ovi dicti Neapoli.

Coronopus *Massiliensis* *Lobelii J. B.* *Coron.* five *Serpentina* minor *Ger.* *Holosteum* VIII. five *Massiliense* *C. B.* Circa Massiliam observavimus, ubi & *Lobelius*.

M. *Coronopus* *serpentina J. B.* *Holosteum* strictissimo folio majus *C. B.* Provenit in herbidis collibus, circa pagum *S. Martin* ad lavam montis *Lupi*.

Coronopus maritimus *Rainaudeti J. B.* *Coronopi* & *Sedi montani* media planta *Massiliensium Lob.* In arenosis ad mare prope Massiliam.

S. *Coronopus* *Siculus* fruticosus *platyphyllos Bocon.* In plaga maritima *Brazzetto* dicta propè *Pachynum Promontorium*.

C. *Cortusa J. B.* *Sanicula Alpina* seu *Cortusa Matthioli Park.* *San. Alp.* *Clusii* seu *Cortusa Matthioli Ger.* *San. montana* latifolia laciniata *C. B.* *Bears Ear-Sanicle.* Promiscuè nascitur cum *Sanicula Alpina* guttata in Austria & Stiria Alpibus, locis umbrosis.

Cotoneaster v. Chamæmispilus.

Cotinus Matthioli. *Coccigria* seu *Cotinus* putata *J. B.* *Coggygia* *Theophrasti*, vel *Cotinus coriarius Plinii Ger.* *Coggygia* seu *Cotinus coriaria Park.* *Cocconilea* seu *Coggygia C. B.* Prope pontem quem transimus eundo à *Gratianopoli* ad fontem quem vocant ardentem.

C. *Cotyledon* altera 4. seu *Matthioli Clus.* media foliis subrotundis *C. B.* altera minor *Park.* quoad iconem. In *Sneberg* reliquisque Austriae & Stiria Alpibus, faxis & scopulis inhærens. *C. Co-*

- C. Cotyledon altera 5. *Clus.* Sedi species seu Cotyledon altera Etscheriana, lanugine alba hirsutis foliis *J. B.* media subhirsuta, floribus punctatis *C. B.* In Etscherianis jugis Junico.
- C. Cotyledon altera 2. *Clusii Ger.* Sedum majus montanum dentatis foliis *C. B.* Sedum majus alterum flore Atlante *Park.* An Sedum latifolium floribus magnis albicantibus *J. B.* In omnibus jugis urbi Viennæ vicinis, atque in Austriacis Stiriacisque Alpibus.
- B. Cotyledon minor foliis subrotundis ferratis *C. B.* In Helvetiorum Alpibus.
- Cotyledon media foliis oblongis ferratis *v.* Sedum.
- Crista galli spicata flore luteo magno Messanensis. Descriptionem *v. Hist. nost. p. 769.* Ad latera montium Messanæ imminetium. Hæc planta est quam in Catalogo exterarum pro Melampyri specie, titulo *Melampyri erecti flore luteo amplo* posuimus.
- Crista galli spicata flore vario ex albo & purpureo Messanensis. *Trixago Apula unicaulis* ~~Melampyris~~ *Col.* An Antirrhinum folio ferrato *J. B.*? Quod prope Monspelium in ora maritima, vulgo *Plage*, quæ respondet prædio dicto *Aresquies*, inter juncos, versùs Miram vallem & Frontignanam invenit. Cum priore, à qua fortè non differt specie. *Chamædrys unicaulis spicata C. B.* dicitur.
- Crista galli mas *J. B.* A foemina differt altitudine majore, caule robustiore, foliis latioribus, floribus multò majoribus, utriculis hirsutis. In pratis circa Genevam unà cum foemina.
- Crithmum 4. *Matth.* quartum Matthioli umbelliferum *J. B.* Eryngium arvense foliis ferræ similibus *C. B.* Inter segetes in Germania circa Rhenum frequens.
- † Crithmum spinosum *Ger.* maritimum spinosum *C. B.* maritimum spinosum, sive Pastinaca marina *Park.* Pastinaca marina, quibusdam Secacul, & Crithmum spinosum *J. B.* *Chozy-Sampire* oz *Sea Parsnep.* In arenosis Maris Mediterranei litoribus nusquam non obvium. Invenitur & in Anglia.

Crithmum Siculum, *Baticulæ alterum genus Cæsalpino Botcon.* Asperis & saxosis gaudet locis, ut *monte Peregrino* prope *Panormum*, &c.

Crocus vernus latifolius flore purpureo *Ger.* vernus minor purpurascens *C. B.* vernus latifolius, flore purpureo minore *J. B.* In agris & pascuis circa *Romam*, inque montosis pascuis circa *Curiam Rhætorum*; necnon in summitatibus montis *Juræ*.

M. Crocus vernus minor alter flore minori ex albo purpureo *J. B.* vernus angustifolius 2. *Clus.* *Februario* & *Aprili* mensibus florentem invenit *D. Magnol* in loco dicto *la Garrigue dau Tarral*, ad dexteram viæ *Regiæ*, quâ itur ad pagum *S. Jean de Vedas*, in sterilibus etiam circa *la Colombiere*.

Cruciata minima muralis *Col.* minima in maritimis *Cæs.* *Rubia echinata saxatilis* *Park.* *Rubeola echinata saxatilis* *C. B.* *Rubia quadrifolia verticillato semine.* *The least Wall Cross-wort.* In arenosis juxta mare propè *Liburnum*.

Cucumis asininus *Ger.* agrestis five asininus *Park.* sylv. *Asininus dictus* *C. B.* sylv. five *Asininus* *J. B.* *Cucumis Elaterii* sylv. *Lob.* *Wild Cucumber.* In locis ruderatis & ad vias in *Sicilia*, *Italia* & *Gallia Narbonensi* frequens.

Cyanus pulchro semine Centaurii majoris *J. B.* *Chondrilla* rara purpurea, *Crupina Belgarum* dicta *Park.* rara, purpurante flore, semine nitido deciduo *Lob.* foliis laciniatis serratis, purpurascente flore *C. B.* *The bearded Creeper.* Circa *Montspelim* in colle *Castri novi*, necnon prope *Scaleam* in Regno *Neapolitano*.

T. Cyanus major Alpinus foliis incisfis *Triumfetti.* In altissimo illo asperrimoque *Aprutii monte*, quem vulgus *Hortum Centauri* nominat.

Cyanus major *Lob.* *Ger.* major vulgaris *Park.* *Alpinus* radice perpetua *J. B.* montanus latifolius, vel *Verbasculum cyanoides* *C. B.* *Great Blue-bottle.* Primò invenimus in montibus prope *Spadam urbeculam*, postea etiam in monte *Jura* prope *Genevam*.

Cyanus repens latifolius C. B. *Ger.* peramarus repens, folio *Lavendulæ* *J. B.* repens latifolius *Lobellii Park.* Circa *Monspelim* frequens, in pratis *Lateræ* aliisque locis humidioribus.

Cyclaminus folio rotundiore elatior *J. B.* *Cyclamen orbiculato folio*, infernè purpurascente C. B. orbiculato folio *Ger.* Autumnale vulgare, folio rotundo *Park.* In montibus circa *Genevam* Junio & Julio floret. Invenimus etiam in *Alpibus Stiriacis.* **Round-leaved Autumnal Sowbread.**

Cyclamini hujus caput interdum in longitudinem excrescit, & in duo velut cornua dividitur, ut nos post *J. Bauhinum* observavimus, cum in *Alpibus Stiriacis* aliquot ejus radices erueremus. Proinde species frustra multiplicare videtur C. B? Cum *Cyclamen* longius radicatum *Gesneri*, & *Cycl.* radice instar capitis *Arietini ejusdem* species ab hac distinctas facit.

Cyclamen folio anguloso *J. B.* *Hederæ folio* C. B. *Lob. Ger.* Autumnale folio *Hederæ Park.* **Ivy-leaved Autumnal Sowbread.** In collibus sylvosis prope *Romam* abundat Septembri mense florens. Hæc species in hortis nostris frequentissima est.

Cyclamen vernum *Lob. Ger.* folio anguloso C. B. **Ivy-leaved vernal Sowbread.** In sylvis quas transivimus itinere à *Massa* ad *Lucam.* Aprili mense floruit, nec aliter quàm florendi tempore à præcedente differre nobis visum est.

M. *Cyclamen Byzantinum* *Clus.* radice *Castanæ* magnitudine C. B. Pluribus in locis montis *Capouladou* sub buxis inter rupes reperitur, præcipue à *la cote de Sauvabelle* & à *las Cambrettes. Botan. Monsp.* Neque hæc aliter quàm tempore florendi & florum multitudine à præcedente differre videtur.

Cymbalaria C. B. Italica hederacea *Park.* Italica *Ger.* flosculis purpurascentibus *J. B.* *Basileæ* in ipsis urbis muris. At in Italia nihil frequentius in uliginosis parietibus, maceriis, & saxis. Quamvis *Linariæ* species genuina sit, quia tamen *Cymbalariæ* nomine notior est, eam hoc in loco reliquimus.

Cyminum sylvestre alterum Dioscoridis Itatorum *Lob.*
Cuminum corniculatum sive Hypecoon Clusii *Ger.*
Hypecoon C. B. filiquosum *J. B.* legitimum Clusii
Park. In Sicilia, lingula illa Portum Messanensem à
freto Siculo dirimente.

Cyminum sive Cuminum sativum *J. B.* vulgare *Park.*
sativum *Ger.* semine longiore C. B. *Cummin.* In
Insula Melita magnâ copiâ feritur.

Cyminum seu Cuminum seminibus hirsutis seu villosis
Hough Cummin. In insula prædicta cum præce-
dente succrescit, sed rariùs.

Cyminum dulce Melitensum nihil aliud est quàm Ani-
sum, ut superius diximus.

Cynacrambe legitima v. Alsine foetida.

Cynoglossum minus *J. B.* C. B. minus flore cœruleo
Park. Cynogl. pumilum Austriacum alterum *Clus.*
The lesser Hounds-tongue. Circa Moguntiam &
Genevam se nobis obtulit.

M. Cynoglossum Creticum angusto argenteo folio C. B.
Creticum angustifolium *Park.* An Cynoglossæ vul-
garis minor species & candidior *J. B.*? Abundat in
sterilibus locis, circa Salenovam, *Mommau, la Valette*
& alibi.

Col. Cynoglossa montana maxima frigidarum regionum
Col. Cynoglossum montanum maximum *Park.* An
sylvaticum rubente caule C. B.? In Apenninis monti-
bus excelsis, & summitatibus Campoclarensum, *Ma-
tesio*; & *Æquicolorum, Rascoino.*

Cynoglossum fructu umbilicato C. B. subrubente versi-
colore flore *Park.* Cynoglossa altera media, fructu
κοτυλώδη sive *λυχνιδώδη* *Col.* An Cynogl. Creticum 2.
Clus.? In Valventium Anversæ oppidi montibus, eo-
rûmque radicibus.

Cynoglossa media argentea Apula campestris calidarum
regionum *Col.* An Cynoglossum Creticum 1. *Clus.*?
In sabulosis Cirinolæ & Apuliæ calidæ regionis.

Cynoglossa media montana incana-angustifolia altera,
flore globoso, frigidarum regionum *Col.* Cynoglos-
sum globoso flore C. B. medium montanum an-
gustifolium *Park.* In *Æquicolorum* montibus *Cor-
nino*

nino dictis, locis frigidis, saxosis, & nudis sine arboribus.

Cyperus longus Ger. longus odoratus *Park.* odoratus radice longa seu *Cyperus Officinarum* C. B. paniculâ sparsâ speciosâ *J. B.* In pratis circa Monspelium. Observavimus etiam in Italia & Sicilia. *Sweet Cyperus* or *English Galingale.*

Cyperus paniculis squamosis an *Trasi.* *Cyperus esculentus* C. B. esculentus seu *Trasi* Italicorum Ger. *emac. Trasi* *J. B.* *Cyp. dulcis rotundus esculentus*, *Trasi* dulce vocatus *Park.* *Sweet Cyperus* or *Rush-Rut.* In Sicilia collegimus.

Cytisus glaber filiquâ latâ *J. B.* *Cytisus* Ger. glaber, foliis subrotundis, pediculis brevissimis C. B. *Pseudocytisus* foliis subrotundis *Park.* *Smooth-leaved Shrub-trefoil.* In clivis maritimis prope Salernum. Invenitur etiam circa Monspelium. *v. Bot. Monsp.*

Cytisus incanus filiquis falcatis C. B. *Maranthæ Matthiolo* Lob. filiquâ incurvâ, folio candicante *J. B.* 7. cornutus Ger. Galeni creditus *Maranthæ*, cornutus *Park.* Ad Baias in Italia invenimus.

Cytisus hirsutus *J. B.* *Hispanicus arboreus* *Park.* incanus vel hirsutus VI. seu foliis subruffa lanugine hirsutis C. B. *Pseudocytisus hirsutus* Ger. The most common hairy *Shrub-trefoil.* Hic in magnum fruticem adolescit, estque in Italia & Sicilia vulgarissimus.

Cytisus foliis viridibus minoribus quasi complicatis. An *Cytisus Hispanicus* 2. *Clusii* *J. B.* ? i.e. foliis angustis, incanis, quasi complicatis C. B. ? *Pseudocytisus* 2. Ger. *Hispanicus secundus* *Park.* C. Bauhinus adnotat hunc circa Monspelium foliis esse viridibus; qualem in luco Gramuntio circa sata frequentem esse scribit *D. Magnol.*

Cytisus 5. *Clus.* incanus Ger. incanus Germanicus *Park.* incanus folio oblongo Austriacus C. B. *Clusii Pannonicus* alter, foliis omnino incanis *J. B.* Toto Viennensi agro, & alibi in utraque Austria & Pannonia, locis aridis propter vias.

Cytisus hirsutus major, foliis pinnatis C. B. pinnatus Ger. incanus major foliis pinnatis? five secundi species altera

altera *Park.* Cytisi secundi species altera Pannonica Clusio hirsuta valdè *J. B.* Juxta sepes in Pannonia & Austria sed rariùs & minùs obviùs superiore.

Cytisus supinus, foliis incana lanugine inferne pubescentibus *C. B.* hirsutus *Ger.* Aultriacus sive *J.* Clusii *Park.* tertia Clusii Pannonica, sparsis ramis *J. B.* In sylvula quadam ad *Lachn* pagum primo ab urbe mill. & plerisque aliis locis prope urbem: inque Pannoniæ sylvis & Interamni.

Cytisus supinus foliis infernè & filiquis molli hirsutie pubescentibus *C. B.* Pannonicus, sive septimi species altera Clusii *Park.* Cytisi tertii Pannonici secunda species Clusio, supinis ramis *J. B.* In solis Pannoniæ sylvis Maio mense florens.

Cytisus supinus sylvestris Ratisponensis floribus luteis ad exortum foliorum prodeuntibus *Cat. Hort. Med. Altdorf.* In Suevia & Bavaria prope Ratisbonam.

Cytisus glaber nigricans *C. B.* Cyt. Gesneri, cui flores ferè spicati *J. B.* Cytisus *Ger.* Pseudocytisus niger *Park.* In Austria & Stiria, itinere à Vienna ad Venetias, copiosum observavimus.

Cytisus spinosus Acacia dictus. Acacia altera trifolia *Ger. 2.* seu trifolia *C. B.* secunda seu altera Dioscoridis *Park.* altera Dioscoridis notior Europæa, folio Cytisi, facie & filiquis Genistæ-sparti spinosi *Lob.* Aspalathus *2.* trifolia, quæ Acacia *2.* Matthiolo trifolia *C. B.* In Sicilia prope Messanam; Italia circa Neapolin, & Gallo-provincia circa Tolonam portum. Habetur etiam circa Monspelium. *v. Bot. Monsp.*

D.

- D** Amalsonium v. Helleborine.
 Daucus Creticus semine hirsuto *J. B.* Alpinus Cretico similis *Park.* Alpinus multifido longoque folio, five montanus umbellâ candidâ *C. B.* In summitatibus montis Juræ.
 Daucus 3. Dioscoridis *Col.* Apium IX. seu peregrinum foliis subrotundis *C. B.* Visnaga minor quorundam, Selinum peregrinum Clusio, semine hirsuto *J. B.* Selinum seu Apium peregrinum Clusii *Park.* In sepibus circa Messanam Siciliæ urbem: item circa Romam. *Cat. Rom.*
 Daucus glauco folio similis Foeniculo tortuoso *C. B.* An Peucedanum Pannonicum *Clus?* At *P. Magnol* ad Saxifragam Pannon. *ejusdem* propius accedere putat. In collibus inter vepres juxta *Castelneuf*, Montpelio non longé.
 B. Daucus montanus Apii folio, flore luteo minor *C. B. prod.* In Calenberg & prope oppidum Baden Austriæ. *Buxserus.*
 M. Daucus montanus folio Foeniculi longiore. *Bot. Monsp.* Peucedanum Pannonicum *Clus.* Saxifraga *Matth.* tenuifolia & umbellifera *J. B.* Reperitur in monte *Capouiadou.* Copiosum etiam invenit *D. Magnol* Augusto mense cum semine, ascendendo montem *Boufquet*, versûs pagum *Seine.*
 A. Daucus pratensis Apii folio, odore Pastinacæ *C. B.* Daucus Seselios pratensis facie *Fungermanni.* Extremitatibus foliorum acutis est & splendidibus, caule striato q. alato, umbella florum candida. Loca vide in *Cat. Altd.* In pratis humidis Michelsfeldæ.
 B. Daucus Allaticus *C. B. prod.* In dumetis Alsatia superioris, inque inferioris pratis humidioribus inter Selestadium & Argentinam abunde.

Z. Dau:

- Z. *Daucus Siculus* *Pastinacæ* foliis *Zanoni*. E semine Panormo misso ortus est.
- Z. *Daucus secundus Siculus* *Sophiæ* foliis *Zanoni* Panormo semen habuit à P. Boccone missum.
- Daucus Selinoides* v. *Saxifragia Venetorum*.
- Delphinium* simplici flore purpureo-coeruleo vulgare *J. B.* *Consolida regalis arvensis* *C. B.* *regalis sylvestris* *Ger.* *Delphinium* sive *Consolida regalis sylvestris* *Park.* In Germania, Italia & Gallia Narbonensi inter segetes. *Wild or field Larks=spur.*
- Delphinium* flore minore obsoletè coeruleo, folio latiore. Flos Capuccio 2. *Cas.* *Consolida regalis latifolia* parvo flore *C. B.* *reg. peregrina* parvo flore *J. B.* In insula Melita circa urbem novam in rudibus & muris; alibi etiam in Sicilia & Italia vidimus.
- Dens caninus* flore albo *Ger.* canis rotundiore latiorèque folio *C. B.* *Dogs=tooth Violet.* In montibus Liguriæ eundo à Nova oppido ad Genuam. In Appennino etiam & Euganeis montibus.
- Dens caninus* flore purpureo *Ger.* *Erythronium* flore purpureo *Lob.* *Satyrium* quorundam *Erythronium bifolium* flore albo & purpureo. *J. B.* Propè Augustam Taurinorum ad latera montis quem ascendimus, eundo inde ad Astam.
- Dens leonis bulbosus* *Ger.* 3. seu *Asphodeli bulbulis* *Park.* *Bulbous=Dandelion.* Circa *Sellam* novam vicum Monspelio vicinum, item circa Romam copiose. *Cat. Rom.*
- M. *Dens leonis* foliis radiatis. Folia ad radicem in orbem pulchrè disposita habet: reliquam descriptionem vide in *Bot. Monsp.*
- B. *Dens leonis* tenuissimo folio *C. B.* *prod.* *Hieracium* 3. foetidum *Col.* In Aultria prope montem *Dravensstein.* *Burserus.* In herbidis viis circa Monspelium frequentissimè occurrit, & mira foliorum varietate ludit. *Magnol.*
- J. B. *Dens leonis* sive *Hieracium* Narbonense rotundifolium caule aphylo *J. B.* In satorum marginibus circa Boutonetum frequens est.

M. Dens leonis latiore & rotundiore folio *C. B.* Hieracium Narbonense rotundifolium caule aphylo *J. B.* In fatorum marginibus sabulosis circa Boutonetum frequens est. *Bot. Monsp.*

Dentaria aphylos purpurea cespite denso. Ex singulis squamis singulos promit flores, pediculis semuncialibus insidentes, è calyce amplo, in 5. lacinias diviso, galetatos, magnos, purpurascens cum staminulis intus plurimis. Calyx striatus, turgidulus. In Italia eundo à Lericio ad Lucam in umbrosis observavimus.

Dentaria heptaphyllos *C. B. Park.* heptaphyllos *Clusii Ger.* Coralloides altera seu septifolia *J. B.* ~~Septfoil~~ ~~Toothwort.~~ In Juræ & Salevæ montibus propè Genevam copiosè.

A. Dentaria baccifera *Clus.* heptaphyllos baccifera *C. B.* bulbifera *Ger. Park.* coralloides bulbifera *J. B.* Alabastrites alter *Lob.* Circa Altdorfium, loca quære in *Cat. Alt.*

Dentaria pentaphyllos *C. B. Park.* pentaphyllos *Clusii Ger.* quinquefolia *J. B.* ~~Cinquefoil~~ ~~Toothwort.~~ In sylvis jugis montis Juræ copiosè.

A. Dentaria tryphyllos *Clus. hist. C. B. Park.* enneaphyllos *Clusii J. B.* *Dentaria* coralloide radice seu *Dentaria* enneaphyllos *Ger.* ~~Trefoil~~ ~~Toothwort.~~ Circa Altdorfium : loca vide in *Cat. Altd.*

A. Dentariæ majori similis, albidior & tenerior ; suaviter odorata, foliis destituta, Orobanche Hypopitys dicenda cum *C. B. in Prod.* In sylvis quibusdam opacis sub pinibus & piceis *Cat. Altd.*

Dentellaria Rondeletii v. *Plumbago.*

Dictamnus albus *Officinarum* v. *Fraxinella.*

Digitalis lutea magno flore *C. B.* lutea folio latiore, flore majore *J. B.* amplo flore *Park.* In montibus circa Genevam, & in Germaniæ montosis.

Digitalis lutea vel pallida parvo flore *C. B.* flore minore subluteo, angustiore folio *J. B.* Cum priore. Invenimus etiam circa Salernum & Neapolin in Italia. Reperitur & in herbidis declivibus montis *Capouladori* propè Montpelium. *Bot. Monsp.*

Diospyros *J. B.* v. *Amelanchier.*

B. Dipsa-

8. *Dipsacus* folio laciniato *C.B.* sylv. folio laciniato *J. B.*
Park. Inter *Horburgum* & *Colmariam* in *Allatia* *J. B.*
Doronicum vulgare *J. B. Park.* majus *Officinarum Ger.*
Romanum Lugd. radice *Scorpii C. B. Common*
Leopards-bane. In montibus prope *Genevam* copiose.
C. Doronicum *Cyclamini* folio, nigra radice, *Campocla-*
rense Col. In monte *Matesio*, locis *Borealibus*.
M. Doronicum integro & crasso folio *Bot. Monsp.* An
Dor. Helveticum incanum *C. B.* ? quod ex *Helveticis*
Alpibus attulit *Burserus*. In herbidis locis montis *Ser-*
rane frequens est, & *Junio* mense floret. Proximè ac-
 cedit ad *Tussilaginem* *Alpinam* folio oblongo *J. B.* si
 non idem sit.
A. Doronicum *Plantaginis* folio II. *C. B. 5.* *Germa-*
nicum Clus. *German.* foliis semper exadverso nascenti-
 bus villosis. *J. B. Alisma* & *Damasonium Matth.*
Nardus Celtica altera & *Plantago Alpina Lob.* *Ca-*
lendula Alpina Ger. In monte *ædi Gnadenberg* versus
 meridiem opposito, *Jun. v. Cat. Altd.* Item, in omni-
 bus ferè pratis sublimioribus ad *Alpium* radices. *Clus.*
C. Doronicum radice dulci *C.B.* folio subrotundo serrato
J. B. Dor. 3. *Austriacum* alterum *Clus.* brachiata ra-
 dice *Park.* radice repente *Ger.* In *Etscher*, *Durren-*
stein & quibuldam aliis *Austriacarum* *Stiriacarumque*
Alpium jugis inter saxa, *Julii* initio.
C. Doronicum *Stiriacum* flore amplo *Ger. emac.* humile
Stiriacum Clusii Park. latifolium flore magno *C. B.*
 folio lato, flore magno. In *Veytzalben* supra *Neu-*
berg in *Stiria*.
C. Doronicum 6. *Pannonicum Clus.* *Alisma Matthioli*
 seu *Plantago montana J. B.* In cæduarum sylvarum
 declivibus *Nemetum* vicinis. De hac planta quam
C. Bauhinus aliique præcedenti eandem volunt v. *Hist*
nost. p. 276.
C. Doronicum maximum *Austriacum* sive 7. *Clus.* max.
Ger. max. Austriacum Park. max. foliis caulem am-
 plexantibus *C. B. max.* foliis *Hyoscyami Peruviani* modo
 caulem amplectentibus *J.B.* Locis umbrosis in descensu
 jugi *Wechsel* secundum rivos ; item in sylvosis decli-
 vibus *Etscheri* & *Herrenalben*, &c. Augusto copiose.
 C. Dor-

- C.** *Doronicum Austriacum angustifolium* *Ger. Park.* longifolium hirsutiae asperum *C. B.* *Doronici* species ex horto Ferrariensi folio oblongo hirsuto *J. B.* In Sneberg inque Snealben & Neuberg, ast copiosissimè in summo Etscheri jugo inter saxa.
- B.** *Doronicum Helveticum humile crassius foliis* *C. B. prod.* In Vallesianorum jugis *auff de Gemme* dictis. *Burser.*
- Dorycnium Monspeffulanum fruticosum* *J. B.* suppositivum Monspelienſe & Hispanicum *Park.* Hispanicum *Ger.* Trifolium album angustifolium, floribus velut in capitulum congestis *C. B.* In saxosis collibus & ad sepes circa Monspelium.
- Dorycnio* congener planta *J. B.* *Dorycnio* congener Clusii *Park.* Lotus pentaphyllos incanus *C. B.* In palustribus prope mare non longè à Monspelio: in Germania ad fluvium Lycum prope Augustam Vindelic. & alibi.
- Draba alba filiquosa* *C. B. Park.* prima repens *Ger. emac.* Hesperis Alpina seu muralis minor repens *J. B.* *White codded Arabian Mustard.* In montibus Jura & Saleva, praesertim locis humidis ad aquarum scaturigines.
- Draba vulgaris* *Park.* *Diolcoridis* *Ger.* multis flore albo *J. B.* *Draba umbellata* vel *Draba major* capitulis donata *C. B.* *Common Arabian Mustard.* Antverpiæ intra ipsos urbis muros: Quin & in Germania, Italia, Gallia non infrequens.
- Draba lutea* *Park.* lutea filiquis strictissimis *C. B. 4. Ger.* In Germania primò vidimus spontaneam, viis humidis ad sepes, prope *Weissenberg* oppidum, postea in Italia saepius, locis similibus.
- Draba filiquosa* *Lysimachiae* facie, an *Myagri* species. In alveo torrentis cujusdam prope Florentiam Etruriæ urbem.
- M.** *Draba filiquosa floribus violaceis* *Hort. Blæf.* *Leucoium marinum* alterum latifolium *Lob. ob.* In declivibus montis *Capouladou*, inter rupes primo vere floret in loco dicto *las Cambrettes. Bot. Monsp.*

C. *Draba* tertia succulento folio *Clus.* *Draba* alba filiquosa repens C. B. *Park.* altera repens Ger. *Hesperidi* Alpinae five murariae affinis, *Draba* succulenta *J. B.* In declivi montis *Herrenalben* supra *Zeehoff* villam coenobii *Gamingensis*.

Dracunculus aquaticus Ger. *J. B.* noster aquaticus *Park.* palustris five radice *Arundinacea* *Plinii* C. B. In *Hollandiae* fossis prope *Sevenbuys*. Radice arundinacea geniculata calamus aromaticum repraesentat. *Water-Dragon* oz *Iron*.

B. *Dracunculus* Alpinus folio *Scabiosae* C. B. *prod.* *Parmica* Alpina seu *Dracunculus* Alpinus folio *Scabiosae* *Park.* In *Helvetiorum* pratis Alpinis prope *Fabarias* & in *Gothardo*.

E.

E *Chinopus* v. *Carduus* *Sphaerocephalus*.
Echium Alpinum luteum C. B. v. *Trachelium*.
Echium majus & asperius flore albo C. B. flore albo majus *J. B.* Great white-flower'd *Wipers* *Bugloss*. In agro *Salernitano* & *Romano*, inque *Etruria* & *Gallia Narbonensi*.

Echium sylvestre hirsutum maculatum C. B. 2. vel rubro flore *Clus.* Ger. *emac.* *J. B.* *Park.* In satorum marginibus 4. circa *Monspelim* sparsim cum vulgari *Echio*. *Botan. Monsp.* Nos etiam circa *Messanam* observavimus: & *Echium* flore purpureo, foliis maculatis alba hirsutiae P. *Castelli* in *Catalogo Messanensium* esse existimamus.

M. *Echium* majus & asperius floribus dilute purpureis *Bot. Monsp.* *Lycopsis* altera *Monspeliaca* floribus dilute purpureis C. B. Circa *Lateram* in herbidis pratorum marginibus, & circa *la Valette* saepius collegit *D. Magnol*.

Echium

Echium Candide latifolium rubrum C. B. Park. An *Echium Candide* flore pulchrè rubente *J. B.* Red broad-leaved Candy Wipers Bugloss. In Gallie Narbonensis locis plurimis copiosè; circa Monspelium tamen rariùs occurrit. Flore erat dilutè rubente, uti planta *Clusio* descripta.

C. Echium pullo flore Ger. Clus. Park sylvestre lanuginosum *C. B.* Multis in locis Viennæ vicinis, tota etiam inferiore Austria & Pannoniæ parte siccioribus pratis, &c. Maio.

Col. Echium luteum minimum C. B. An *Echium flavo* flore *Clus. cur. post?* *Echioides lutea minima Park.* lutea minima Apula campestris *Col.* Cirinolæ frequens.

Echium procumbens flore parvo coeruleo. In Sicilia circa Messanam observavimus.

Elatine folio acuminato, flore coeruleo C. B. flore coeruleo, folioque acuminato Park. Blew-flowered fluellin. In Sicilia, Italia, Narbonensi Gallia inter segetes passim. Non alia in re quàm Floris colore à vulgari *Elatine acuminato folio* differt.

Epimedium Lob. Ger. C. B. Park. &c. quorundam *J. B.* Warrenwort. In Alpibus non longe à Pontieba itinere à Vienna ad Venetias collegimus.

B. Equisetum palustre Linariæ scopariæ folio C. B. prod. & Cat. Bas. In paludibus Michelfeldæ.

B. Equisetum palustre minus polystachion C. B. prod. & Cat. Bas. In aquis Michelfeldensibus.

B. Equisetum palustre tenuissimis & longissimis setis C. B. prod. & Cat. Bas. In palustribus Michelfeldensium.

B. Equisetum nudum minus variegatum Basiliense C. B. prod. & Cat. Bas. Ad ripam Rheni juxta locum die Boar dictum.

Erica arborescens floribus luteolis vel herbaceis minimis J. B. arborescens 4. Clus. major scoparia foliis deciduis C. B. recte scoparia Park. In luto Gramuntio circa Monspelium, inque ericetis prope Liburnum. Besome-Heath with deciduous leaves.

Erica arborescens Monspeliensis flore purpurascente, ramulis ternis *J. B.* Er. ramulis per intervalla ternis *Ger. C. B.* Coris folio 5. *Clus.* Maxima hæc est & altissima omnium quas hæcenus observavimus *Ericarum*. In itinere à Nova ad Genuam, ubi primò nobis occurrit, vidimus quæ humanam altitudinem longè superaret, Aprilis initio florere incipientem. Flosculi dilutâ purpura obiter tinguntur. In sylva Grammontia tantam altitudinem non assequitur.

Erica folio Corios multiflora J. B. maxima purpurascens longioribus foliis *C. B.* Juniperifolia densè fruticans *Narbonensis Lob.* *Ericæ Coris folio secundæ species altera Clus.* Coris folio maxima purpurascens *Park.* Circa Pedenatium quâ inde Monspelium itur copiosè, item eundo à Monspelio ad oppidum *S. Lupian* secus vias. Serius & sub finem ætatis inque multum Autumnum floret. Alibi elatior, alibi ut in Anglia humilior est.

M. Erica Coris folio maxima alba Park. folio Corios flore albo *J. B.* major flore albo *Clusii Ger.* folio Coridis *I.* seu maxima alba *C. B.* *Great white-flower'd Heath.* In plerisque collibus Valenæ sylvæ *Monspeliensis C. B.* Hæc omnium quas unquam conspexit *Clusius* *Ericarum* maxima est. A præcedente non tantum floris colore, sed & aliis accidentibus differt. In Lusitaniæ solitudinibus inter *Ulyssipponem* & *Conimbriam*.

M. Erica major floribus herbaceis purpurantibus Lob. Ex herbaceo purpureis *C. B. Park.* Coris folio 3. *Clus.* foliis Corios quaternis, floribus herbaceis, deinde ex albo purpurascens *J. B.* *Great Heath with purplish green flowers.* In luco Grammontio & alibi circa Monspelium *C. B.*

Erica procumbens dilutè purpurea C. B. Coris folio 7. *Clusii Ger.* foliis Corios, flore purpureo dilutionis coloris *J. B.* procumbens sive supina pallidè purpurea *Park.* *Pale purple low Heath.* In Alpibus *Stiriæ* collectam habemus, locum non recordamur. In *Stiriæ* & *Austriacarum* Alpium præaltis jugis. *Clus.*

Erica procumbens ternis foliolis carnea *C. B.* parva *Pannonica*, foliis *Corios* ternis, flore carneo, capitulis *Thymi* *J. B.* *supina* carnea *Park.* *Coris* folio 9. *Clusii Ger. emac.* *Blush-flower'd leaning Heath.* Ad latera montium eundo à Tridento ad Bolzanum, & in rupium fissuris Martio mense abundè florentem observavimus. Octo apices nigræ è medio uniuscujusque floris eminent & apparent.

Erica procumbens herbacea C. B. foliis *Corios* 8. *Clusii* *supina herbacea Park.* parva, foliis *Corios* quaternis, flore herbaceo, foliaceis capitulis *J. B.* *Er. Cruciata Ger.* *Small greenish-flower'd Heath.* In sylvis montosis non longè Lindavia urbe ad lacum *Acronium* sita collegimus.

Z. Eruca Alpina radice serpente *Zanoni.* In montibus saxosis territorii *Bononiensis* & *Mutinenfis*, præcipuè in monte *Cimone.*

Eruca echinata siliquâ *C. B.* *Monspeliaca* siliquâ quadrangulâ *Park.* *Sinapi echinatum J. B. Lugd.* Inter segetes non longè à *Luca* in Italia: invenitur etiam circa *Monspelim.*

M. Eruca sylvestris minor *Bursæ pastoris* folio *C. B. prod.* minimo flore *Monspeliensis J. B.* An pumila *Bursæ pastoris* folio *P. Boccone?* Passim in vineis reperitur æstate & autumnò florens. *Bot. Monsp.*

S. Eruca pumila *Bursæ pastoris* folio *Boccon.* Exit in eunte Maio inter saxa oppidi *Montaperto*, non procul *Agrigento*: in agris etiam *Lutetiæ* vicinis frequenter reperitur.

Eruca cœrulea in arenosis crescens *C. B. cœrulea Park.* *Eruca purpurea* aliis cœrulea, sive *Viola petræa J. B.* Inter *Hertznach* oppidulum & *Moguntiam* urbem Germaniæ in arenosis. Hanc invenio in *Catal. Sicil. rariorum P. Boccone.* Loca v. in *C. B. prod.*

Eryngium montanum latis foliis magno capite oblongo cœruleo *J. B.* *Alpinum cœruleum* capitulis *Dipsaci C. B.* In monte *Thuir* reperit *J. Bauhinus* florere incipientem Julii principio. Ad nos quoque *Genevæ* delatum est ex montibus vicinis,

C. Eryn-

C. *Eryngium Pannonicum* five montanum *Park.* latifolium planum C. B. planum latifolium capitulo rotundo parvo *J. B.* In pratis ad Danubium supra infrâque Viennam frequens.

Eryngium cœruleum J. B. montanum Amethystinum C. B. In montibus Stiria. Solo summitatum colore à vulgari campestri differre videtur.

S. *Eryngium capitulis Psyllii Siculum P. Boccon.* In neglectis agris & aridis ut plurimum locis nascitur circa *Saccam, Panormum, Agrigentum, &c.*

Erysimum Matthioli alterum *Lob.* alterum Italicum *Ger.* verum five montanum *Park* alterum Matthioli, filiquis parvis, quibusdam Dentaria *J. B.* polyceratum five corniculatum C. B. In ipso maris litore ad Rhëgium Calabriae urbem ; itemque circa Monspe-
lium.

Erysimum Germanicum Trinciatae foliis. In arenosis & umbrosis prope oppidum *Rot* in Franconia.

M. *Erysimum latifolium* majus glabrum C. B. Irio Apulus alter laevi Erucæ folio *Col.* Sinapi Monspeffulanium lato folio, flosculo luteo minimo, filiquâ longissimâ *J. B.* In hujus plantæ synonymis errare videtur *D. Magnol* : Siquidem Sinapi Monspeffulanium lato folio, &c. longè diversa planta videtur ab Erysimo latifolio majore glabro C. B. (quæ in Anglia invenitur, nec filiquas habet longissimas) & Erysimo angustifolio majori C. B. eadem est ; vel certè ab utroque distincta.

Col. *Erysimum angustifolium* majus C. B. item Rapi-
strum Italicum filiquis longissimis *ejusdem,* angustifolium Neapolitanum *Park* Rapistrum montanum Iri-
onis *λεπτομακρόκερατον Col.* Juxta semitas saxosas, macerias atque ædificia montana Æquicolorum provenit.

Esula v. Tithymalus.

C. *Euonymus Pannonicus Ger. Park.* flore phoeniceo *J. B.* granis nigris C. B. 2. *Clus.* Black-berried *Spindle-Tree.* In sylvis utriusque Pannonia montibus, sed qui Alpes non attingunt : item in Mo-
ravia.

C. *Euony-*

C. Euonymus latifolius *Clus. C. B. Ger. Park. latifolia* *J. B.* In Pannonia interamni, nunc Sclavonia dicta, in sylva illa qua ex *Greben* arce descensus est versus Warasdinum, nec alibi.

Euphrasia pratensis lutea C. B. prat. major lutea Park. Coris Monspeffulana lutea J. B. Sideritis pratensis lutea Lugd. Primo hanc invenimus in Germania, non procul Altdorffio, Norimbergensium Academia, deinde in Etruria, tandem in Narbonensi Gallia.

B. Euphrasia lutea radice squammata C. B. prod. lutea minor radice squamata Park. Anonymos radice Dentariæ Col. Montosis asperis & humidis gaudet, inque Alpibus Helveticis, Austriacis & Pyrenæis reperitur.

Col. Euphrasia linifolia Col. part. 2. foliis Lini angustioribus C. B. minima Park.

Col. Euphrasia Italica latifolia altera C. B. purpurea latifolia Park. major sylvestris purpurea latifolia Col. In Æquicolorum collium semitis & quercetis & etiam depressioribus locis umbrosis & humentibus.

Euphrasia purpurea minor C. B. prod. Euphrasia tertia five media Col. Maio mense florentem invenit P. Magnol. Ultra pontem Salenovæ juxta viam qua itur ad pagum S. Jordi, in sterilibus locis dictis Garrigues. Flores & semina Antirrhini potius quam Euphrasie speciem arguunt. In pratis collium Italiae frequens est. Euphras. pratensis Italica latifolia C. B. pin. In calidioribus, ut Apulia & Cirinola; in pratis & pascuis variat floris colore & coma alba; in frigidis colore est semper purpureo. Col.

F.

Faba Veterum ferratis foliis *Park. Ger. App.* Arac-
cus sabaceus ferratus *J. B.* Black-Bean, or
Bean-like Wetch. Inter frutices circa Baias,
in Italia. Invenitur etiam circa Mospelium.

Ferrum equinum *Lob Ger.* equinum majus *Park.* equinum,
siliqua singulaxi *C. B.* Solea equina *J. B.* Horse-
Wetch. Circa Liburnum, Neapolin & alibi in Italia,
necnon circa Mospelium in Gallia passim. v. *Bot.*
Mosp. Cat. Rom.

Ferrum equinum Gallicum *Park.* Gallicum siliquis in
summitate *C. B.* Polygalon Cortusi *J. B.* Ad latera
montis Salevæ prope Genevam, & in Delphinatu circa
Gratianopolin. Circa Salenovam versùs *Foncaude*, &
in aliis incultis sæpiissime reperitur. *Bot. Mosp.*

M. Ferrum equinum siliqua multiplici *C. B.* Ferrum
equinum πολυκέρατον *Col.* equinum polyceraton *Park.*
In sterilibus dictis *la Garrigue dau Tarral*, & depres-
sis incultis montis Ceti, ubi vere cum flore & siliquis
sæpius legit *P. Magnol.*

Ferula *Lob Ger.* foemina Plinii *C. B.* tenuiore folio *Park.* folio
Foeniculi, semine latiore & rotundiore *J. B.* Fennel-
Giant. In montibus Messanæ imminentibus copiose,
& alibi in Sicilia & Italia: plurima quinetiam & pro-
cera in Narbonensi Gallia, præsertim illis rupibus præ-
ruptisq; faxis prope subterraneas cryptas, viâ quâ
Mospelio Frontignanam itur ad dextram, Lobelio
olim. nobis nuper observata.

Medullâ hujus caulium fungosâ pro fomite ad ignem
concupiendum nonnullos circa Messanâ & alibi in
Sicilia, usos observavimus, cum in insula illa pere-
grinaremur: unde intelligitur cur poeta tinxerint Pro-
metheum ignem coelestem cavâ ferulâ exceptum de-
portâsse in terram.

Ficus *f. B. vulgaris* *Park.* communis *C. B.* *The common fig-Tree.* In Italia & Gallia Narbonensi colitur frequentissima. Differentiæ seu varietates plurimæ sunt fructûs respectu.

Ficus sylvestris Dioscoridi, *Caprificus* Plinio *C. B.* *Caprificus* *Ger. f. B. Park.* *The wild fig-Tree.* In Italia & Gallia Narbonensi passim provenit. Inutiles & malignos fructus producit. *Magnol.*

B. Filipendula minor *C. B. prod. Park.* In asperis circa Monspelium. *Magnol.* vulgaris varietatem hanc facit.

Filix saxatilis non ramosa minima. An *Dryopteris Dalechampii* *f. B.?* In rupibus squalidis montium Juræ & Salevæ.

Flos Adonis flore rubro *Ger.* *Adonis* vulgò, aliis *Eranthemum* *f. B.* *Adonis sylvestris* flore minore atro rubente *C. B.* *Adonis-flower* or *Red-Matths.* Circa Liburnum inter segetes; item circa Monspelium. Mirum autem Clusium hanc speciem nusquam sponte nascentem observasse, cum ego solam hanc spontaneam invenerim.

A. Flos Adonis flore pallido *Cam. Tab.* *Yellow-Matths* or *Adonis-flower.* In arvis & lupuletis circa Altdorfium. Solo floris colore à præcedente differt.

M. Flos Adonis sylvestris flore phoeniceo, ejusque foliis longioribus *C. B.* *Adonis 2. Clus.* In satis circa Monspelii portam *du Peiron* & aliis circa Salenovam. Inter segetes in Gallia Narbonensi, universa Hispania, Italia, Moravia & Austria. *Clus.*

Foeniculum tortuosum *f. B.* *Seseli Massiliense* *Foeniculi folio*, quod Dioscoridis censetur *C. B. Park.* In Sicilia circa Messanam primò, postea circa Monspelium copiosissimum observavimus.

M. Fœnum Græcum sylvestre *C. B. Park Ger. emac.* *sylvestre Dalechampii* *f. B.* *Wild fenugreek.* Copiosè oritur ad lævam Ladi amnis, ultra pontem Castri novi in colle dicto *Ferrand*, Maio & Junio florens, Julio siliquas ferens. *Bot. Monsp.*

- B. *Frangula altera polycarpus* C. B. *prod.* in monte Muteto prope Basileam.
- A. *Fraxinus tenuiore & minore folio* J. B. humilior five altera Theophrasti, minore & tenuiore folio C. B. *Ornus & pumila Fraxinus Bellon.* Ex Lugduno vicinis montibus habuit J. B. In Mauritiano & *Schlipfberg* aliisque editioribus *Cat. Altd.*
- Fraxinella* Ger. *Park.* Cordi & Officinarum *Lob.* *Fraxinella*, Officinis *Dictamnus* J. B. *Dictamnus albus* vulgò five *Fraxinella* C. B. *Wastard-Dittary* oz *Fraxinella*. In præruptis montium Rheno vicinorum non semel vidimus. Copiosè reperitur in lucò de *Candiac* sex leucis *Monspelio* distante. *Bot. Monsp.* In *Pannonicis* sylvis passim & *Viennensi* saltu. *Chuf.*
- C. *Fritillaria vulgaris* *Park.* Ger. præcox purpurea variegata C. B. *Meleagris* five *Fritillaria dilutior & saturatior* J. B. *Common Fritillary* oz *chequered Lily.* In pratis quibusdam ad *Ligerim* flumen, non procul *Aurelia* Gallia urbe.
- Fucus lentus* *Foeniculaceus*, *Coralloides* lenta *Foeniculacea* J. B. In litore maris prope *Monspelim* cum aliis purgamentis ejectus. *Bot. Monsp.*
- M. *Fucus foliis Ericæ.* *Erica marina* quibusdam J. B. In *Scopulis* montis *Ceti.* *Bot. Monsp.*
- M. *Fucus fruticosus* caudice verrucolo, *Fruticosa* marina planta, quibusdam *Conserua* lignosa J. B. *Bot. Monsp.*
- M. *Fucus folliculaceus* ferrato folio C. B. *Lenticula marina* ferratis foliis *Lob.* *Sargazo* *Acoft.* *Lugd.* In maritimis propè *Monspelim*. *V. Hist. nost.* p. 1850. Hæc est quæ in Oceano magnâ copiâ fluctuat, ut navibus impedimento sit.
- M. *Fucus Fungis* affinis C. B. *Fuci fungiformes* J. B. In maris litoribus prope *Monspelim* reperitur.
- Fumaria tenuissimis foliis*, flore albo C. B. In vineis prope *Boutonetum* primo vere plurima oritur, à vulgari foliis multum diversa. *White-flower'd fumetory.*
- Fumaria minor* seu *tenuifolia* surrecta J. B. minor *tenuifolia* C. B. minor five *tenuifolia* Ger. *Park.* *Capnos* tenui-

tenuifolia *Clus. Lob. Fine-leav'd fumitory*. In arvis inter segetes prope Olbiam Gallo-provinciae oppidum. Reperitur etiam circa Monspelium; loca vide in *Botan. Monsp.* Hæc nobis, atque etiam *D. Magnol*, eadem videtur cum *Fumaria tenuifolia* compresso semine, Lini instar *Hort. Blas.* quicquid repugnat *D. Morison*. Nam & *Lobelius* semen compressum ei attribuit, & *Clusius* in icone sua hujusmodi semen appinxit, & *D. Magnol* se cum semine Lini legisse asserit. In viretis nostris sata, (ut rectè *Lobelius*) caducis & procumbentibus cauliculis oritur; quod errori ansam præbuit.

B. *Fumaria bulbosa* radice non cava major *C. B.* bulbosa radice solida, calcari & folio cristato *J. B.* *Aristol.* rotunda vulgaris radice solida *Trag.* *Bulbous fumitory with a solid root the greater.* Floribus est purpuro-rubentibus cum foliis intercedentibus incisis. In sepibus ad prata, & in *Monchenstein*. In sylvula ad Novam domum. *Cat. Bas.*

B. *Fumaria bulbosa* radice non cava minor *C. B.* Radix cava minor *Dod.* Capnos Fabacea radice *Lob. Lugd.* Hanc à præcedente non separat *J. Bauhinus*, siquidem, inquit, magnitudine tantum variant. In dumetis circa *Riehen*.

Fumaria bulbosa radice cava major *C. B.* Radix cava major alba & purpurea *Ger.* radice cava flore albo, & rad. cava flore purpureo *J. B.* Floribus est albis & incarnatis & egregiè rubentibus, foliis flores intercedentibus integris. Ubique fere ad sepes, inque scrobibus & umbrosis sepibus Alpium Helveticarum. Cum flore purpureo primo vere invenimus in agro *Mediolanensi.* *Bulbous fumitory or Hollowwort.*

Fungus petraeus Androsace dictus. *Androsace Matthioli Ger.* *Androsaces Matthioli*, five *Fungus petraeus marinus*, five *Umbilicus marinus J. B.* *Andr. Matthioli*, five *Cotyledon marina*, & *Umbilicus marinus Park.* *Androsaces Chamæconchæ innascens vel minor C. B.* In fundo stagni marini Volcarum inter Promontorium Ceti *Balleruch* copiosissimè, & alibi in eodem stagno.

M. Fungus

- M. Fungus coralloides cancellatus *Clus. f. B.* rotundus cancellatus *C. B.* In pinetis & locis uliginosis. *Bot. Monsp. App.*
- S. Fungus typhoides coccineus Melitenfis *P. Boccone.* Oritur in scopulo Melitæ insulæ dicto *Scoglio del Generale*; hinc ipse Fungus *Heritz tal General* lingua vernacula dicitur.
- S. Fungus Siculus subcoeruleâ pulpâ, arillis flavis repletus *P. Boccone.* Hujus coriacei corticis decocto Mesanenles mulierculæ pannos lanâsve subpurpurascente colore inficiunt.
- S. Fungus Malicorii facie *Boccon.* Oritur in sylvis Bargæ in Hetruria.

G.

- G** Aleopsis seu Urtica iners, flore purpurascente majore, folio non maculato *f. B. v. Lammium.*
- Galega Lob. Ger. f. B. vulgaris C. B. Park. Ruta capraria Gesn. Goats-Rue.* In Italia nunquam non obvia, ad aquarum rivos & fossas *f. B. Galitricium* folio rotundiore, flore magno violaceo *f. B.* In montium Tyrolensium pratis altis. Ob florem magnitudinem & formam inter Verticillatas insignis est hæc planta, & ferè singularis.
- Gallium rubrum Ger. C. B. flore rubro Park. flore rubro Sprengerianum f. B. nigro-purpureum montanum tenuifolium Col.* In itinere à Vienna Austriæ ad Venetias sæpius in conspectum se dedit.
- Gallium flore albo majus v. Mollugo montana.*
- Genista Hispanica Ger. juncea f. B. Spartum Hispanicum frutex vulgare Park. Spartum arboreescens feminibus Lenti similibus C. B. Spanisch-Broom.* In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi vulgarissima.

Genista argentea *J. B.* In planitie non longè ab oppido *S. Lupiani* quam transimus eundo à *Monspelio* ad montem *Lupi*.

Genista aculeata *Ger. Park* aculeata foliosa *J. B.* spinosa minor Germanica *C. B.* *Pickly Dwarf-Broom.* In Germania passim.

Genistella montana Germanica *Park.* *Lagopodoides* major *Ger.* herbacea, sive *Chamæspartium* *J. B.* *Chamægenista sagittalis* *C. B.* folio altero ex altero nascente. In pascuis Germaniæ sterilibus abunde provenit, necnon circa *Genevam*.

Genistella tinctoria Hispanica *J. B.* *infectoria* *Ger.* *Genista tinctoria* Hispanica *Park.* *Genista tinctoria* frutescens foliis incanis *C. B.* In montibus sylvosis supra *Neapolin* versus *Camaldulensium coenobium*. *Murciano Regno Hispaniæ* secundum vias *Clus.*

M. Genistella pilosa *J. B.* *Genista* ramosa foliis *Hyperici* *C. B.* Pluribus in locis *Garrigues* dictis copiosa nascitur.

M. Genistella spinosa *Monspeliaca* *C. B. Prod.* Rarius (inquit *P. Magnol.*) occurrit in incultis montis *Lupi*; copiosorem vidimus ultra montem *Esperon* circa urbem *Megriols.*

A. Genista humilior procumbens *Cat. Altd.* *Chamægenista Pannonica* *Clus. Park.* *Chamægen.* foliis *Genistæ vulgaris* *C. B.* *Chamægenista* *Ger. Dwarf-Broom.* *J. Bauhinus* *Genistam* ramosam foliis *Hyperici* *C. B.* huc reducit, verum diversæ videntur esse species. Ad margines sylvarum versus *Arnhoffen* & circa *Weissenbrun.* *Cat. Altd.* Plurimis etiam in locis *Garrigues* dictis circa *Monspelim* copiosè nascitur. *Botan. Monsp.* Multis *Pannoniæ* in locis. *Clus.*

Gentiana major *Ger.* major lutea *C. B. Park.* vulgaris major *Hellebori albi* folio *J. B.* *Great Gentian or Schwort.* In montibus circa *Genevam* copiosè.

C. Gentiana major purpurea *C. B.* major purpurea 1. *Clusii* *Ger. emac.* major flore purpureo, & flore albo *Park.* magna flo. purpureo & albo *J. B.* In *Pannonicarum Noricarumque Alpium* jugis copiose. In *Stiriæ superioris* *Alpibus* flore albo reperitur.

C. Gentiana

- C. *Gentiana major* pallido flore punctis distincto *Clus.* major flore punctato C. B. major flore pallido punctato *Park.* In montibus *Silesiæ Clus.*
- Gentiana Alelepiadis folio* C. B. *Park.* major 2. coeruleo flore *Clusii Ger.* folio *Alelepiadis* vulgo creditæ *J. B. Gentian with Swallow-wort-leaves.* In montosis prope *Lindaviam* & alibi in *Germania.*
- Gentiana cruciata* C. B. *Park.* minor *cruciata Ger.* minor seu vulgi *Cruciata J. B. Cross-wort Gentian.* In *Germaniæ* pascuis montosis passim, nec minus frequens in *Italia* & *Gallia.*
- Gentianella verna major Ger.* *Alpina verna major Park.* *Alpina magno flore J. B. Alpina angustifolia magno flore C. B. Vernal Dwarf-Gentian with a great flower, commonly called Gentianella.* In altissimis verticibus montis *Juræ.*
- Gentianula* quæ *Hippion J. B. Alpina verna Ger.* minor verna *Park.* *Alpina verna major C. B. The lesser vernal Gentian.* In montibus *Genevæ* vicinis.
- C. *Gentianella annua* seu fugax 1. *Clusii*, flore ex coeruleo purpureo, exiguo *J. B. Gentianella Autumnalis ramola C. B. æstiva purpureo-coerulea Park.* In pratis herbidiisque locis ad radices montium sitis, *Julio* & *Aug.*
- C. *Gentianella fugax* tertia *Clusii*, flore virescente & subcoeruleo, brevior & major *J. B. flo. brevior & major C. B. In omnibus pratis in sublimi sitis & montium jugis.*
- C. *Gentianella fugax* 5. *Clusii*, flore coeruleo, colore elegantissimo *J. B. Alpina æstiva Centaurii minoris foliis C. B. In Etscheri jugis Augusti initio.*
- C. *Gentiana Pennæi* coerulea punctata *Park.* punctato flore subcoeruleo *Pennæi J. B. palustris latifolia flore punctato C. B. Pennæi minor J. B. In Bockemuto Suitensium monte copiosè, Aug.*
- B. *Gentianella Alpina latifolia magno flore C. B. prod. Ex Helvetiæ Alpibus.*

Col. Gentianella purpurea minima Col. Alpina verna minor C. B. æstiva minima Neapolitana Park. In *Æquicolorum* montibus, *le Fosse* dicto loco.

Gentianula lanugine ad singulorum foliorum floris lacinias donata, flore quadripartito J. B. Gentiana angustifolia Autumnalis major, C. B. item minor, floribus ad latera pilosis *ejusdem*. item cœrulea, oris pilosis *ejusd.* Gentianella Autumnalis fimbriato flore Park. *Four-leaved dwarf Autumnal Gentian.* Itinere ab Augusta ad Norimbergam.

Gentianella cœrulea calice turgido pentagono *nobis*, cœrulea cordata Col. æstiva cordata Park. utriculis ventricosis C. B. In planitie ad fluvium Lycum non procul Augusta Vindelicorum copiosè, exeunte Augusto florens.

Gentianella minima flore unico cœruleo amœnissimo *nobis*. An Gentianella minima Bavarica Cam? minima elegantissima Bavarica Camerarii Park? An Gentianella fugax 5. Clusii, flore cœruleo, colore elegantissimo J. B? In eadem planitie copiosissimè, eodem etiam tempore florens.

B. Gentianella angustifolia Autumnalis major C. B. *Pneumonanthe Cordi Lob.* fugax 4. Clusii, flore dilutè purpurascente, & cœruleo elegantissimo. J. B. In pratis collium Cat. Bas. In editioribus pratis post *Allersperg* versùs meridiem. Cat. Altd.

A. Gentianella Alpina verna minor C. B. purpurea minima Col. *Small Vernal Gentian.* Loca vide in Cat. Altd.

Geranium Althææ folio C. B. Althæodes majus Park. malacoides Ger. malvaceum J. B. *Crane-bill with Marsh-mallow-leaves.* Circa Genuam in Italia, Montpelium & alibi in Gallia Narbonensi.

Geranium procumbens Althææ folio Siculum. An Geranium Althæodes minus Park? Descriptionem vide *Hist. nost.* p. 1056. In insula ad Promont. Sicilia *Pachynum Capo Passaro* dictum.

Geranium Creticum Ger. Park folio Cicutæ vel Myrrhidis VII. five latifolium longissima acu C. B. speciosum annuum longissimis rostris Creticum J. B.

Candy

- Candy Cranesbill.** In Sicilia prope Messanam.
Geranium Cicutæ folio, acu longissima C.B. Monspelium laciniatum Park. Ad agrorum margines, & in aggeribus circa Monspelium.
- Col. Geranium Apulum Coriandrifolium Col.** Apulum odorum *Park.* Coriandri folio odorum *C. B.* Ciri-nolæ in agrorum & hortorum marginibus elatis frequens, Maio.
- Geranium nodosum Park.** Anemones folio rotundo **XII.** seu nodosum *C. B.* nodosum Plateau *Clus. Ger.* magnum folio trifido *J. B.* Ad sepes itinere à Gratianopoli à la fontaine que brusle.
- Geranium phæo** five pullo flore *Clusii J. B.* pullo flore *Park. Ger.* batrachoides pullo flore *Ger.* Anemones folio rotundo **VIII.** five montanum fuscum *C. B.* **Belancholy Cranes-bill** or **darky Cranes-bill.** In monte Jura prope *Thuri.*
- Geranium Romanum** versicolor five striatum *Park.* **Roman streaked Cranes-bill.** In sylvis montosis Salernum inter & Cavam in Regno Neapolitano.
- B. Geranium gruinal** folio tenuiter diviso *J. B.* **Geranium batrachoides**, collum gruis Germanorum *C. B.* In pratis siccis & collibus *Cat. Bas.* **Geranium columbinum** majus, foliis tenuiter dissectis foliis florum bifidis *Bot. Monsp.* in omnibus convenit descriptioni **Geranii gruinalis**, &c. *J. B.* nisi quod florum folia bifida sunt: quod forte *J. Bauhino* non fuit animadversum, aut omissum. *P. Magnol.* Habetur etiam in *Hollandia Cat. Commel.*
- M. Geranium columbinum** minus, majori flore, petalis bifidis *Bot. Monsp.* Passim juxta vias cum vulgari *Ger. columbino.*
- M. Geranium Columbinum** tenuius laciniatum *C. B. prod.* In herbidis marginibus satiorum luci Gramuntii, & multis aliis in locis. *Bot. Monsp.*
- Geranium foetidum Park. Lob. Stirp. Illust.** petræum *Cicutæ folio, radice crassa foetidum Bot. Monsp.* **Stinking Cranes-bill.** Ex ipsius rupium fissuris exit Septentrionali parte montis Lupi prope Montpelium. Iconem & descriptionem vide in *Bot. Monsp.*
- Gingidium v. Vismaga.** Gladio-

Gladiolus five *Xiphion* *J. B.* *Narbonensis Lob. Ger.* floribus uno versu dispositis major *C. B.* Circa *Monspelim* inter segetes : observavimus etiam circa *Liburnum* in Italia.

Gladiolus utrinque floridus *C. B.* Sola florum dispositione à præcedente differt (inquit *D. Magnol*) & cum eo permixtus reperitur. *Corn-flag.*

M. Gladiolus major flore purpuro-rubente *Bot. Monsp. App.* Junio mense florentem collegit *P. Magnol* in pratis *Lateræ.* Vulgari major est, floribus etiam majoribus, & elegantioris coloris. An sit varietas tantum à loco dependens dubitat.

Glastrum sylvestre Ger. Park. *Isatis sylvestris* five angustifolia *C. B.* *Wild-Woad.* In Germania secus *Rhenum.* Sativum ab hoc non aliter quam cultura differre videtur.

Glaux peregrina annua nobis. *Securidaca Sicula* filiquis foliaceis *Boccon.* *Astragalus marinus Lusitanicus Boelii Ger. emac. marinus Bæticus Park.* In lingua illa fretum Siculum à portu Messanensi dirimente. Planta hæc florum & filiquarum situ variat, nam in eadem specie flores & filiquæ aliàs caulibus adnascuntur pediculis brevibus aut nullis, in ipsis foliorum sinubus sedentes; aliàs pediculis longis è sinubus egressis insident, unde eundem Boelii *Astragalum marinum Bæticum*, Parkinsonus floribus & filiquis in foliorum alis sessilibus descripsit, Johnsonus Gerardi emulcator cum floribus longis pediculis insidentibus. Eodem modo variat *Foenugræco sylvestri Tragi* in quibusdam accedens planta *J. B.*

Globularia Monspeliensis v. Bellis cœrulea.

A. Glycyrrhiza sylvestris altera floribus puniceis, fol. *Arachi C. B.* *Glycyrrhiza aphacoides perennifolia nostra Cat. Altd.* In *Sulzburgh* quæ ex *Sulzkych* ascenditur *Cat. Altd.*

Gnaphalium Alpinum pulchrum J. B. montanum 4. seu Alpinum magno flore, folio oblongo C. B. Gnaph. Alpinum Ger. Leontopodium Dod. Fair mountain Cud-weed or Lions-foot. In montis Juræ præalto vertice la *Dolaz* dicto.

Gnaphalium

Gnaphalium roseum *Park.* *roseum* sylv. *C. B.* *umbellatum* *minimum* *J. B.* *Rose Cud-weed.* In insula sapius dicta ad Promont. *Pachynum* : item circa *Monspeli-um* in maritimis montis *Ceti*.

Gnaphalium ad *Stoechadem citrinam* accedens *J. B.* In pratis non longe à *Castro novo* vico *Monspelio* vicino. *Gnaphalium* 2. *Plateau Clus.*

Gossipium sive *Xylon* *Ger.* frutescens annuum *Park.* frutescens semine albo *C. B.* *Xylon* seu *Gossipium* herbaceum *J. B.* *Cotton.* In *Melita* insula quotannis magno proventu seritur.

Gramen dactylon latiore folio *C. B.* *Graminis* genus, *Dens caninus* 3. sive *Gramen primum* vel *Galli crus* *J. B.* Ab hoc sativum (quod *Gramen Mannæ* vocant) nonnisi cultura differre videtur, inquit *J. B.* *Ischæmon* vulgare *Ger.* sylvestre latiore folio *Park.* *Cocksfoot-grass.* In *Germania*, *Italia*, *Gallia* in agris passim.

Gramen digitatum hirsutum *J. B.* *dactylon* angustifolium spicis villosis *C. B.* *Ischæmon* sylvestre spicis villosis *Park.* *Hairy Cocksfoot-grass.* Ab hoc non diversum specie putamus *Gramen Scoparium* *Ischæmi* paniculis Gallicum, ex cujus nimirum radiculis scopulæ ad vestes purgandas fiunt. *Gramen* illud è quo *Cremae* in *Lombardia* hujusmodi scopulæ fiunt, *Capriola* ibi appellatur ; unde *Matthiolum* falsum esse suspicamur, qui *Gramen Mannæ* pro *Capriola* habet, quod annua est planta, cujusque radices huic usui neque adhibentur, neque idoneæ sunt : ni fortè *Capriola* sit nomen toti huic *Graminis* generi commune.

Gramen repens cum panicula *Graminis Mannæ* *J. B.* *dactyloides* radice repente *Ger.* canarium *ischæmi* paniculis *Park.* *dactylon* folio arundinaceo majus *C. B.* Circa *Genevam* & *Monspeliolum* in arenosis : item circa *Basileam* in arenosis ad *Rhenum* *Cat. Bas.*

Gramen dactylon *Messanense*, panicula multiplici spicis ab eodem exortu geminis. A *Gramine distachyophoro* *Col.* & *distachyophoro* seu *bicorni* *Boccen.* diversum videtur. In montibus *Messanæ* alteri *Siciliæ* metropoli vicinis. Vide descriptionem in *Hist. nost.*

S. *Gramen*

S. Gramen bicornes seu distachyophoron *Boccon.* Descriptionem vide apud Autorem.

Gramen tremulum maximum C. B. *J. B.* trem. max. Hispanicum *Park.* Phalaris pratensis altera *Ger. emac.* *The greatest Quaking-grass.* Plurimis Italiae & Siciliae in locis occurrit.

M. Gramen tremulum minus paniculâ magnâ C. B. *J. B.* tremulum minus alterum *Park.* Amourettes alterum *Clus. cur. post.* In luco Gramuntio frequens nascitur, quod minor figura Graminis tremuli maximi C. B. optimè representat. *Bot. Monsp.*

Gramen pulchrum parvum paniculâ latâ compressâ *J. B.* cyperoides panicula sparsa subflavescente *Park.* cyper. minus panicula sparsa subflavescente C. B. Cur paniculam sparsam vocat, cum è contra sit potiùs conglomerata? In humidioribus & ubi per hyemem aquae stagnarant in Germania, Italia & Gallia Narbonensi.

Gramen parvum pulchrum paniculâ compressa nigricante *J. B.* cyperoides panicula nigricante *Park.* cyp. minus panicula sparsa nigricante C. B. In Italia ad fossias & rivulos; inque palustribus non procul Monspelio.

Gramen Alopecuros spica longa tomentosa candicante *J. B.* Alopecuros major spica longiore C. B. Gr. Alopecuroides alterum radice repente, sive Pseudoschoenanthum Monspelensium *Park.* Schoenanthum adalterinum *Ger.* In maritimis Monspelio vicinis.

Gramen paniculatum elegans *Ger.* Gr. amoris dictum *J. B.* Gr. paniculis elegantissimis, sive *egyptiacis* major C. B. Phalaris pratensis major, sive Gramen tremulum maximum: *Park.* ineptè: Spicae etenim non pendulae sunt sed erectae, nec tremulae sed firmæ. Primò nobis occurrit Francofurti ad Moenum; deinde passim per Germaniam, Italiam & Galliam Narbonensem.

Gramen amoris alterum paniculis minoribus & angustioribus, magisque sparsis. Circa Monspelium & Florentiam cum priore.

M. Gramen paniculatum minimum molle *Bot. Monsp. App.* ubi descriptionem vide. In luco Gramuntio Aprili & Maio mensibus reperitur sub Cisto & Illicibus.

Gra-

Gramen minimum Dalechampii *J. B.* minimum paniculis elegantissimis *C. B.* In vineis circa Monspelium sub initium veris, imò ipsa adhuc hyeme floret.

Gramen panicum spica simplici *C. B.* Panicum sylv. spica simplici *Park.* sylv. *Ger.* sylv. & Dens canis *r. J. B.* *Single spiked Panick-grass.* In Germania, Italia, & Gallia passim.

M. Gramen paniculâ sparsâ lutea loliacea *Bot. Monsp.* ubi descriptionem vide. Maio mense in pratis ultra *la Garrigue du Terrail* viâ qua itur *S. Jean de Vedas.*

Gramen panicum spicâ divisâ *C. B.* Graminis genus quibusdam Gallis Dens canis *z.* five Panicum sylvestre spicâ divulsâ *J. B.* Panicum vulgare *Ger.* sylvestre Herbariorum *Park.* Ad rivulos, & in locis ubi per hyemem aquæ stagnârant in Germania, Italia, Gallia.

Gramen panicum spicâ aristis longis armatâ *C. B.* Panicum *Ger.* panicum aristis longis armatum *Park.* Est hoc, ut rectè notat *J. B.* naturæ duntaxat lusus; in eadem etenim planta observavit spicarum utriculos alios in aristam desinentes, alios eâdem destitutos. Advenire autem illud dicit ratione foli, aut ætatis. Unde non est cur *C. B.* duas species faciat.

M. Gramen caninum marinum *Ger.* caninum maritimum spicatum *C. B.* caninum geniculatum maritimum spicatum *Park.* repens marinum spica exigua *J. B.* In toto litore prope Monspelium frequens invenit. *D. Magnol.*

Gramen montanum Avenaceum spicatum *C. B.* montanum spicatum Clusii *Park.* marinum spicatum alterum *Ger.* In montanis quibusdam pratis duobus supra Badenses [Austriæ] thermas milliaribus.

Gramen parvum echinatum *J. B.* caninum maritimum asperum *Park.* caninum maritimum spicâ echinata *C. B.* In arenosis prope Monspelium copiose: Vidimus etiam Florentiæ in Arni fluminis alveo.

- Gramen nemorosum hirsutum minus paniculis albis C. B. nemorosum hirsutum minimum *Park.* præter rationem, cum satis altè assurgat. Ad latera montis Salevæ prope Genevam, & in colle *La Bastie*.
- Gramen supinum aculeatum *J. B.* aculeatum Italicum *Park.* album capitulis aculeatis Italicum C. B. Inter Liburnum & Pisas, necnon circa Monspelium copiosè.
- Gramen arvense paniculâ crispâ C. B. *Park.* minimum rubrum five Xerampelinum *Ger.* cum panicula molli rubente *J. B.* Genevæ inter segetes copiosè. Simillimum est hoc Genus *Gramini* nostro *montano spicâ foliaceâ gramineâ* dicto.
- Gramen Alopecuroides spicâ asperâ C. B. Alopecuroides spica aspera brevi *Park.* cum cauda leporis aspera, five spicâ murinâ *J. B.* Circa Monspelium copiosè, observavimus etiam circa Messanam.
- Gramen Arundinaceum ramosum plumosum C. B. *J. B.* Circa *Perault* & Magallonam prope Monspelium invenimus; uti etiam prope litus Calabriae.
- Gramen Calamogrostis Lobelii *J. B.* arundinaceum spica multiplici C. B. Calamogrostis five Gramen tomentosum *Park.* harundinaceum paniculatum *Ger.* In arenosis maris litoribus circa Magallonam non longe à Monspelio. Figura *J. B.* optimè respondet nostræ plantæ, non autem Parkinsoni, uti nec titulus, nec descriptio *Lob. Ad.*
- Gramen cyperoides maritimum C. B. marinum cyperoides *J. B.* Juncus cyperoides maritimus *Lob. marit.* Narbonensis *Park.* In arenosis litoribus prope Neapolin Italiae copiosè; Habetur etiam Monspelii ad mare.
- Gramen cyperoides polystachion minimum, spicis per maturitatem albicantibus. Sub monte Saleva prope Genevam invenimus. Descriptionem v. *Hist. nost. p. 1295.*
- Gramen Avenaceum panicula longissima, è locustis creberrimis non aristatis composita. In Sicilia observavimus hoc genus. Descriptionem vide *Hist. nost. p. 1291.*

Gramen Avenaceum maximum, utriculis cum lanugine alba, & aristis longissimis *Bot. Monsp.* Hujus iconem & descriptionem vide apud *D. Magnol.* Maio mense cum spicis invenit Autor prædictus in sylvæ Valenæ locis herbidis, præcipuè circa *Caravettes.*

Gramen avenaceum aristis longissimis. Festuca aristis longissimis *C. B.* *Ægilops bromoides* *Tab. Ger.* *Tavernamontanus* inter *Wormatiam* & *Frankenthalium* invenit. Nos in *Germania* collectum habemus, locum non recordamur. Aristæ tenues cincinnorum in modum non raro intorquentur.

Gramen Avenaceum montanum lanuginosum *C. B.* montanum Avenaceum *Clusii Park.* Gr. cum locustis parvis candidis, semine Avenaceo *J. B.* montanum Avenaceum *Ger. emac.* Secundum vias in montanis, umbrosisque sylvis *Pannoniæ, Austriæ & Moraviæ:* item circa *Monspelim.*

M. Gramen sparteum *Monspeliacum* seu capillaceo folio minimum *C. B.* Spartum *Narbonense Park.* In sicioribus satorum marginibus frequens *P. Magnol.*

S. Gramen filiceum paniculis integris *Boccon.* In litore *S. Erasimi* loco *li Stazzuni* dicto invenit *D. Boccone.*

Gratiola *J. B. Lob. Ger.* vulgaris *Park.* Centauroides *C. B.* Hedge-Hyssop. In palustribus prope *Constantiam Germaniæ* urbem ad lacum *Acronium* sitam uberimè: Provenit etiam in aquosis, tum in *Italia,* tum in *Gallia Narbonensi,* ut v. g. prope lucum *Grammontium* non procul *Monspelio.*

Guaiacum Patavinum *Park.* Patav. latifolium *Ger.* Guaiacana *J. B.* Lotus *Africana latifolia C. B.* In præruptis collibus non longè à *Massa,* via *Lucam* ducente, hanc ipsam stirpem, vel ei sane simillimam collegimus. Proinde fortasse deceptus non fuit *Gesnerus,* qui eam in montibus circa *Veronam* nasci scripsit; quod *J. Bauhini* pace dixerim.

H.

H Alimus *Lob.* Hal. Clusii *7. B.* latifolius sive frutescens *C. B.* latifolius seu Portulaca marina incana major *Park.* ~~Great Sea-Purflane.~~ In Sicilia propè Messanam hinc inde ad maris litus copiosè.

H. Hedera terrestris minor *C. B.* Hanc invenio in Catalogo Hollandicarum *D. Commelini.*

A. Hedera terrestris major seu Chamæcissos montana *C. B. Cam.* flo. purpurasc. Circa Altdorffium Aprilis mense & seqq.

Hedynois Monspeffulana seu Dens Leonis Monspeffulanus *7. B.* An Hieracium foliis & floribus Dentis leonis bulbosi *Lob?* Ab hac planta omnino diversa est Dens leonis Asphodeli bulbulis dicta, cum quo *J. Bauhinus* eam confundit; nec minùs à Chondrilla foliis Cichoraceis tomentosis *C. B. i. e.* Chondrilla priore Dioscoridis, legitima, ut nos aliquando cum *J. Bauhino* sensimus: quo etiam in errore versatur *P. Magnol.*

Hedysarum clypeatum *Ger.* clypeatum vulgare *Park.* Astragalus Romanus seu Hedysarum clypeatum siliqua asperâ *7. B.* Onobrychis semine clypeato aspero major *C. B. French=Honeysuckle.* In montibus Messanæ imminentibus, ubi etiam cum flore albo observavimus.

Hedysarum clypeatum minus flore purpureo. An Onobrychis semine clypeato aspero minor *C. B. The lesser Purple-flower'd French=Honeysuckle.* In insula ad Promontorium Siciliæ Pachynum. *D. Magnol.* Polygalo Gesneri affine Caput gallinaceum *7. B.* hujus Synonymum facit: cui & nos assentimur. Quin & Securidacam Pennæi, sive Securidacæ secundæ alteram speciem *Clus.* i. e. Securid. dumetorum minorem pallidè cœruleam *C. B. Ger.* Secur. articulatam minorem *Park* huic specie eandem esse fidenter affirmamus.

Hedysa-

Hedysarum minus Park. v. *Securidaca minor*. Majus
siliquis articulatis Ger. v. *Securidaca*.

Helianthemum v. *Cistus*.

Heliochrysum v. *Stoechas citrina*.

Heliotropium majus Lob. Ger. Park. majus flore albo J. B.
majus *Dioscoridis* C. B. The greater *Heliotrope*
or *Turnsole*. In Gallia Narbonensi & Italia ubique
fere : invenimus etiam circa Moguntiam Germaniæ ur-
bem ad Rhenum sitam.

S. *Heliotropium Siculum* majus flore amplo odorato
Boccon. Non longe à Catana in asperis & segetibus
copiosè crescit, alteri permixtum.

Heliotropium tricocon C. B. J. B. Ger. Park. The
colouring or dying *Turnsole*. Circa Monspelium
cum priore sed rariùs. Hujus usus est ad pannos ele-
ganti purpura tingendos.

Helleborine ex albo sublutea J. B. In sylvula monti
Salevæ vicina. Floret omnium hujus generis prima.

C. *Helleborine Recentiorum* 3. *Clus.* flore viridante Park.
angustifolia palustris five pratensis C. B. *Damasonium*
flore herbaceo, intus nonnihil candicante J. B. In
quibusdam Austriæ & Pannoniæ siccioribus pratis ; &
Noribergenfi sylva urbi vicina ad latomias.

C. *Helleborine Recentiorum* 5. *Clus.* montana angusti-
folia spicata C. B. J. B. In multis Pannoniæ Austriæ
sylvis, & ad montanorum pratorum margines.

C. *Helleborine* 7. *Clusii* C. B. tenella, tribus in caule
foliis prædita J. B. Ex Italia rediens Gulielmus Mera
Clusio donabat.

† *Helleborine* flore albo C. B. *Elleborine* minor flore
albo Park. *Damasonium Alpinum* vel *Elleborine* flo-
ribus albis J. B. White-flower'd bastard *Helleboze*.
In sylvosis prope Summitatem montis Salevæ non
longè à Geneva. Floret vere simul cum priore sed
aliquanto seriùs.

Helleborine montana angustifolia purpurascens C. B. *Da-*
masonium purpureum dilutum seu *Helleborine* 6. *Clusii*
J. B. *Elleborine* flore purpurante Park. Ad radices
montis Salevæ versus Genevam copiosè. Invenitur
etiam circa Monspelium, locum vide in *Bot. Monsp.*

M. Helleborine latifolia montana C. B. 2. *Clus. hist.* in luculo prædii D. de Grefeville, prope Monspelium. *Botan. Monsp.*

Inveni etiam Helleborinem flore atro-rubente in ascensu montis Juræ prope oppidum *Jay* copiose: item Calceolum Mariæ dictum in sylvis ad latera montis Salevæ. Verùm hæ duæ species, ut & illa quæ flore est albo in Anglia habentur.

A. Helleborine flore carneo C. B. 4. *Clus.* latifolia floribus Centaurium minus æmulantibus *Cat. Altd.* Circa Altdorfium in Germania non procul Norimberga. Loca vide in *Cat. Altd.*

A. Helleborine ferruginea latifolia nostra *Maur. Hofm.* in *Cat. Altd.* Cubitalem altitudinem superat. Folia nervea angusta, in caule pauca, ad exitum cum caule quasi polline ferrugineo aspersa rubent. Frequentiora spicam florum ex herbaceo candidorum, labris purpurascentibus foliosam reddunt. An Elleborine 7. *Clus?* m. Jul. & August. circa antrum illud *der Sandgruben*, quæ ex *Entenberg* versus *Weissenbrun* per editiora pergitur.

Helleborus albus *Ger. f. B.* albus vulgaris *Park.* albus flore subviridi C. B. *White Hellebore* or *Reckwort.* In montosis pascuis propè summitatem montis Juræ, non longè à Geneva, copiosissimè.

Helleborus niger *Lob.* niger verus *Ger. Park.* niger flore roseo C. B. niger flore albo, interdum etiam valde rubente C. B. In Alpibus non longè à *Pontieba Veneta* copiosè. *True black Hellebore.*

Helleborum nigrum foetidum seu Enneaphyllon C. B. *Great Bastard black Hellebore* or *Setterwort.* In Germania: lateribus montium quos eluctatur Rhenus inter Coloniam & Moguntiam copiosissimum observimus. Juxta Ladum amnem Monspeliensem copioso proventu florum & foliorum nasci observavit Lobelius.

Helleborum nigrum hortense flore viridi C. B. In monte illo præcelso cui inædificatur *S. Marini* urbs. 10. circiter milliaribus Arimino distans copiosè. *Bearsfoot.*

Hemi-

Hemionitis multifida C. B. altera *Dalechampii Filici* floridæ similis *J. B.* *Ilvensis Dalechampii multifido folio* *Park.* *Branched Mules-Fern.* Prope Salernum primò observavimus, deinde prope Neapolin in viis umbrosis quà ascenditur ad Camaldulensium cœnobium copiosè.

Hepaticum trifolium *Lob. Ger.* *Trif. hepaticum* flore simplici C. B. *hepaticum* seu *Trinitatis herba* flore cœruleo C. B. *Hepatica nobilis* sive *trifolia* flore cœruleo *Park.* *Noble Liverwort* or *Hepatica.* In montibus circa Taurinum. Scaphusiam, Genevam copiosè.

Viennensis saltus (inquit *Clusius*) *Hepaticam* & *cœruleam* præcociorem, & eam quæ florem ad purpuram tendentem habet paulò seriùs florentem; alit, tum illas quæ incarnato sive rubello, tum albo sunt flore, atque eam quæ niveo prorsus est flore apud *Gamingam* cœnobium *Carthusianorum.*

Herba Doria Lobelii *Ger.* *Doria vulgaris* *Park.* *Alisma Matthioli* seu *Doria* *J. B.* *Doria Narbonensium* q. Aurea, quam perperam *Doriam* vocant, foliis *Limonii* aut *Rumicis* *Adv.* *Virga aurea* major vel *Doria* C. B. *Dortas Woundwort.* Ad *Ladum* amnem *Monspeliacum* copiosè.

Herba venti Monspeliensibus *J. B.* *Marrubium nigrum longifolium* C. B. *Ger. Park.* In aggeribus & ad vias circa *Monspelim* copiosè.

Herba terribilis v. *Alypum.*

Herniaria hirsuta *J. B. C. B.* *Hatry Rupture-wort.* In arenosis prope *Sylvam Ducis Brabantiae* oppidum se nobis obtulit, deinde per *Germaniam, Italiam, & Galliam Narbonensem* passim.

B. *Hesperis sylv.* *Hieracii foliis hirsuta* C. B. *prod.* In saxosis humidis *Provincia.* *Burserus.*

Hesperis sylvestris latifolia flore albo parvo *Park.* *Hesperidi Alpinae murarieve* similis surrecta & magna *J. B.* In monte *Saleva* copiosè. Collegimus etiam in montosis *Etruriæ*, eundo à *Massa* ad *Lucam.* Dubitat *J. Bauhinus* annon hæc sit *Sinapi* & *Thlaspi* media *Provincialis* planta *Lob.*

- M. *Hesperis sylvestris angustifolia* flore parvo *Park.* sylv. flore parvo C. B. In Horto Dei ad aggeres riparum C. B. in incultis circa Monspelium. *Magnol.*
- C. *Hesperis montana* & prima *Clusii*; *montana pallida* odoratissima C. B. colore ineleganti *J. B.* *Pannonica Park. parad.* *Viola matronalis* flore obsoleto *Ger. emac.* In *Prellenberg Hamburgensi* monti vicino, Junio. Hæc est (ut puto) planta *Leucoium melancholicum* dicta, & *Leuc.* alterum saxat. obsoleto flore *Col.*
- C. *Hesperis Pannonica inodora J. B. Park.* sylv. inodora C. B. Sola odoris carentia in flore à vulgari *Hesperide* differt. Ad montium radices, & vinetorum in collibus sitorum margines *Viennensi* agro passim. *Hesperis v. Viola matronalis.* Alpina *v. Draba.*
- Hieracium Alpinum glabrum* flore singulari magno, cauli cubitali folioso insidente. In summo montis *Jura* dorso *la Dolaz* dicto.
- Hieracium asperum v. Hypochoeris.*
- M. *Hieracium montanum laciniato lanuginoso folio Clusio J. B. mont. laciniatum lanuginoso folio C. B.* *Hier. folio Hedypnoidis Clus. montanum Dentis leonis folio incano Park. Hier. 7. Clusii Ger.* In declivibus herbidis montis *Scrane*, qua parte Septentrionem spectat.
- B. *Hieracium Alpinum pumilum Chondrillæ folio C. B. prod. In Sneberg Austria. Burserus.*
- C. *Hieracium Alpinum villosum latifolium magno flore C. B. Park. 5. Clusii Ger.* *Alpinum hirsuto folio 5. Clusii*, quodammodo incanum *J. B.* In herbosis *Alpium* jugis Julio & Augusto.
- C. *Hieracium montanum angustifolium nonnihil incanum C. B. montanum angustifolium Park. montanum 6. Clusii angustifolium J. B.* In omnibus illis montibus à *Calenberg Danubio* imminente ad *Alpes* excurrentes.
- C. *Hieracium montanum laciniato folio lanuginoso Clusio J. B. montanum Dentis leonis folio incano, vel laciniatum lanuginoso folio C. B. montanum Dentis leonis folio incanum Park. Hier. 8. Clusii Ger.* Crescit in *Leytenberg*, florétque Junio,

Col. Hie-

Col. Hieracium alterum saxatile montanum Col. In Æquicolorum montibus saxosis, & altissimis saxosis lateribus vallis Campoclarensum.

C. Hieracium Tragopogonis folio C. B. item Scorzonera angustifolia altera *ejusdem*. Hieracium 7. humile *Clus. hist.* In saxis ad Gamingam Carthusianarum coenobium copiosè, Julio.

B. Hieracium montanum Rapifolium C. B. *prod.* In monte *Wasserfal.*

B. Hieracium Dentis leonis folio floribus parvis C. B. *prod.* Circa Massiliam.

B. Hieracium minus glabrum C. B. *prod. Park.* Circa Basileam, Autumno.

B. Hieracium Dentis leonis folio obtuso minus C. B. *prod. Park.* In pratis circa minorem Basileam.

B. Hieracium maximum asperum Chondrillæ folio C. B. *prod. Park.* Monspeffuli in asperis *Garrigues* dictis.

B. Hieracium profunde sinuatum pubescens C. B. *prod. Park.* In pratis Michelfeldensibus ad dumeta & in dumetis. *Cat. Bas.*

Hieracium Apulum suave-rubente flore Col. Dentis leonis folio flore suave-rubente C. B. In Apulia v. *Hist. nost. p. 231.*

Col. Hieracium montanum *λεπτομακροκάλον* Col. mont. hirsutum minus C. B. In sepibus Æquicolorum villæ *Mercato* dictæ.

Hieracium montanum latifolium Genevense folio Conyzae majoris Monspeffulanæ J. B. In ascensu montis Juræ prope *Thuri*.

Hieracium falcata filiquâ *Lob.* C. B. falcatum Lobelii *Ger.* An forte Hier. stellatum Boelii *Ger. emac. app.* falcatum sive stellatum *Park.* stellatum J. B. Circa Monspelium non longè à *Castro novo*. Habetur prope mare Hierac. falcatum minimum C. B. *prod.*

Hieracium capitulum inclinans semine adunco C. B. florem inclinans J. B. folio Hedypnoidis *Park.* Circa Messanam & Monspelium.

Hieracium calice barbato Col. falcatum barbatum *Park.* proliferum falcatum C. B. Circa Messanam & Monspelium passim.

Hieracium parvum hirtum, caule aphylo, crispum ubi ficcatum *J. B.* In agro Monspessulano non longè à *Sella nova* in arvis.

M. *Hieracium* pulchrum *J. B.* In humidis satorum & vinearum fossis copiosum cum flore invenit *D. Magnol* [circa Monspelim]

M. *Hieracium* proliferum falcatum duodecimum. *C. B. prod.* oritur in satis luci Grammuntii. *Magn. Bot. Monsp.*

M. *Hieracium* Dentis leonis folio bulbosum *C. B. prod.* In herbidis pratorum & satorum marginibus circa Lateram copiosum invenit *D. Magnol.* Figura Hieracii intybacei *Tab.* pro hoc maximè placet.

M. *Hieracium* Dentis leonis folio, hirsutiae asperum minus, laciniatum *C. B.* loca vide in *Botan. Monsp.*

S. *Hippomarathrum* Siculum semine sulcato & lanuginoso *Boccon.* *Cachrys* Peucedani folio, semine fungoso sulcato aspero *Morison.* Passim Panormi, Agrigenti & Messanæ, locis *li Pirrevi, Santa Agata, Brazzo di San. Raneri* dictis, alibique per Siciliam satis frequens.

Holosteum Massiliense *C. B. v.* *Coronopus.*

Holosteum Plantagini simile *J. B.* *Salmanticense* primum *Clus.* *Salmanticum* *Ger. Park.* *Narrow-leaved hoary Plantain.* Circa Monspelim in aridis olivetis & ad vias.

C. *Holosteum* *Salmanticense* minus *Clus.* Crescit iisdem in locis cum præcedente, foliis *Psyllii* foliorum latitudinem non excedentibus longioribus tamen & minus incanis, in cæteris prorsus simile est præcedenti; à quo dubitat *J. Bauhinus* an differat specie.

Horminum sylvestre latifolium *Ger.* sylvestre latifolium verticillatum *C. B.* Germanicum humile *Park.* *Galitricho* ætatis planta, *Horminum* sylvestre latifolium *Clusio J. B.* *German broad-leaved wild Clary.* In agris & vernaetis non longè ab Augusta Vindelicorum. Habetur etiam circa Altdorfium. *Vid. Cat. Altd.* *Viennoensi* agro passim juxta vias. *Clus.*

Horminum luteum glutinosum C. B. Colus Jovis Ger.

Lob. Horminum luteum, five Colus Jovis Park. Galeopsis species, lutea, viscida, odorata, nemorensis J. B. Yellow Clary or Jupiters Distaff. In colle la Bastie, & in montibus circa Genevam. Vidimus etiam sæpius in Italia & Germania locis lutosis, & ubi per hyemem aquæ stagnarant.

Horminum pratense foliis serratis C. B. Gallitrichum sylvestre vulgò, seu sylvestris Sclaræa, flore coeruleo purpureove magno J. B. Hæc planta à vulgari nostrate Hormino sylvestri specie diversa est: siquidem vulgare nostras est Horminum pratense Lavendulæ flore Clus. In Germania frequens est.

B. Horminum angustifolium laciniatum C. B. prod. Park. Monspeßuli foliis Scolopendrii legit C. Bauhinus.

M. Horminum Sclaræa dictum C. B. Sativum vulgare seu Sclaræa Park. Gallitrichum sativum J. B. Gallitrichum five Horminum Ger. Clary. Inter Lateram & Peranis multis in locis sponte luxuriat.

S. Horminum spicatum Lavendulæ flore & odore Boccon. Prope Agrigentum & Cainatata exit plurimum. An descripta sit affirmare non audet Paulus Boccon.

T. Horminum Verbenæ laciniis angustifolium Triumf. In aridioribus & sabulosis Romanorum arborum tractibus.

C. Hormini sylvestris quarti Clusii prima species, ab Hormino pratensi foliis serratis C. B. in eo differre videtur quod folia non laciniata habeat, sed per oras duntaxat serrata.

Hormini sylv. quarti species altera Clus. solo floris colore niveo à præcedente differt, quæ accidentalis duntaxat varietas est.

C. Hormini sylv. quarti 3. species Clus. i. e. Horm. sylvestre majus foliis profundius incisus C. B. Gallitrichum sylv. coma virescente J. B. Horm. sylv. Italicum Park. sylv. flore rubro Ger. Aded in paucis differt à prima specie ut distinguendum non putem: ut nec sylvestris quarti speciem quartam Clus. quæ flore est minore & rubro, ad quam synonyma illa Hormini sylv. flore rubro Ger. & Hormini sylv. Italici Park. pertinent.

- C. Horminum sylvestre salvifolium minus C. B. sylv. salvifolium *Park.* Gallitrichum glabrum folio *Salvia*, flore purpureo *J. B.* Ubique circa Viennam Austriæ, totâque Pannonia, secundum vias & in agrorum vinearumque marginibus.
- C. Horminum sylv. latifolium majus vel maculatum C. B. Salvifolium alterum *Park.* Gallitrichum alterum *Ger.* Priore rarior, nec nisi in pratis herbosisque locis, ubi gleba uberior.
- H. Horminum sylvestre maculatum tuberosum. *Franc. de Honuphris.* Circa montem *Circiesbam* via à Sancto Felicis castro ad mare.
- Hyacinthus coeruleus *Ger.* racemosus coeruleus minor juncifolius C. B. vernus botryoides minor coeruleus angustioribus foliis, odoratus *J. B.* *Grape Hyacinth.* In agro Pedemontano ad vias: circa Monspelium etiam ubique Februario & Martio mensibus floret.
- C. Hyacinthus botryodes vernus minor, latifolius coeruleus inodorus *J. B.* racemosus latifolius speciosior C. B. botryoides coeruleus major *Ger.* An Hyacinthus coeruleus amoenus *Lob. Park.* Montbelgardi provenit sponte. Citiùs floret præcedenti, foliaque non retinet tandiu.
- B. Hyacinthus minimus maritimus C. B. *prod.* Monspeli in litore maris.
- Hyacinthus comosus *Ger.* comosus major purpureus C. B. maximus botryoides comâ coerulea *J. B.* *Fair-hair'd Hyacinth.* Inter tegetes circa Liburnum & Genevam, adde si placet & Monspelium copiosè. Dux species sunt, præcox latiore folio, serotinum angustiore. v. *Clus. hist.*
- Hyacinthus palustris vernus flosculis fimbriatis albidis. Ad fossarum margines & in humidioribus inter Liburnum & Pisas.
- Hyoscyamus albus major & minor C. B. albus *Park.* albus, & albus minor *J. B.* *Ger.* *White-scabane.* In Italia ad mare inferum circa Genuam præcipuè, in cujus muris nascentem observavi Hyoscyamum flore penitus luteo.
- Hyoscyamus Creticus luteus major C. B. Creticus *Park.* Creticus alter *Clus.* luteus minor *J. B.* Præcipua diversitas

fitas inter hunc & præcedentem est in colore floris, qui in hoc fundo est atro-purpureo. Utraque species in Italia, Sicilia & circa Monspelim in muris & locis rudertis frequens est.

Hypericum foliis parvis crispis seu sinuatis Siculum, Curled S. John's wort. In Sicilia prope *Punto Cerchio*. Hanc plantam describit *Joan. Bapt. Trionfetti* in libro non ita pridem edito, *De Ortu & vegetatione plantarum*.

Hypericum Nummulariæ folio C. B. Park. Ex ipsis rupium fissuris paulò supra maximum Carthusianorum cœnobium exit. Flos ei odoratissimus.

Hypericum tomentosum Lob. J. B. tomentosum Lobelii Ger. supinum tomentosum minus Park. sup. tom. minus vel Monspeliacum C. B. Hoary S. John's wort. In insula Melita primo, deinde circa Monspelim in fossis & humidioribus observavimus. *Hypericum tomentosum Clusii* ab hoc non differre specie nobis quidem videtur; quamvis *Clusius Lobelium* sibi injurium queratur, quod id affirmaverit. Vid. *Hist. nost. p. 1020*.

Hypochoeris Porcellia Ger. Hieracium asperum Hypochoeris sive Porcellia dictum Park. Hieracium Dentis leonis folio obtuso V. seu minus Dentis leonis folio subaspero C. B. Hieracii parva species, Hyoseris angustifolia aspera J. B. In quibusdam Baviaræ sylvis.

C. *Hypoglossum sive Bislingua Park. mas & foemina Ger. Bonifacia sive Bislingua J. B. Laurus Alexandrina fructu pediculo insidente C. B.* In montibus Ungariæ, & copiosissimè in monte D. Georgii 3. à Posonio mill. p. Frequentissima esse dicitur in Liguriæ Alpibus & Urbinati agro.

Hyssopoides seu Hyssopifolia major flore grandiore. In palustri planitie prope Syracusas, itémq; non longè à Messana Siciliæ. Hujus flos quadruplo major est vulgaris nostratis flore. Utramq; speciem unà crescentem observavimus circa Messanam, ut eas specie differre non est cur dubitemus. *J. B.* duas habet *Hyssopifoliæ* species, verum quam ille minorem inscribit est vulgaris nostras: quam *Hyssopifoliam aquaticam* simpliciter vocat, planta est qua de agimus. Habetur etiam circa Monspelim.

J. Jacea

I.

Jacea non spinosa laciniata lutea. An Jacea laciniata lutea C. B. *Yellow Knapweed*. In alveis torrentum & fluviorum quorundam, qui brumali tempore pluvies latè inundant in Foro Julii Italiae.

Jacea Oleæ folio C. B. v. *Xeranthemum*.

Jacea purpurea maritima capitulo spinoso Neapolitana. An Jacea laciniata Sonchi folio Park? In maris litore arenoso trans Neapolin Italiae urbem & Regni caput.

Jacea lutea capite spinoso C. B. lut. cap. spinosis Park. major lutea Ger. *Centaurium collinum*, seu Jacea spinosa flore luteo J. B. *Yellow prickly-headed Knapweed*. Circa Messanam & Monspelium frequens. Invenit aliquando D. *Magnol* cum capitulis non spinosis.

Jacea cum spinosis capitulis purpurea tenuifolia J. B. Stoebe 9. seu squamis asperis C. B. capitulis spinosis Jacea Lob. Circa Monspelium & alibi in Gallia Narbonensi. Vidimus etiam in Etruria Italiae.

C. Jacea Cyanoides echinato capite C. B. montana echinato capite Clus. montana purpurea echinato capite Park. Ad montium radices, & nonnunquam secundum vias in Austria inferiore & Stiria.

Jacea incana tenuiter laciniata, capitulis Jaceæ nigrae vulgaris. Jacea montana candidissima Stoebe foliis C. B. Park. incana, laciniata, capitulis Cirsii, flore uno aut altero J. B. *Hoary mountain-Knapweed with a jagged leaf*. In clivis maritimis Calabriae prope Scaleam.

Jacea montana capite magno Strobili J. B. incana Pini capite J. B. pumila Narbonensis Park. In collibus saxosis *Garrigues* dictis circa Monspelium frequens.

M. Jacea

- M. *Jacea* cum squamis pennatis, five capite villoso *J. B.* latifolia capite hirsuto *C. B.* *Austriaca* villosa *Ger.* *Austriaca* latifolia villoso capite *Park.* In via qua itur ad pagum *Santgely*, & in declivibus saxosis montis *Capouladou* copiosè reperitur. *Bot. Monsp.* In montanis Pannoniæ & Austriæ pratis. *Clus.* Calidiori circa Monspelium coelo longè est strigosior, foliâque possidet interdum sinuata potius quàm crenata. *Jacea* villoso capite humilior, five *J. Clus.* sola fere parvitate, foliorum angustia, & semine nigro à præcedente differt; & eisdem in locis provenit.
- C. *Jacea montana* *Austriaca* major *Park.* nigra squamoso capite major *C. B.* *montana* squamosa major, semine nigro *J. B.*
- C. *Jacea nigra* squamoso capite minor *C. B.* *montana* *Austriaca* minor *Park.* *montana* squamosa minor, semine albicante *J. B.* Utraque in montanis Austriæ & Pannoniæ pratis copiosè.
- H. *Jacea incana* capite squamato *Fran. de Honuphriis.* E fissuris petrarum *Circeii* promontorii.
- M. *Jacea* cui in squamis fibræ nigræ. interdum acaulis *J. B.* humilis *Hieracii* folio *C. B.* *Park.* In marginibus satorum ad pontem, viâ quâ *Frontignanam* itur invenit *Lobelius*, & post eum *P. Magnol* mense Maio florentem.
- Jacea incana* *Lugd.* *incana* *Cyani* capitulis *C. B.* *Xeranthemum* *J. B.* *Ptarmica* *Imperati*, five minor *Park.* *Ptarmica* *Imperati*, an *Ptarmicæ* *Austriacæ* species *Clus. cur. post. Ger. emac.* Primò eam observavimus in alveo fluvii *Arni* *Florentiæ*, post in collibus saxosis circa *Monspelium* satis frequentem.
- M. *Jacea Oleæ* folio capitulis simplicibus *C. B.* *Ptarmica* *Austriaca* *Ger.* *Austriaca* *Clusii* *Park.* *Xeranthemum* aliud five *Ptarmica* quorundam *J. B.* *Austrian* *Sneezwort.* In declivibus herbidis montis *Capouladou.* *Bot. Monsp.* Hanc in *Catalogo Sicularum* *Bocconi* invenio.
- Z. *Jacea spinosa* *Cretica* *Zanoni.* quamvis alii è *Pannonia*, alii ex *America* delatum, ferunt.

Z. *Jacea arborea argentea Ragufina Zanoni.* Locum in fronte gerit.

Col. *Jacea montana minima lutea tenuifolia Col. montana lutea minima Park. laciniata lutea C.B.* In *Æquicolum* montibus herbidis prope D. Angeli templum dirutum supra villam Flaminianam.

Reliquas *Jaceæ* species v. in *Stœba*.

M. *Jacea latifolia spinosis capitulis pulchris, flore purpureo J.B.* An *Jacea purpurea Hispanica muricata ejusdem.* *Jaceæ spinosæ* nomine *Monspeli* collectam testatur C. B. in *Phytop.* In vineis quibusdam circa *Monteils.* Bot. *Monsp.*

M. *Jacea Sicula Cichorei folio, flore luteo, cap. spinoso Paul. Boccon.* Juxta *Saccam* copiosè nascitur.

S. *Jacea Melitenfis capitulis conglobatis Boccon.* In *Melita* invenit P. *Boccone*, via quæ *Casalnovum* ducit. In fatis montis *Ceti* collegit *Pet. Magnol.*

C. *Jacea nigra laciniata C.B. nigra vulgaris laciniata Park. cum squamis ciliis instar pilosis J. B. Austriaca 6. Clus* Crescit permixta cum *montana Austriaca* majore & minore, & eodem tempore floret. In herbidis montis *Capouladou*, sed copiosius in pratis montis *Calcaris.* Bot. *Monsp.*

B. *Jacea integrifolia humilis C. B. prod.* In *Austria* ad *S. Hippolytum.*

B. *Jacea montana incana aspera, capitulis hispidis C. B. prod.* *Monspessuli* in monte *Calcaris.*

B. *Jacea montana incana laciniata capitulo hispido C. B. cum priore.*

Col. *Jacea lavis lutea maxima Centaurioides Apula Col. lutea spinosa centauroides C. B. lutea capitulis spinosis Park. major lutea Ger. Cirinolæ* in fossa quadam arginis vineæ depressioris, prope *Acquamena* ad dextram.

Jacea foliis angustissimis subtus incanis, Stœchas purpurea odorata Park. Stœchadi citrinæ affinis capitulis longioribus J. B. In *Gallia Narbonensi* inque *Gallio* provincie rupibus prope *Massiliam.* Circa *Monspeli* um variis in locis. v. Bot. *Monsp.*

B. *Jacea*

B. *Jacea nigra angustifolia Park. nigra angustifolia vel Litholpermi arvensis foliis C. B. In locis aridioribus. Cat. Bas. In pratis montosis ultra nigrum Cat. Ald. Passim Monspeffuli & Patavii.*

Jacobæa Senecionis facie. Senecio folio non laciniato *C. B. folio non laciniato Myconi Park. Groundsel with an undivided leaf. In sabulosis inter oppidum Rot & Norimbergam: item in ascensu montium propè Messanam Siciliae urbem. Calix floris Senecionis calicem exactè refert, verum circulum seu coronam foliorum in margine ad modum Chrysanthemi obtinet. Plantula tenera est, radice fibrosa, foliis Bellidis majoris.*

Jacobæa marina Ger. marina seu Cineraria vulgaris Park. marina seu Cineraria J. B. maritima C. B. Sea Hagwort. Ad litus maris Inferi ubique fere. C. B. in Prod. Jacobæam quandam maritimam latifoliam describit à D. Doldio missam.

S. Jacobæa Sicula Chrysanthemi facie Bocc. Perpetua est planta, hyememque facile tolerans, ad Catanam & Tauromenium frequens.

S. Jacobæa multifida umbellata annua Bocc. Nascitur ad Agrigentum & oppidum Montapertum dictum.

C. Jacobæa Pannonica latifolia J. B. latifolia Pannonica prima Park. latifolia Ger. Pannonica 3. latifolia 1. Clus. Alpina laciniata Buphthalmi flore C. B. In Austria-cis, Stiriacisque Alpibus.

T. Jacobæa supina maritima Triumphetti. Per totam oram maritimam camposque adjacentes à Centum-cellis ad Caietam.

B. Jacobæa rotundifolia incana C. B. prod. In Provincia Galliae. Burser.

C. Jacobæa Alpina foliis rotundis ferratis C. B. Pannonica 4. latifolia 2. Clus.

Jasminum luteum v. Polemonium.

Iberis J. B. Cardamantica Lob. Ger. latiore folio C. B. Park. Scitica Cresset. In incultis ruderalis & secus vias ubique ferè tum in Germania, tum etiam in Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi. Iberis Nasturtii folio nihil aliud esse videtur quàm Nasturtium sylvestre J. B.

Ilex

Ilex arborea *J. B.* major aculeata & non aculeata *Park.* 4. five folio rotundiore molli modicéque sinuato *C. B.* ejusdémque *I.* seu folio oblongo serrato. Ego enim has non distinguo. In arbusculis junioribus folia sinuata, & *Oleaginis* similia. *Ilex* major glandifera *Ger.* *The Holm-Dak.* In Italia & Gallia Narbonensi in sylvis & sepibus passim.

Ilex coccigera *Ger.* *aquifolia* five *coccigera* *Park.* aculeata *cocciglandifera* *C. B.* *The Scarlet-Dak.* In collibus saxosis circa Monspelium, Nemausum, Avinionem & alibi in Gallia Narbonensi. Glandem fert maximam, quod in pumila arbuscula mireris, etiam *Iligna* altera majorem. *Coccus baphica* non est hujus arbusculæ fructus, sed insecti cujusdam opus. Vide *Hist. nost. p.* 1392.

Imperatoria *Ger.* major *C. B.* *Imp.* seu *Astrantia* vulgaris *Park.* *Wasterwort.* In montibus max. *Carthusianorum* cœnobio adjacentibus.

C. Iris latifolia *Pannonica* colore multiplici *C. B.* *latifolia* major 15. *Clus.* *Iris* lutea foliis florum repandis variegatis *J. B.* Variis in locis Hungariæ montosis, ut in *Leytenberg* monte supra *Manderstorf*, & siccioribus pratis *Sopronio* vicinis.

Iris pumila tenuifolia flo. cœruleo. In insula ad Promontorium *Pachynum*, *Siciliæ*.

Iris humilis latifolia flore violaceo *J. B.* *Chamæiris* five variegata *C. B.* *Dwarf broad-leaved flower-de-Luce* with a Purple and White flower. Primum in rupibus quibusdam maritimis non longè à *Liburno* *Etruriæ* portu eam observavimus, deinde circa *Monspelium* aux *Garrigues*, ubi & *Lobelius*.

C. Iris humilis latifolia minor *J. B.* *Chamæiris latifolia minor* *Clus.* minor flore purpureo *C. B.* *latifolia* flore rubello *Ger.* Hujus 5. floris respectu species seu varietates proponit *Clusius*, quas ex semine deciduo sponte gigni non est dubium, inquit. Minus ergo rectè à *C. B.* pro distinctis speciebus enumerantur. Numerus enim specierum, si has specie distinguere concederemus, omnino incertus & infinitus esset. Nascuntur autem omnes in nudis & apertis collibus *Pannoniæ* & *Austriæ*. *Iris*

Iris Germanica Fuch. vulgaris Germanica seu sylvestris C. B. vulgaris violacea sive purpurea hortensis & sylvestris J. B. In muris, tectis, locis ruderatis, rupibus, &c. in Germania passim.

A. *Iris coerulea pratensis angustifolia altera Clus. angustifolia non foetida C. B. Maio in primo ad pagum Rotenbach prato Zeegelwiesen dicto. Cat. Altd.*

C. *Iris pratensis angustifolia, folio foetido C. B. tenuifolia Michelfeldensis spontanea J. B. angustifolia major sive 1. Clus. In Germania & Hungaria in pratis invenitur, ut non procul à Manderstorf, quinto à Vienna Austriæ milliari.*

C. *Iris angustifolia minor sive Pannonica versicolor Clusii Park. angustifolia non foetida elatior C. B. tenuifolia major, flore coeruleo & striato, angustifolia 2. Clusio J. B. In pratis nonnullis & locis pratensibus Austriæ & Hungariæ eum invenit Clusius, loca particularia vide apud ipsum.*

C. *Iris graminea cui pereunt quotannis folia J. B. angustifolia prunum redolens major & minor C. B. angustifolia 6. Clus. Chamæiris tenuifolia Ger. In pratis Viennæ Austriæ vicinis ad radices montium fitis.*

B. *Iris pratensis angustifolia humilior C. B. Xiphion, seu Gladiolus coeruleus minor Trag. Iris minor seu tenuifolia Dod. Michelfeldæ in pratis palustribus. Cat. Basf.*

Iris Florentina Ger. latifolia V. seu Florentina alba C. B. flore albo J. B. White Iris. In muris urbis Florentiæ magna ejus habetur copia. Hanc non distinguit J. B. ab Iride flore albo vulgari.

M. *Iris maritima Narbonensis Ad. angustifolia minor, quarta Clusii J. B. angustifolia maritima minor C. B. In maritimis prope Monspelium sæpius vidit P. Magnol, modò majorem, modò minorem, unde (inquit) tertiam & quartam Clusius constituit.*

M. *Iris perpusilla saxatilis, acaulis ferme Ad. Chamæiris saxatilis Gallica C. B. Plurima oritur in agro Narbonensi locis aridis & saxosis Garrigues dictis, secus specum illam sesquimilliaro Monspelio distitum, viâ quâ*

quâ Frontignanâ itur, in cujus cautibus & rupium commissuris frequens adolescit prope Ferulam. *Lob. Bot. Monsp.*

M. Iris minor lutea Dod. Chamæiris lutea Ger. flore luteo C. B. In sterilibus, Garrigues dictis, Mommau, la Colombiere & aliis prope Monspelium abundat. Bot. Monsp.

Ischæmon v. Gramen dactylon.

Iva moschata Monspelienfium v. Chemæpitys moschata.

Jujube Arabum v. Zizyphus.

Juncus acutus maritimus capitulis rotundis C. B. acutus maritimus alter Lob. Park. In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensi valde frequens. Round or Aglet-headed Bush. Habetur etiam in Anglia v. Synop. Brit.

M. Juncus acumine reflexo major C. B. J. B. Park. In herbidis & humentibus locis sæpius occurrit. Bot. Monsp.

Juncus acutus maritimus caule triangulo. C. B. J. B. Park. Triangular Sea-Bush. In maritimis prope Frontignanâ & Perauls oritur. Juncus noster triangulus ad ripas Thamefis fluvii ortus ab hoc longè diversus est, nec Scirpo maximo multo inferior magnitudine.

Juncaria J. B. Salmanticensis Ger. Park. Rubia s. seu linifolia aspera C. B. In Germania non longè à Ratibona. Locis arenosis inter vineta secundo à Salmantica milliari. Clus.

Juniperus major bacca rufefcente C. B. Oxycedrus Park. Oxyced Phœnicea Ger. Cedrus phœnicea Bello nio five Oxycedrus, quibusdam Juniperus major bacca rubra J. B. Great red-berryed Juniper or prickly-leaved Cedar. In collibus circa Monspelium abundat.

K.

K Ali semper virens grandius perpetuum *C. B.* *prod. geniculatum majus* *J. B. C. B.* *Salicornia* sive *Kali geniculatum* *Ger.* *Great woody geniculate Glass-wort.* In palustribus ad mare Mediterraneum valdè frequens. Multo lignosius est nostrate vulgari h. e. minore specie, per multos annos durat, in satis magnum fruticem adolescit, & in hortis culturam patitur experimento *J. Bauhini.*

Kali majus semine cochleato *C. B.* *Ger. majus cochleatum* *Park.* Vulgare *J. B.* *Soda Gallorum & Italarum.* *The greater Glass-wort with a twisted Seed.* Ad mare Mediterraneum sponte provenit plurimis in locis. Seritur autem Monspelii in lacubus salis ad *Sal Alkali* conficiendum, cujus modum v. apud *J. B.*

S. Kali Siculum lignosum floribus membranaceis *Bocc.* Juxta Saccam, Catanam & Agrigentum reperit *Bocconus*, ubi vocatur ab indigenis *Liuta.*

Kali minus villosum *C. B.* parvum hirsutum *J. B.* Frequens est in maritimis circa *Perauls.*

M. Kali minus foliis lucidis *Bot. Monsp.* Invenit *D. Magnol* circa oppidum *Meze* juxta tamariscos prope molendina. Foliis est copiosis lucidis, ita ut præ luciditate villosum primo intuitu arbitraretur, & in acutum desinentibus, quibus notis à minori villoso & minori albo distinguitur.

Col. Kali floridum repens aizoides *Neapolitanum* *Col.* floridum repens *Neapolitanum Columnæ* *Park.* Crassulæ minoris folio *C. B.* In terrenis editis locis maritimis non arenosis, ut nonnisi maris æstus aspergat. *Chrysanthemi aizoidis* *Breynii* species est.

Z. Keiri Alpinum foliis dentatis, flore flavo odorato *Zannoni.* In Alpibus Bononiensibus inter rupium fissuras invenitur. An *Leucoium luteum* sylvestre *Clusii* *J. B.* de quo infra, L L. Labur-

L.

- L** Aburnum v. Anagyris.
 Lactuca sylvatica purpurea *J. B.* montana
 purpuro-coerulea major *C. B.* item minor
ejusdem. sylvestris purpureo flore *Park.*
 Sonchus sylvaticus *Ger. emac.* Purple-flower'd
 Wood-Lettuce. In sylvis montosis Juræ, Salevæ, &c.
 frequens.
- Lactuca sylvestris angusto laciniato folio *Bot. Monsp. App.*
 nihil aliud esse videtur quàm Lactuca sylvestris minima
Cat. Cant. i. e. Chondrilla viscosa humilis *J. B. C. B.*
Park.
- Lagopus altera angustifolia *Lob.* major angustifolius *Park.*
 Trifolium angustifolium spicatum *J. B.* montanum an-
 gustissimum spicatum *C. B.* In montibus supra Mel-
 lanam, atque etiam circa Monspelium, utrobique co-
 piose. Flores dilutè rubent. Ab hoc non diversam
 specie existimo Lagopum angustifoliam Hispanicam
Clusii.
- Lagopus maximus *Lob. Ger. max.* flore rubro *Park.* Tri-
 folium spicâ subrotundâ rubrâ *C. B.* Trif. albo-incarna-
 tum spicatum, sive Lagopus *J. B.* Quod circa Nea-
 polin provenit flores habet pulchrè rubentes aut coc-
 cineos, quod propè Genevam albo-incarnatos aut pal-
 lidos. Great Baresfoot Trefoil.
- Lagopus major folio pinnato *Park.* major spica longiore
Ger. Trifolium purpureum majus folio & spica longi-
 ore *J. B.* montanum spica longissima rubente *C. B.* In
 collibus circa Genevam.
- A. Lamium maculatum *C. B.* Urtica fatua *Λιχόστηθος*
Thal. maculis albis respersa *Col.* cujus folia non lineâ
 albâ notantur uti Milzarella *Cordi*, sed argenteis ma-
 culis nitent. Passim in Alneto & Coryleto Ammer-
 bachii in Maio. *Cat. Altd.*

H. Lamium

- H. *Lamium Urticæ folio flore purpureo spicato* N. D.
Commel. Cat. Holl. An *Lamium paludosum* *Belgicum*
Melissæ folio *Herman. Cat. Lugd. Bat.*
- C. *Lamium maximum sylvaticum alterum* C. B. *Pannonicum* sive *Galeopsis* *Ger.* *Galeopsis maxima* flore magno rubro *J. B.* maxima *Pannonica* *Park.* In sylvis montibus arci *Greben* supra *Warasdinum* in *Pannonia* vicinis.
- Lamium albâ linea notatum* C. B. *Plinii montanum* *Columna* *Park.* *Galeopsis maculata* *J. B.* *Milzatella* vulgo. In *Italia* & *Gallia Narbonensis* inter vepres & in sepium aggeribus frequentissima.
- Col. *Lamprana* *Apula* *Plinii* & *Dioscoridis* Col. *Raphani* species est. In marginibus viarum & aggeribus agri *Cirinol.*
- Lamium peregrinum* sive *Scutellaria* C. B. *peregrinum* *Scutellaria dictum* *Park.* *Cassida* Col. In *Italia* circa *Florentiam*, *Liburnum* & alibi. Magnam habet convenientiam seu similitudinem florum respectu cum *Lysimachia galericulata*; unde eam primo aspectu *Lysimachiam galericulatam Urticæ folio* denominavimus.
- Lamium* &c. v. *Galeopsis.*
- Lanaria* sive *Struthium* *Dioscoridis* *Imperato* *J. B.* *Saponaria* *Lychnidis folio*, floribus albis C. B. In præruptis montium *Messanæ* velut imminentium. Ineunte *Junio* nondum floruerat. Hanc *Caryophyllum montanum* ramosum floribus albis pentapetalis minimis denominavimus.
- C. *Lapathum folio rotundo* *Alpinum* *J. B.* *Hippolapathum rotundifolium* *Ger.* rotundif. vulgare *Park* rotundif. montanum C. B. In omnibus jugis *Alpium* *Stiriacarum* & *Austriacarum*. In *Rhetix* *Alpibus* *J. B.*
- H. *Lapathum folio acuto rubente* C. B. *sanguineum* *Loß.* *Park.* *Sanguineum* seu *Sanguis Draconis herba* *J. B.* *Cat. Hol. Commel.* Hanc speciem in *Anglia* spontaneam mihi nondum videre contigit; alii se vidisse affirmant.
- Lapathum maritimum foetidum* v. *Acetosa.*

Larix C. B. Ger. Park. folio deciduo conifera **J. B.** In Alpibus Stiriacis & Carinthiacis, eundo à Vienna ad Venetias copiosam vidimus.

Hæc sola arbor ex resiniferis folio est deciduo. Folia autem monente **J. Bauhino**, non decidunt Autumno, nec antequam alia initio veris succedant.

M. Laserpitium Gallicum C. B. Park. Laf. è regione Massiliæ allatum **J. B.** **Laserpitium Ger. Laserwort.** Copiosum invenit **D. Magnol** cum semine versùs pagum **Seine**, ascendendo in montem *Bouquet*, inter *Alex* & *Usez* urbes situm. Multò minorem vidit in sterilibus locis eundo à l' *Hermitage de S. Guilben*, & in monte *Serane à la combe du Bois de Ganges*.

Lathyrus major Narbonensis angustifolius J. B. angustifolius **Park.** angustifolius flore purpureo **Park.** **Par-row-leaved Pease everlasting.** Circa *Monspelim* non longe à *Sella nova* & alibi.

Lathyrus sativus flore purpureo C. B. angustifolius flore purpureo **Ger.** anguloso semine **J. B.** **Purple-flower'd Chickling.** Circa *Genevam* copiosè seritur, & in *Germania*.

Lathyrus sativus flore fructuque albo C. B. **Cicercula** seu **Lathyrus sativus flore albo Park.** **White Chickling.** Et hic circa *Genevam* & in *Germania* seritur.

Lathyrus siliquâ hirsutâ J. B. angustifolius siliquâ hirsutâ **C. B.** Inter segetes circa *Genevam*.

Lathyrus sylvestris flore vario ex albo & coccineo. Flores è foliorum sinubus exeunt in pediculis longioribus, tenuibus singulares, clypeo seu petalo erecto albo, umbone coccineo. Circa *Genevam* in satis copiosè, nec non circa *Liburnum*.

Lathyrus foliis gramineis, floribus coccineis. An **Lathyrus angustifolius humilior**, **Ervum Monspeliensium C. B.?** In pascuis ad radices montis *Vesuvii*.

M. Lathyrus luteus latifolius Bot. Monsp. **Lathyrus species lutea J. B.** In satis circa *Salenovam* non longè à *Monspelio* & alibi *Aprili* & *Mai*o mensibus cum flore occurrit. **Bot. Monsp.**

- M. Lathyrus angustifolius humilior*, *Ervum Monspeliensis* C. B. Hanc eive similem invenit *P. Magnol* circa Boutonetum & in aliis sterilibus satorum marginibus humilem cum foliis gramineis venosis & floribus phœniceis.
- M. Lathyrus folio tenuiore*, floribus rubris *J. B.* angustissimo seu capillaceo folio C. B. *prod.* In satis siccioribus circa Monspelim. *Bot. Monsp.*
- B. Lathyrus sylvestris major alter* C. B. In dumetis ad Cliben. *Cat. Bas.*
- B. Lathyrus sylvestris minor* C. B. *Ervum sylvestre* *Dod.* Herbariorum *Lob.* Inter segetes *Wilenfes* *Cat. Bas.*
- Lavendula major* five vulgaris *Park.* flore coeruleo *Ger.* *Lavendula latifolia* C. B. *Pseudonardus*, quæ vulgò *Spica J. B.* *Common Lavender.* In Gallia Narbonensi passim & copiosissimè.
- Laureola* folio deciduo v. *Mezereon.*
- Laurus Ger. J. B.* vulgaris C. B. major five latifolia *Park.* *The Bay-Tree.* In hortis duæ præcipuæ observantur differentiæ, mas scilicet baccas proferens, vulgò *Baguier*, & foemina quæ flores solummodo producit, & dicitur simpliciter *Laurier. P. Magnol.*
- Laurus Tinus* coeruleâ baccâ *Lob. sylv.* Corni foeminæ foliis subhirsutus C. B. *Laurus Tinus Ger.* *Tinus altera J. B.* In Italia circa Romam, Tybur & alibi frequens. Invenimus quoque in sylva Valena prope montem Lupi non longe à Monspelio. Reperitur & in monte Ceti inter cocciferas *Ilices*, adnotante *Lobelio.*
- Ledum Alpinum hirsutum* C. B. *Alpinum*, five *Rosa Alpina Park.* *Nerium Alpinum* quibusdam, aliis *Ledum hirsutum J. B.* *Cistus ledum Alpinum Clusii Ger.* In præruptis Alpium scopulis prope Pontebam oppidum, quod Imperiale & Venetianum territorium determinat, nobis observatum.
- Ledum Alpinum* foliis ferrea rubigine nigricantibus C. B. *Nerium Alpinum* quibusdam, aliis *Ledum glabrum J. B.* *Led. Alp. five Rosa Alpina Park.* *Chamaerhododendros Alpigena Ger.* In summis jugis montis Juræ prope Genevam, inque Alpibus Rhaticis.

Ledum Alpinum hirsutum pumilum pro **Chamæcisti** specie habitum. **Cistus** pumilus montis Baldi, forte Austriacus myrtifolius *J. B.* **Chamæcistus** hirsuta *C. B.* **Cistus** humilis Austriaca **Clusii** *Ger.* **Chamæcistus** hirsutus *Park.* Eisdem in rupibus cum prima specie invenimus.

M. Lenticula palustris bifolia fructu tetragono *C. B.* In rivulo circa *Lunel* propè molendinum invenit *D. Magnol.*

M. Lenticula palustris latifolia punctata *C. B.* palustris Patavina *J. B.* In paludibus Laterensibus versùs locum dictum *Maupas.* In fossis Patavinis aquis innatat.

H. Lenticula palustris major *Cat. Holl. Commel.*

Lentiscus *Lob. Ger. Park J. B.* vulgaris *C. B.* *The Maltick-tree.* In saxosis collibus Italiae, Siciliae & Narbonensis Galliae, ubi nunquam (quod equidem viderim aut audiverim) justam arboris staturam & magnitudinem assequitur, sed frutex semper perdurat; quamvis alibi, teste Bellonio aliisque, in arborem satis proceram adolescat.

Lepidum annuum *Ger. Park. II.* five glastifolium *C. B.* non repens *J. B.* Annual *Dittander,* or *Pepperwort.* In agris prope Ratifponam, ubi & *Fœnugra-* cum aut satum aut sponte provenit.

Lepidum *Dentellaria* dictum *v. Plumbago.*

Leucoium bulbosum præcox Byzantinum **Clusii** *Ger. emac. J. B.* bulb. præ. minus Byzantinum *Park.* bulbosum trifolium majus *C. B.* E monte Virgineo prope Neapolin erutus *Imper.*

• **Leucoium** bulbosum vernum minimum *Clus. Park.* bulbosum tenuifolium minimum *C. B.* A *Nic. le Quele* habuit **Clusius**, qui (ut verisimile) ex Hispania attulit.

Col. Leucoium terrestre majus frigidarum regionum *Col. luteum* *Erucae* folio *C. B. Park.* Inter saxa vallis *Campoclarensum* supra locum vulgò dictum *il Colle di Mez,* locis umbrosis humentibus & frigidis.

Leucoium bulbosum præcox minus Ger. *bulbosum minus triphyllum* *J. B. Snow-drops, or early bulbous Violet.* In convallibus Alpium via qua Bassano Tridentum itur, & alibi copiose.

Leucoium bulbosum vulgare C. B. *bulbosum hexaphyllum cum unico flore rariùs bino* *J. B. bulbosum ferotinum* Ger. *Common bulbous Violet.* In umbrosis pascuis Helvetiæ pluribus in locis, quin & in Italia prope Taurinum sylvis montosis, itémque circa Tridentum in Alpibus.

Leucoium bulbosum majus polyanthemum Ger. *Leuconarcisso-lirion pratense* Lob. *Leucoium bulb. polyanthemum tardius florens, floribus minoribus* *J. B. majus sive multiflorum, quod aliqui Acrocorion Plinii statuunt.* C. B. In palustribus prope Pisas copiosè. Reperitur etiam circa Monspelium in pratis. v. Bot. *Monsp.*

M. *Leucoium maritimum latifolium* C. B. *marinum latifolium* Ger. *Park. maritimum latifolium flore cœruleo purpurante* *J. B. In declivibus montis Capouladou, inter rupes primo vere floret, & in loco dicto las Cambrettes. Magnol.*

C. *Leucoium sylvestre* Ger. *luteum sylvestre Clusii* *J. B. Keiri seu Leucoium sylv. Clusii* *Park. Leucoium luteum sylvestre angustifolium* C. B. In montibus illis supra Badenses thermas, & in Leytenberg, salebrosis & meridiei obversis locis.

Leucoium maritimum angustifolium C. B. *J. B. marinum minus* *Park. marinum minus Lobelii & Clusii* Ger. *Narrow-leaved Sea Stock=July-flower.* In arenosis maris Mediterranei litoribus prope Frontignan.

S. *Leucoium Gallicum folio Halimi* *Boccon. qui locum non meminit.*

B. *Leucoium maritimum minimum* C. B. *Prod. In litore maris prope Terracinum.*

H. *Levisticum vulgare* Ger. *Park. Ligusticum vulgare foliis Apii* *J. B. vulgare, an Libanotis fertilis Theophrasti* C. B. *Lobage.* In D. *Commelini* Catalogo Indigenarum Hollandiæ invenio.

- Leucoium spinosum v. Thlaspi spinosum.
 Libanotis altera Theophrasti nigra v. Saxifragia Venerum.
 Libanotis Theophrasti minor *Park.* latifolia altera sive vulgarior *C. B. Lib. Theoph.* quorundam, sive Seseii Æthiopicum Matthiolo. Cervaria alba *J. B.* In montibus circa Genevam copiosè.
 M. Libanotis latifolia Aquilegiæ folio *C. B. Park.* Ligusticum Rauwolfii foliis Aquilegiæ *J. B.* Sub corylis à la Combe de Leques in monte Serane. Bot. Monsp.
 B. Libanotis latifolia minor semine crispo *C. B. prod.* Ex Italia Colli amari semine crispo nomine allata.
 M. Libanotis Cachryophoros quibusdam flore luteo *J. B.* ferule folio, sive Cachryfera, sive Cachrys vera *Park.* Ferulæ folio, semine anguloso *C. B.* Libanotis Galeni, Cachrys verior *Ger.* quoad iconem. Propè Monspelium secundum fluvium la Maussou, eundo à ponte dicto de Saint Jean de Vedas, ad pontem Villæ novæ ad dextram, in elato colle prope Molendinum dictum la Tour Maio mense floret. Bot. Monsp.
 Col. Lichen alter acaulis *Πορφυλλόκηρος* Col. petræus minimus fructu Orobi *C. B.* In mulcosis & humidis.
 Lichen marinus rotundifolius *Ger. v.* Opuntia marina. Ligusticum v. Siler montanum.
 Lilium aureum v. Martagon Chymistarum.
 C. Lilium bulbiferum incanum *J. B. C. B. Park. 2.* *Clus.* cruentum latifolium *Ger.*
 C. Lilium bulbiferum minus *C. B. Park.* bulbiferum repens *J. B.* cruentum, secundum caulem bulbis donatum *Ger. emac.* In montanis Austriæ & Stiriz pratis utrumque, præcedens tamen rarius.
 C. Lilium montanum seu sylvestre minus *Park.* Lilium floribus reflexis alterum lanugine hirsutum *C. B.* montanum seu sylvestre 1. majus *Clus.* Variat interdum flore non inflexo sed surrecto, dilutius purpurascens, non maculato; non procul *Maurpach* Austriæ.

C. Liliū flore nutante albo *J. B.* floribus reflexis albis non punctatis *C. B.* mont. flore albo puro *Clus.* præcedentis varietas esse videtur.

C. Liliū floribus reflexis varium sive tertium *Clus.* humile, flore antequam explicatur foris carneo, cū explicatur intus albo, notis purpureis insignito. In sylvis montibus Francofurti, ad septentrionem.

C. Liliū sylv. quartum *Clus.* florib. saturatè purpurascens, seriū florentibus, & odore non insuavi præditis.

Primum & secundum genus *Cluse* eorūque varietates in umbrosis pratis *Leytenberg* eorūque montium qui à *Calenberg* Austriæ ad Alpes usque excurrunt, & in plerisque Stiriæ ac Hungariæ sylvis oritur.

C. Liliū luteum *Asphodeli* radice *C. B.* *Asphodeli* radice luteum, sive *Liliasphodelus* quorundam flore luteo *J. B.* *Liliasphodelus* *Park.* Liliū non bulbosum *Ger.* *The Day Lilly.* In Ungaria multis uliginosis pratis, non procul ab oppido munitissimo *Nemetshwywar.*

Liliū floribus reflexis montanum *C. B.* montanum minus *Ger.* flore nutante ferrugineo majus *J. B.* sylv. secundum minus *Clus.* *Mountain Lilly.* In colle *la Bastie*, & in monte *Saleva* prope *Geneviam.* *Clusius* tres habet hujus varietates.

Limonium folio sinuato *Ger.* peregrinum *Rauwolfii* *Park.* quibusdam rarum *J. B.* peregrinum foliis *Asplenii* *C. B.* In insula ad Promontorium *Pachynum*, & ad promontoriolum *Punto Cercio* dictum prope castellum *Puzzallu*, utrobique copiosè. *v. Rauwolf. Itinerar. p. 268.*

T. Limonium maritimum majus alterum serotinum Narbonense *Hort. Reg. Par. Schol. Bot.*

Limonium parvum Narbonense *Olea-folium* *Lob.* minus *J. B.* minus maritimum *Olea* folio *C. B.* parvum *Ger.* Narbonense parvum *Park.* *Small Olive-leaved Sea-Lavender.* Ad mare prope *Monspeliū* copiose: invenimus etiam in *Etruria* circa *Liburnum.*

Limonium aliud parvum Narbonense floribus majoribus: An *Limonium maritimum minus* foliolis cordatis *C. B. Park.* *Campriore. v. Hist. nost. p. 395.*

M. Limonium

- M. Limonium supinum reticulatum *Bocc.* Prope pagum *Perauls* in paludibus, prope locum dictum *lou Boulidou* cum prima specie mixtum. Ejus satis ferax est Melita insula.
- M. Limonium annuum minus bullatis foliis vel echioides *Bot. Monsp.* In maritimis montis Ceti, & in siccis locis ultra pontem Salenovæ ad dextram.
- S. Limonium lignosum gallas ferens, idémque sine gallis *Boccon.* Agrigenti locis incultis magna fecunditate luxuriat: ad Prom. Pachynum in loco *Brazzetto* dicto absque gallis invenitur. *Bocc.*
- S. Limonium marinum fruticosum hirsutum *Bocc.* In insula D. Margaretx, & scopulis ad oram maritimam Galloprovinciæ plurimum. Inter rupes montis Ceti juxta mare non hirsutum invenit *Magn.*
- M. Limonium parvum Bellidis minoris folio *C. B.* pumilum *Clus.* in maritimis versus *Perauls* & Magallonam cum aliis permixtum nascitur.
- Linariæ aliquatenus similis folio Bellidis *J. B.* Linaria erecta latifolia *J.* seu Bellidis folio *C. B.* odorata *Park.* purpurea odorata *Ger.* in agris quibusdam Lugdunum inter & Gratianopolin, 5 aut 6 leucis à Lugduno. Linariæ species genuina non est.
- S. Limonium Siculum folio cordato *Boccon.* Propè Panormum & Augustam inveni copiosum, inquit *P. Boccone.* Idem esset cum eo quod à *C. Bauhino* in Prod. describitur, ni obstarét foliorum longitudo, quæ in hoc notatu digna est. *Bocc.*
- H. Limonium flosculis elegantissimis. *Franc. de Honu-phriis.*
- Linaria aurea Tragi *Ger.* folioso capitulo luteo major *C. B.* Heliochrysos Tragi sive Linaria *J. B.* In montibus prope Ratilponam & alibi in Germania. Hanc plantam cum Morisone ad Virgam auream rectius retuleris quàm ad Linariam.
- Linaria purpurea magna *J. B.* erecta angustifolia *ro.* sive purpurea major odorata *C. B.* altera purpurea *Ger.* The greatest purple Toad-flax. Circa Neapolin, & ad radices montis Vesuvii. Maxima est omnium quotquot hactenus novimus Linariarum, flore parvo intensè purpureo. Linaria

Linaria graminea floribus congestis purpureis. *Lin. cœrulea* calcaribus longis *J. B.* In pascuis ad radices montis Veluvii copiosè. Altitudo ei dodrantalis, folia graminea, flores in summo caule densè stipati velut in brevi spica. Q. an ab hac diversa sit?

M. *Linaria annua* purpuro-violacea calcaribus longis *Magn.* foliis imis rotundioribus *D. Pelisserii Lob. Illustr.* cujus figura habetur in *Bot. Monsp.* descriptio in *Lob. Illustr.* In herbidis satorum marginibus intra lucum Gramuntium sitis Maio mente florentem vidit *P. Magnol.* *Linaria minor cœrulea* erecta *Park.*

† *Linaria odorata* Montepesulana *J. B.* erecta angustifolia 11, sive capillaceo folio odora *C. B. caryophyllata albicans Park.* Circa Montepesium ubique.

Linaria Montepesulana odorata minor cœrulea J. B. arvensis cœrulea erecta *C. B. prod* Prope portum Cetiium in arvis Aprilis & Maio. *Magn.* Q. quid differat à præcedente?

Col. *Linaria triphylla cœrulea C. B. cœrulea* Apula triphylla *Col. Park.* Cirinolanis agris pratensibus incultis obvia.

Linaria purpurea parva foliis dispositis *J. B. pumila* seu repens 4, sive cœrulea repens *C. B. Park.* Moravica 2. *Clus.* purpuro-cœrulea repens *Ger.* In alveis fluviorum & torrentium Alpestrum. *Cat. Corn.*

Linaria quadrifolia supina C. B. Ger. emac. quadrifolia Alpina Park. purpurea parva *C. B. 3. Stiriaca Clus.* In Alpium præruptis per Stiriam & Carinthiam, inque monte Jura observavimus. Flores (ut rectè Clusius) elegantissimo colore præditi sunt ex violaceo quodammodo purpurascete, labro inferiore ubi hiat, aut ducto rictu aperitur, planè aureo.

C. *Linaria Pannonica* flore luteo minore quàm in vulgari *J. B. Pannonica major Park.* flore pallido, rictu aureo *C. B. Pannonica 1. Clus.* In montium declivibus supra Posonium ad Danubium, &c.

T. *Linaria annua angustifolia* flosculis albis longiùs caudatis *Triumph.* Romæ prope Farnesianos colles, non longè ab eo situ quo meridiem respiciunt,

- Linaria lutea* parva annua *J. B.* *pumila*, foliis carnosis, flosculis minimis flavis *C. B.* *lutea* Moravica *Clusii Park*. In sterilibus locis circa Boutonetum, Sellam novam, *la Colombiere* aliisque Maio mense floret. Hanc nos esse putamus quam in monte Lupi invenimus Autumno florentem. Quam *D. Magnol* pro *Linaria pumila* Hispanica *Park*. supina *lutea C. B.* habet.
- Linaria pusilla* procumbens latifolia, flore pallido, rectu luteo, longissimis calcaribus. Hanc Messanæ in vineis & hortis frequentem observavimus Maio & Junio cum flore.
- Linaria angustifolia* vulgari similis flore luteo. Hanc Messanæ vidimus in Lingula illa fretum Siculum inter & portum Zancleum.
- S. Linaria Sicula* multicaulis Molluginis folio *Bocconi*. An *Lin. tetraphylla lutea minor Col?* An *Cretica angustifolia Clus?* Panormi tota æstate floret, & alibi etiam in Sicilia copiosè.
- S. Linaria latifolia triphylla Sicula Boccon.* Floret æstate in montibus Hyblæis circa Syracusas, & alibi illic passim reperitur.
- S. Linaria pumila triphylla Sicula Boccon.* Ad montes Hyblæos in oppido Melilli nascitur.
- B. Linaria lutea montana Genistæ tinctoriæ folio C. B. pin.* Ad montem *S. Bernhadi* floribus aureis mediæ magnitudinis reperitur.
- Col. Linum luteum* ad singula genicula floridum *C. B. luteum sylv. latifolium Col.*
- Linum luteum Narbonense J. B. marinum luteum Ger. maritimum luteum C. B. sylv. angustifolium luteum Park. Yellow wild flax.* Inter Monspelium & Sellam novam. Floret Septembri. Hujus varietatem duplo grandiore invenimus ad mare, quam tamen specie differre non existimo. Folia nempe, caules, capitula, semina utrique eadem.
- M. Linum sylvestre minus flore luteo C. B. Linum sylv. montanum, Chamælinum Clus. Chamælinum perpu- fillum Ger. Linum pumilum foliis semper binis, albo flore vel luteo pallente J. B. Pedale & erectum vidit D. Magnol in herbidis montis Capouladou, juxta fluvium Herau,*

Herau, Julio mense florens. Folia angustissima habet, flores velut in umbella dispositos, luteos parvos. In herbosis collibus & montanis Aultriæ & Stiriæ. *Clus.*

M. *Linum sylvestre* floribus albis *Lob. Ger. sylv. 5.* angustifolium 2. *Clus. sylvestre angustifolium flore magno C. B. sylv. ang. cœruleo vel albo flore magno Park. White-flower'd wild flax.* Junio & Julio mensibus copiosum reperit *D. Magnol.* cum flore iam sterilibus herbidis circa *S. Martin* versùs montem *Lupi.*

C. *Linum sylvestre latifolium hirsutum cœruleum C. B. sylv. latif. hirs. flore cœruleo J. B. sylv. latifolium Ger. sylv. latifolium cœruleum Park. sylv. latif. 1. Clus.* Multis Pannoniæ superioris & Aultriæ inferioris locis editoribus & siccioribus, gramineis tamen.

C. *Linum sylv. latif. hirsutum candidum, venis in umbilico purpureis C. B. sylv. latif. lanuginosum, flore candido, purpureis lineis striato J. B. sylv. album purpureis venis Park. sylv. latifolium 2. Clus.* Apud *Colibriam Lusitanæ* urbem hanc tantùm invenit *Clusius.*

C. *Linum latifolium luteum J. B. sylv. latifolium luteum Park. C. B. sylv. 3. latifolium Clus. sylv. latif. 3. Clusii Ger. emac.* In monte Badensibus Aultriæ thermis imminente, locisque vicinis gramineis.

C. *Linum sylv. 4. angustifolium Clus. Lino sylvestri cœruleo perenni nostrati idem videtur.*

C. *Linum sylv. 6. angustifolium Clus. in anteriore Madritianæ sylvæ parte secundo ab urbe Lutetiæ lapide inventum, idem esse putamus cum eo quod in Cornubiæ pascuis prope oppidum Truro & S. Ives copiosè provenit.*

Linum sylvestre luteum foliis subrotundis C. B. item Rapunculus nemorosus angustifolius parvo flore ejusdem. Linifolia Campanula lutea J. B. Campanula lutea linifolia Ger Park. linifolia lutea montis Lupi flore Volubilis Lob. In devexis montis Lupi, qua ad Septentrionem vergit. Lob. Latioribus foliis in devexis montis Capouladou Magnol.

M. *Linum sylvestre cœruleum folio acuto* C. B. *prod.* *sylv. angustifolium cœruleo amplo flore* Bot. *Monsp.* Variis in locis sterilibus circa Monspelium Junio mense cum flore reperitur, sed præcipue in via quâ itur *Grabels*, prope prædium dictum *la Tevilliere de Massanes*.

M. *Linum minimum stellatum* C. B. *prod.* Monspeffuli in Gramuntio & Boutoneto provenit vere florens.

Linum sylvestre latifolium, caule viscoso, flore rubro C. B. *sylv. latif. flore rubro* Park. In planitie quadam prope Auguttam Vindelicorum, per quam Monichium Bavariae iter est. Augusto mense adhuc florentem invenimus. Descriptionem v. *Hist. nost.* p. 1074.

Lithospermum Linariae folio C. B. v. *Passerina*.

Lithospermum umbellatum latifolium Boccon. Ad Panormum in cautibus montis Peregrini gignitur. Accedit tum figura tum descriptio ad *Mithospermum majus* Dod.

Lonchitis aspera Maranthæ J. B. *Park Ger.* altera *Maranthæ Chus.* folio *Ceterach* C. B. In Stiriacarum Alpium jugis, locis editis & salebrosis.

Lonchitis aspera C. B. *aspera major* Ger. asp. major *Matthioli* Park. altera cum folio denticulato, sive *Monchitis* altera *Matthioli* J. B. In summis rupibus montis Juræ.

Lotus arbor Lob. *Ger.* Larbor fructu *Cerasi* J. B. *Lotus fructu Cerasi* C. B. *The Pettle-tree.* In Italia circa Romam, & Gallia Narbonensi circa Monspelium.

H. *Lotus hortensis odora* C. B. *fativa odorata annua* J. B. *Trifolium odoratum* Dod. *Ger. Park.* Hanc in Cat. Holl. Commelini invenio.

B. *Lotus pentaphyllos minor hirsutus*, filiquâ angustissimâ C. B. Monspeffuli in sylvulis & pratis inter montem Lupi & Calcaris.

B. *Lotus pentaph.* frutescens, tenuissimis glabris foliis C. B. Monspelio & ex Italia habuit.

Lotus quadripinnatis filiquis Park. filiquâ quadratâ Ger. ruber, filiquâ angulosâ C. B. flore fusco tetragonolobus J. B. In Sicilia prope Messanam in olivetis, Anglicis

Anglicis Herbariis ineptè *Square-codded Uetch* dicitur.

Lotus filiquosa lutea Monspeliensis *J. B.* pratensis filiquosus luteus *C. B.* Circa Genevam & Monspessulum copiosè, item in pratis ad Tybridis fluvii ostia. *Lotus pratensis Monspeliensium Park.*

Lotus lutea filiquis pinnatis strictioribus & longioribus. An *L. maritima lutea filiquosa*, folio pingui glabro *Magnol?* In Italia propè Tybridis fluvii ostia. *V. Bot. Monsp.*

Lotus edulis Cretica Park. pentaphyllos filiquâ cornutâ *C. B.* Trifolium five *Lotus Hierazune edulis filiquosa* *J. B.* Trifolium corniculatum Creticum *Alpin. exot.* huc refero. Primò observavi in Italia prope Neapolin, postea in Sicilia.

Lotus filiquis Ornithopodii *J. B. C. B.* An sylvestris Cretica *Park?* Circa Messanam Siciliæ ad latera montium urbi imminantium, & in insula ad Prom. Pachynum.

Lotus flore luteo corniculis tenuibus contortis articulatis. An Trifolium Scorpioides *Park?* Ad *Punto Cercio*, non longè à castello *Puzzallu* in Sicilia.

Lotus filiquis rectis incana major. Prope Neapolin è petrarum rimis exit. An *Lotus pentaphyllos major alter C. B.?*

Lotus corniculata filiquis singularibus vel binis tenuis *J. B.* corniculatus minor pilosus *C. B. Park* pentaphyllos minor hirsutus, filiquâ angustissimâ *C. B.* Prope Neapolin in Italia collegimus: invenitur & in Gallia Narbonensi.

Lotus Libyca Dalechampii Lugd. filiquosus glaber flore rotundo *C. B.* Trifolium hæmorrhoidale minus, five *Lotus Libyca Dalechampii Park* Trif. rectum Monspessulanum *J. B.* Oxytriphyllum Scribonii Largi *Clus. hist.* huic idem videtur. Ad rivos & in locis humidis circa Messanam Siciliæ, Tropiam Calabriæ, & Monspelium Galliæ Narbonensis.

Lotus pentaphyllos filiquosus villosus C. B. incana five Oxytriphyllum Scribonii Largi *Ger.* *Lotus hæmorrhoidalis major*, five Trifolium hæmorrhoidale majus *Park.*

- Park.* Trifolium album rectum, hirsutum valdè *J. B.*
Prope Monspelium eundo ad *Perauls* vicum mariti-
mum. Prope Messanam major habetur & lignosior.
D. Magnol in Valena sylva se bicubitalem & tricubita-
lem observasse scribit. *Bot. Monsp.*
- Lotus pentaphyllos vesicaria C. B.* Anthyllis leguminosa
vesicaria Hispanica *Park.* idonea sanè appellatione,
Trifolium halicacabum sive vesicarium *J. B.* perpe-
ram. Circa Messanam & alibi non in Sicilia modo,
sed & in Italia. *Cat. Rom.* In collibus Farnesianis,
Loto affinis v. Anthyllis & Auricula muris.
- Lunaria radiata Robini J. B. v.* *Securidaca peltata v.*
Thlaspi clypeatum minus, biscutata v. *Thlaspi cly-*
peatum.
- Lupinus sativus flore albo C. B.* sativus albus *Park.* vul-
garis flore & semine albo sativus *J. B.* *White Lupine.*
In Italia prope Liburnum portum, & alibi satum vi-
dimus.
- Lupinus sylvestris flore coeruleo C. B.* flore coeruleo *Ger.*
sylv. purpureo flore, semine rotundo vario *J. B.* In
Sicilia circa Messanam sponte & copiosè provenit; va-
riis etiam in locis circa Monspelium in satis. *v. Bot.*
Monsp. Duplex est semine majore & minore; uterque
iisdem in locis nascens.
- M. Lupinus flore purpurascente latifolius hirsutus C. B.* in
Matth. In satis in luco Gramuntio sitis, & in aliis
circumpositis. *Bot. Monsp.*
- Lupinus flore luteo Ger. Park. Yellow Lupine.* sylve-
stris luteo flore, semine compresso vario *J. B.* In
arenosis ad Fretum Siculum inter Messanam urbem &
Pharum Messanensem copiosè. Aiunt & circa Mon-
spelium inveniri in satis & cultis.
- A. Lunaria botryitis πηλαδουλλο Jungermanni Cat.*
Ald. minor rutaceo folio *C. B.* A vulgari Lunaria
minore in eo tantùm differt, quòd folia habeat tenuius
incisa & Rutæ modo divisa. Via quæ Noribergam du-
cit nonnunquam sed rariùs occurrit. *Cat. Ald.*
- Lychnis coronaria vulgo J. B.* coronaria sylvestris *C. B.*
coronaria vulgaris *Park.* coronaria rubra *Ger.* *Com-*
mon Rose-Campton. In Italia passim, ubi & flore albo
medio incarnato reperitur. *Lychnis*

Lychnis erecta parva, folio longo angustissimo, flore rubello. Inter segetes Lini vidimus, medio quasi itinere inter Massam & Lucam.

Lychnis minima rigida Cherleri *J. B.* In collibus propè Florentiam. Apud alios Botanicos in Catalogo exterarum nullam hujus quod scirem mentionem factam scripsi: Verùm *P. Magnol* *Lychnidem* sylvestrem minimam exiguo flore *C. B.* ejus Synonymam facit, & prope Boutonetum aliisque plurimis sterilibus in locis circa Monspelium reperiri vere cum flore scribit.

C. Lychnis sylv. pluribus foliis simul junctis *C. B.* sylv. angustifolia *Park.* sylv. foliis angustis & pluribus è geniculis singulis, Clusio 1. in *Hisp.* 8. in *Hist.* *J. B.* sylv. 8. Clusii *Ger.* In cæduis sylvis, & ad agrorum margines per universam Austriam infra Anisum, &c. abunde etiam sylvis Francofurto vicinis.

C. Lychnis viscosa alba angustifolia major *C. B.* repens folio viridi, flore albo Clusii *J. B.* Caryophyllus humilis flore candido amœno *Ger. emac.* Ad Stiriacarum Alpium & Snealben supra coenobium Neuberg radices; abundantius tamen in Etschero.

C. Lychnis viscosa alba angustifolia minor *C. B.* *Lychnis* sylv. 10. alia species *Clus.* In scopuloso illo præruptoque jugo, Durrenstein vocato, secundo supra Gamingam mill.

Z. Lychnis umbellifera montana Helvetica *Zanoni.* An *Lychnis* coronaria sylvestris *C. B.*? coronaria rure nata *Ad. Lob?*

Col. Lychnis montana flore luteo globoso. Bellis montana flore globoso luteo *C. B.* Globularia lutea montana *Col. Park.* In altissimis montium jugis supra Villam Flaminianum Æquicorum Materii comitatûs, loco *lo Serrone* dicto herbido & plano.

M. † Lychnis sylvestris alba spicâ reflexâ *Bot. Monsp.* eadem est *Lychnidi* nostræ flore albo minimo *Hist.* p. 996, quæ in Anglia inter segetes oritur, variis in locis, estque à *Lychnide* hirsuta flore eleganter variegato *Hist.* p. 997. specie diversa.

Lychnis sylvestris hirta *Lob. Ger. sylv. hirta major Park.* sylv. lanugine canescens, flore majusculo rubescente, Clusio 5. *J. B.* Circa Neapolin primò, deinde circa Messanam.

Lychnis parva, flore rubello, è calice oblongo angusto, Messanensis. Calice floris prælongo & tenui, flore pulchrè rubello, ejusque petalis in medio profundè ad unguem ferè fissis, ab aliis speciebus distinguitur. Juxta Messanam in primo montium ascensu hanc observavimus.

Lychnis sylvestris calyculis striatis Park. cal. stri. 2. Clusii *Ger. sylv. latifolia*, calyculis turgidis striatis *C. B.* *Muscipula major*, cal. turgido ventricoso *J. B.* In Germania prope Rhenum in agris copiosè. Reperitur etiam circa Monspelium in satis. *V. Bot. Monsp.*

Lychnis montana viscosa alba latifolia C. B. An *Muscipula altera* flore albo *Park?* *Polemonium petraeum Gesneri J. B.* Genevæ in urbis ipsius muris & in collibus vicinis frequens: in Germaniæ quoque Meridionalibus nusquam non obvia.

Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis C. B. *Muscipula Lobelii Ger. Park.* *Centaurium minus adulterinum*, quibusdam *Lychnidis viscidæ* genus *J. B.* *Lobelia atchfly.* In agris montosis prope Rhenum inter segetes. Monspelii spontaneam invenit solummodo sub castaneis circa *Sumenes* Junio & Julio florentem *P. Magnol.*

M. Lychnis sylvestris viscosa rubra altera C. B. *Muscipula viscaria* five *Lychnitis* species *J. B.* *Lychnis viscaria* five *Muscipula Ger.* *Lych. sylv. rubra minor Park.* In satis circa Monspelium Maio mense florentem sæpe vidit *P. Magnol.*

Lychnis sylvestris minima flore muscoso *Bot. Monsp. viscosa erecta annua caryophylloides nobis.* In marginibus Gramuntix sylvæ prope Monspelium.

Lychnis segetum rubra foliis Perfoliatæ C. B. *Lychnis segetum vaccaria rubra dicta Park.* *Vaccaria J. B. Ger. Red Corn Champion*, by some improperly called *Cow-Basil.* Inter segetes in Germania & Gallia passim.

† *Lychnis*

† *Lychnis Alpina* pumila folio gramineo, seu *Muscus Alpinus* *Lychnidis* flore C. B. *Caryophyllus pumilio Alpinus* vel 9. *Clus. hist.* *Muscus floridus Gesn. ep. & m. fr.* *Muscus Alpinus* flore insigni dilutè rubente *J. B.* *Caryophyllus pumilio Alpinus Ger. emac.* *Ocymoides muscosus Alpinus Park.* An *Gentianella* omnium minima C. B. *Park?* In summis jugis montium altissimorum max. *Carthusianorum* coenobio imminetium.

Lychnis Alpina, vel *Ocimoides repens montanum* C. B. *Lychnis montana repens Ger. em.* *Ocimoides repens Park.* *Saponaria minor* quibusdam *J. B.* In colle *la Bastie* prope *Genevam*; inque *Etruria* non procul à *Massa*, viâ qua inde *Lucam* itur. Reperitur etiam circa *Monspelim* multis in locis. *V. Bot. Monsp.*

M. *Lychnis sylvestris lanuginosa minor* C. B. *Park.* In fatis intra lucum *Gramuntium* sitis, & in aliis multis Maio mense cum flore reperitur. *Bot. Monsp.* L. hirta minima 6. *Clusii Ger.*

S. *Lychnis omnium minima* ex monte *Argentario Boccon.* In monte *Argentario* inter saxorum rimas & hiatus frequens pullulat.

Lychnis foliis glabris, calyce duriore *Boccon.* in proclivibus circa *Messanam* locis copiosè nascitur.

S. *Lychnis noctiflora minima* flore exiguo *Boccon.* locum non meminit.

Hanc nos variis *Siciliæ* in locis invenimus & *Pseudomelanthium* glabrum *Siculum* denominavimus antequam *Bocconi* Liber editus esset.

M. *Lycium Gallicum J. B.* *Paliurus* alter peregrinus *Ad.* *Lycium latifolium* C. B. *latifolium Monspeliacum Park.* item *Lycium Gallicum Avenionense ejusdem.* *French Fox-thorn.* Cum floribus luteis copiosis Maio mense invenit *P. Magnol* in *Valena* sylva, quâ itur ad pagum *Viols*, & in quibusdam *Vinearum* marginibus ultra *Salenovam* ad lavam.

Lyfimachia lutea in alis foliorum florens *Cæs.* lutea minor *J. B. Ger. Park.* lutea minor, foliis nigris punctis notatis C. B. *The lesser yellow Willow-herb.* In *Alpibus Striacis*.

Lyfimachia lutea flore globoſo *Ger. Park.* bifolia flore globoſo luteo *C. B.* altera lutea *Lobelii*, flore quaſi ſpicata *ſ. B.* Globular Yellow Loose-ſtrife or Willow-herb. In ſoſſis paluſtribus circa *Sevenhuys* in *Hollandia*.

A. *Lyfimachia ſpicata* coerulea *C. B.* coerulea *hortenſis Lob.* coerulea *Ger. emac.* coerulea ſpicata *Park.* *Veronica ſpicata* recta profundè ſerrata, quam *Lyfimachiam* coeruleam quidam vocant *ſ. B.* Ad pedes *Mauritii* & in paluſtribus circa *Weinhoff*, menſ. Jul. & Aug. *Cat. Altd.*

C. *Lyfimachia purpurea* 2. ſive minor *Cluſ.* rubra non ſiliquoſa *C. B.* purpurea *Pannonica ſ. B.* minor rubra ſive purpurea *Park.* purpurea minor *Cluſii Ger. emac.* In humidis *Pannoniæ* pratis & *Danubii* inſulis.

Lyfimachia ſiliquoſa ſpecioſa v. Chamænerion.

Lyfimachia Chamænerion dicta *Alpina C. B. prod.* In *Alpibus Helvetiorum.* Quid à *Chamænerio Geſneri* differat.

M.

M Achaleb. v. *Cerasus ſylveſtris.*

Maiz ſive *Frumentum Indicum Ger. Matz*

Frumentum Indicum vel *Turcicum* vulgare

Park. *Frumentum Indicum Mays* dictum

C. B. *Triticum Indicum ſ. B.* *Matz* or *Indian* or

Turkey-Wheat. Seritur nunc dierum non in *Italia* duntaxat, ſed & in *Germania.*

S. *Malva Betoniciæ* folio *Boccon.* & *Zanon.* In pratis illuſtriſſimæ *Gaëtanæ* gentis, *Terriccio* dictis circa *Piſas* invenit *Paul. Boccon.*

S. *Malva Sicula* foliis moſchatis criſpis *Boccon.* Ad *Agri-gentum* & *Saccam* viget plurima, locis argilloſis.

Z. *Malva altera* repens *Betoniciæ* folio *Zanoni.* In plano *Groſſedæ*, eundo ad montem *Pſcalis* in *Etruria*, & locis vicinis,

Malva

Malva arborea *Park.* *f. B.* arborea, Veneta dicta, parvo flore *C. B.* *maritima* arborea, Veneta dicta, parvo flore *Morif.* Itinere à Pisis ad portum Liburnum observavit Camerarius. Alii in litore Veneto, inque Tyrrheno & Africano nasci tradunt.

Marrubium album fatuum *P. Castelli* in Catalogo plantarum spontanearum Horti Medici Messanensis. An *Marrubium album peregrinum* brevibus & obtusis foliis *C. B.* In glareosis ad mare non longè à Messana. Hæc planta à nonnullis credita est *Pseudodictamnus* alter *Ponæ*, verùm non respondent acetabula quæ *Moluccæ* similia esse dicit.

Marrubium album angustifolium peregrinum *C. B.* *Creticum* *Ger. Park.* album angustiore folio *f. B.* Ad vias & agrorum margines propè Viennam Austriæ. Nec figura, nec descriptio *Marrubii* alterius *Pannonici* *Clus.* huic plantæ tam bene convenit, quàm *Marrubii* *Cretici*, eandem tamen speciem esse suspicor.

Marrubium nigrum longifolium *C. B.* *V.* *Herba venti Monspelienfium.*

M. Marrubium album villosum *C. B. Prod.* In insula Magallona invenit *D. Magnol.*

M. Marrubium palustre hirsutum tenuius laciniatum *C. B.* In pratis & humidis fossis juxta sylvulam antri Frontignanensis viâ Miravallis plurimum oritur. *Bot. Monsp.*

Martagon Chymistarum *Lob.* *Lilium aureum* *Ger.* purpureo-croceum majus *C. B.* rubens vel croceum majus *f. B.* *The Fox-Lilly.* In sylvis supra Neapolin prope Camaldulensium coenobium.

Martagon v. *Lilium* floribus reflexis.

Medica major erectior floribus purpurascens *f. B.* *Trifolium siliqua cornuta* sive *Medica* *C. B.* *Trifolium Burgundiacum* *Ger.* *Fœnum Burgundiacum* sive *Medica legitima* *Park.* *Burgundy Trefoil* or *Wesdick fodder*, nonnullis *Lucern.* Circa Genevam & Avenionem in agris satum vidimus.

Medica Scutellata *f. B.* *Trifolium cochleatum* *Ger.* *cochleatum fructu latiore* *C. B.* *Snail-Trefoil* or *Hodmandodg.* Ad agrorum margines prope Liburnum; *Monspelii* etiam inter segetes passim vere flo-

rens. Folia hujus macula in medio fordidè flavicante interdum notantur. Fructûs magnitudine, lævori, & figurâ cochleæ terrestris æmula ab omnibus hujus generis mihi hætenus cognitis facile distinguitur.

Medica orbiculata *J. B.* Trifolium cochleatum vel scutellatum, fructu latiore, folio minuto obtuso *C. B.* *Crundle-trefoil.* Fructu est glabro, rotulæ simili, per margines nonnihil undulato seu crispo. In insula ad Promont. Pachynum & alibi in Sicilia. Monspelii etiam frequens est in satis & satorum marginibus. Aliam describit speciem seu varietatem Morisonus fructu minore per margines æquali & non sinuato. Magnol quoque duplicem differentiam observavit, unam foliis minutis & obtusis, aliam multò majoribus.

Medica orbiculata polycarpus fructu minore. Hæc in communi pediculo oblongo flores, eisque succedentes fructus quinque vel sex gerit, cum præcedens duos tantum. Sunt autem fructus duplo quàm illius minores, per margines æquales, & maturitate nigri. Circa Messanam in Sicilia observavimus.

Medica orbiculata *Νύγερον*, fructu compresso circum oras rugoso, per maturitatem albo. In Sicilia prope Promontoriolum *Punto Cerciolo* dictum non longè à castro *Puzalla* collegimus.

Medica orbiculata minor spinosa, simplici majore voluta. Circa Messanam Siciliae observavimus. Descriptionem videfis in *Hist. nost.* p. 962. Fructus tres quatuorve in eodem pediculo.

Medica doliata *πλύγερον* minor lævis. *Medica doliata* minor lenis *Park.* *Tun-Trefoil.* Fructus doliæ figurâ, per maturitatem nigri, plures simul in eodem communi pediculo. In Italia & Sicilia invenimus.

Medica Catalonica elegans *Morgani.* Fructus figuræ doliæ est, & tuberculis undique scaber, similis ligno illi quo brachia manûsque muniunt Itali in pilæ lusu. Inter plantas nostras siccas in Italiâ collectas & hæc invenimus.

Medicæ majoris Bæticæ spinosæ species altera *Ger. emac.* An *Medica magna turbinata* *J. B.* ? *Hedgchogs.* Fructus magnitudine & hirsutiei, spinulis crebris rigidis,

dis, & seminis colore spadiceo ab aliis omnibus nobis cognitis Medicæ speciebus discretu facilis est.

Medica marina Park. Medicæ marinæ spinosæ species *Ger.* Trifolium cochleatum maritimum spinosum *C. B.* Trifolium cochleatum marinum five *Medica marina J. B.* Ad littora maris Mediterranei passim.

Medica ciliaris Guilandini. Hanc in Alpibus invenimus. Fructus orbiculum aut rotulam imitatur, habetque in circumferentia molles & oblongas spinulas seu setas ciliorum æmulas. Hæc & præcedens perennes plantæ sunt.

Medica spinosa Σινάση ♂ fructu ovali duro, spinis brevioribus & rigidioribus. Semina flavicant. Descriptionem vide in *Hist. nost.* p. 963. Circa Messanam collegimus.

Medica ciliaris annua nobis. Trifolium fructu cochleato ciliare *Bot. Monsp.* Hanc etiam in Sicilia collegimus: *D. Magnol* in plurimis satorum marginibus circa Monspelium observavit.

A. Medica capsulis echinatis pallidis minoribus Cat. Altd. echinata hirsuta *J. B.* Circa Hilpoltstein Norimbergens. & ad arcem *Reicheneck v. Cat. Altd.*

Medica doliata spinosa πολύκαση ♂ *Park.* Θόρνυ ορ πρίκλϋ *Tun=Cresfol.* In arenosis maris litoribus propè Messanam & alibi tum in Sicilia, tum etiam in Italia. Describitur *Hist. nost.* p. 964.

Medica echinata oblongo fructu, seu doliaris spinis rarioribus fructui appressis. Hanc etiam in Sicilia collegimus. Descriptionem *v. Hist. nost.* p. 963.

Medica coronata seu orbiculis laxis echinatis minoribus, non extantibus spinulis. An *Medica coronata Cherali parva J. B.* Circa Messanam invenimus.

Mira est in hoc genere specierum varietas: nos etiam plures collegimus quàm meminimus, & plures adhuc proculdubio locis in quibus peregrinati sumus nobis inobservatæ restabant.

Melampyrum multis five *Triticum vaccinum J. B.* *Mel.* purpurascente comâ *C. B.* purpureum *Ger.* *Cratægonon* flore vario *Park.* ejusdemque *Melampyrum. Common Cow=Wheat.* Inter segetes per Germaniam & Galliam frequentissimum.

Melampyrum coeruleâ comâ C. B. coeruleum Ger. Melampyro affinis Parietaria coerulea quorundam J. B. Crataegonon flore vario Park. Blue-flower'd Cow-wheat. In sylvis montosis non longè à Gratianopoli, quâ inde ad max. Carthusianorum coenobium itur.

B. Melampyrum luteum angustifolium C. B. quod pro Melampyro luteo Linariæ folio in Prodro mo describitur. In Muteto monte & Wasserfal. Cat. Bas.

Melampyrum perpusillum luteum v. Ranunculus ceratophyllos, &c.

Melanthium v. Nigella.

Melica five Sorgum Dod. Ger. Park. Sorghi J. B. Milium arundinaceum tubrotundo semine, Sorgo nominatum C. B. In Foro Julii ad panificia seritur: estque haud dubie Milium illud quod suo tempore ex India in Italiam invectum scripsit Plinius, nigrum colore, amplum grano, harundineum culmo, quoddque adolefcit ad pedes altitudine septem prægrandes.

E paniculis hujus à granis repurgatis Scopulas efficiunt ad mundandas vestes aliósq; ulus, cujusmodi Venetiis venales vidimus.

Melilotus major candida Trag. Germanica Ger. flore albo Park. Great White-flowered Melilot. Hæc revera specie differt à vulgari lutea, quantumvis C. B. qui aliàs non parvus esse solet in distinguendis speciebus, eandem faciat.

H. Melilotus corniculis reflexis major C. B. Syriaca Park. Syriaca odora Ger. Trifolium Italicum seu Melilotus Italica corniculis recurvis J. B. Cat. Holl. Commel.

Melilotus nova Berardi seu erecta folliculis rotundis minor Hist. nost. pag. 951. In montosis pratis Delphinatús Galliæ.

Melilotus Messanensis procumbens, folliculis rugosis sublongis, spicis florum brevioribus. In loco humido in lingula illa inter portum Messanensem & fretum Siculum.

M. Melilotus angustifolia repens folliculis rotundis C. B. Palmarem invenimus in saxosis la Colombiere primo vere, aliquando verò majorem. Rectè representatur à figura

- figura quam habet *J. Baubinus* nomine Meliloto vulgari affinis folio minore & rotundiore. *Magn.*
- Melissa sylvestris* hirsutior minus odorata. *Melissophylli sylvestris* genus *Matthiolo*. In sepibus prope Liburnum & Salernum copiosè. Hæc est, ut puto, quam *J. Baubinus* memorat *Hist. lib. 28. cap. 42.* his verbis. Habemus nos quandam *Melissam nigri orem* & hirsutiorẽ, à nemine memoratam. Hic *Matthiolus* injustè, ut aliàs, arguitur à Botanicis, quasi ex una planta [*Melissa vulgari*] duas faceret.
- E. *Mentastrum montanum* 1. *Clusii Ger. emac.* montanum sive *Pannonicum Park.* montanum, folio coloris viridis *J. B.* *Mentha montana verticillata C. B.* In *Ungaria* ad radices scopuli in quo extructa est arx *Nemethwywar* : & ad *Austriacarum Alpium* radices in pratis *Monasterio S. Crucis* vicinis. *Clus.*
- B. *Mentha rotundifolia palustris* minor seu flore globofo *C. B.* *Mentastrum rotundifolium* minus *Park.* In scrobibus humentibus & riguis secus fossas aquarum.
- B. *Mentha cartaria minor Alpina C. B. prod. Park.* In montibus circa *Neapolin* *Italiæ.* *Imper.*
- Mespilus J. B.* *Sativa Ger. vulgaris* sive minor *Park.* *Germania* folio *Laurino* non serrato *C. B.* *Common Medlar.* In sepibus non procul *Viterbo* *Etruriæ* urbe.
- Mespilus Aronia Ger. Aronia Veterum J. B.* *Aronia* sive *Neapolitana Park.* *Apii* folio laciniato *C. B.* In *sylva Valena* sponte oritur. v. *Bot. Monsp.*
- Meum alterum Italicum* quibusdam *J. B.* alterum *Italicum Ger. Spurium Italicum Park.* latifolium adulterinum *C. B.* *Wastard Italian Spiguel or Meu.* In collibus & clivis maritimis *Regni Neapolitani.*
- Mezereon Germanicum* an *Chamædaphne Diolcoridis Lob.* *Laureola* folio deciduo, flore purpureo *C. B.* *Laur. fol. dec.* sive *Mezereon Germanicum J. B.* *Chamælaea Germanica* sive *Mezereon Ger. Cham. Ger.* sive *Mezereon vulgò Park.* In montosis *Germaniæ* passim reperitur : & in collibus & montibus circa *Genevam.*
- Milium Arundinaceum C. B. v. Melica.*

Milium semine luteo vel albo **C. B.** **Common Millet.**
In transmarinis ubique fere seritur.

A. Milium semine nigro **C. B.** **nigrum** *Tab. Cam.* Milii alterum genus colore nigro deterius *Cesl.* Non est præcedentis vitium sed species diversa. Seritur circa Norimbergam & Lauffam M. Aprili, colligiturque Augusto. *Cat. Altd.*

C. Millefolium Alpinum incanum carneo flore **C. B.** Alpinum Clusii, parvum, nonnihil incanum, carneum *J. B. Alp.* incanum *Park.* Alpinum *Clus.* In Judenberg & Spittal Stiria Alpibus, Augusto.

J. B. Millefolium Alpinum incanum flore specioso *J. B.* In Valleis montibus legit Platerus.

Millefolio Alpino affinis planta, quibusdam Iva moschata *J. B.* Tanacetum Alpinum **C. B.** *Park.* Iva moschata Rhæti, Tanaceto cognata herbula *Gesn. hort.* In Rhætorum Alpibus.

Millefolium nobile *Trag.* Achillea, five Millefolium nobile *Ger.* Achillea Sideritis, five nobilis odorata *Park.* Achillea millefolia odorata *J. B.* In Germania ad Rhenum, Gallia Narbonensi circa Monspelim, & in Italia passim.

Millefolium luteum *Ger. Park.* tomentosum luteum *J. B.* **C. B.** **Yellow Milfoil, or Parrow.** Circa Avenionem, & juxta viam quæ Auriaco Avenionem ducit: ubi & Clusio observatum *Hitt. lib. 3. cap. 37.*

M. Millefolium odoratum minus Monspeliensium *Hort. Reg. Blas.* Multo minus est quàm vulgare; foliis canescentibus, odoremque habet suavem & aromaticum. Plurimis in locis herbidis repit, ut prope pontem Villæ novæ & alibi *Bot. Monsp.*

B. Millefolium aquaticum *Ger.* aquaticum vulgatus *Park.* aquaticum umbellatum capillaceo brevique folio **C. B.** aquaticum Fœniculo simile umbelliferum *J. B.* **Cufted Water-Milfoil.** In *Michelfelden* prope Basileam. *Cat. Bas.* Apud paludes circa fossas Padue *J. E. v. Cat. Holl. Comme!*

B. A. Millefolium aquaticum cornutum majus C. B. *prod.*
Circa Hiltelingen propè Basileam *Cat. Bas.* In pisci-
nis cœnobii S. Catharinæ Norimbergæ, & in fossa
oppidana ad arcem. *Cat. Altd.*

B. Millefolium aquaticum cornutum minus, nondum
descriptum C. B. Michelfeldæ in aquarum fundo
Cat. Bas.

Mollugo montana latifolia ramosa C. B. Gallium five
Mollugo montana *Ger.* Gallium flore albo majus five
Mollugo montana *Park.* Rubia sylvatica lævis J. B.
In sylvis, agro Luceburgensi & Aquisgranensi.

Moly moschatum capillaceo folio C. B. moschatum vel
Zibertinum Monspelienſe *Park.* Allium sylv. perpu-
sillum juncifolium moschatum *Park.* In collibus *Gar-
rigues* dictis propè Monspelium & Sellam novam.

Moly parvum caule triangulo C. B. caule & foliis trian-
gularibus *Park.* Primò inter Lericium & Lucam, de-
inde circa Baias copiosum invenimus.

M. Moly Dioscoridis parvum quibusdam J. B. Moly an-
gustifolium umbellatum C. B. Moly Dioscorideum
Park. Ger. *Dioscorides* his *Moly*, or *Mountain
Garlick*. Juxta sepes umbrosas prope Frontignanam,
viâ qua itur *Balleric* Maio mente cum flore collegit P.
Magnol. Gadibus Hispaniæ in veteri urbe invenit
Cluius.

Moly minus roseo amplo flore v. Allium.

Col. Moly humile folio gramineo C. B. Chiamamoly, an
Moly Dioscoridis *Col.* Cirinolæ per semitas & agros
non procul ab oppido, Januario.

S. Moly flore subviridi *Bocc.* In montis Madonix con-
vallibus copiosum occurrit. Gaudet opacis sylvis &
locis umbrosis.

Monophyllon *Ger.* Mon. five Unifolium *Park.* Mon. recen-
tiorum *Lob.* Mon. five Lilium convallium minus C. B.
Unifolium five Ophris unifolia J. B. *One-blade*. Pri-
mò in luco quodam juxta Hagam Comitum Hollan-
diæ se nobis obtulit: deinde in omnibus ferè editio-
ribus Belgii & Germaniæ sylvis & dumetis.

Morus alba *Ger.* J. B. *Park.* fructu albo C. B. *The
White Mulberry*. In Sicilia, Italia & Gallia Nar-
bonensi

bonensi copiosissimè feritur, ad bombyces alendos :
Sunt enim folia ejus teneriora & vermiculis hisce gra-
tiora quam nigra.

Morus nigra *Park. J. B.* fructu nigro *C. B.* Morus *Ger.*
The black Mulberry-tree. Cum priore. Morus urba-
narum novissima germinat, nec nisi exacto frigore,
ob id dicta sapientissima arborum. *Plin.*

Muscus denticulatus *Ger.* denticulatus major *C. B. Park.*
terrestris denticulatus *Lob.* pulcher parvus repens
J. B. Toothed Moss the greater. In aggeribus hu-
midis & umbrosis in Italia & parte Meridionali Ger-
maniae.

Muscus maximus ceratoides maritimus *Triumfetti.* In
portu apud Centum cellas nunc *Civita vecchia.*

Muscus capillaceus longissimus i. e. Muscus arboreus 2.
C. B. Hunc longissimis capillaceis filamentis dense
stipatis ex Abietibus dependentem in Germaniae qui-
busdam sylvis copiosissimum vidimus & collegimus.
Chartas in quibus composita est, etiam subinde mu-
tatas, post 20 adhuc annos colore flavo ad rufum
tendente, ac si ustulatae essent, tingit.

M. Muscus fugax membranaceus pinguis *Magnol. Bot.*
Monsp. Statim post pluvias oritur muscus iste in her-
bidis satorum marginibus, iis praecipue quae orientem
solem spectant, sed citò exsiccat. Dum expanditur
Muscum Lactuae folio refert.

B. Muttellina *J. B.* Meum Alpinum umbella purpura-
scente *C. B.* Alpinum Germanicum Muttellino dictum
Park. In monte Rhætio prope Burmium *J. B.*

M. Myagrū monospermum minus *C. B. Park.* Myagro
similis flore albo *J. B.* Aprili & Maio mensibus repe-
ritur juxta fluvium *Vistie,* circa *Candiac. Bot. Monsp.*
Inter Bononiam & Florentiam *J. B.*

P. Myagrū foetidum *C. B. prod. Cat. Bas.* In arenosis
ad pontem Wiesel.

Myagro affinis herba capitulis rotundis *J. B.* Myagro
similis filiqua rotunda *C. B. Park.* Circa Monspeli-
um passim in satis reperitur, Maio & Junio mensi-
bus cum flore & capitulis. *Bot. Monsp.* Reperitur
etiam circa Altdorfium. *v. Cat. Altd.*

Myrica

Myrica sylv. altera *Clus.* *Tamariscus* folio latiore *Park.* Germanica *Ger.* *Tamarix* fruticosa folio crassiore five Germanica *C. B.* Germanica five minor fruticosa *J. B.* ~~Shrub=Tamarisk.~~ Ad ripas fluviorum v. g. circa Augustam Vindelicorum, Lindaviam, Genevam.

Myrica prima *Clus.* *Tamariscus* folio tenuiore *Park.* Narbonensis *Ger.* *Tamarix* altera folio tenuiore, five Gallica *C. B.* major five arborea Narbonensis *J. B.* ~~Tree Tamarisk.~~ Ad mare prope Monspelium copiosè.

A. *Myrrhis* sylvestris foliis maculatis, *Cicutaria* dicta *Fungerm.* *Cat. Altd.* An minor *C. B.*? altera minor *Park.*? altera parva *Lob. Ger.* In pratis circa Altdorfium m. Junio.

A. *Myrrhis* palustris *Hercynica Fungerm. Cat. Altd.* Broccenbergensis *Thal.* Foliis est fere *Apii*, membranaceâ vaginâ amplexicaulibus, flosculisque ejus candidis in umbella dispositis; semina oblonga canaliculata succedunt. Circa Altdorfium. Loca *vid. in Catal. Altd.*

Myrtus communis Italica *C. B.* An *Myrtus* fructu albo *Ger.* *Myrtus* vulgaris nigra & alba, sativa & sylvestris *J. B.* In Italia & Gallo-provincia ad mare inferum frequentissima, necnon in Sicilia. ~~The common Italian Myrtle.~~

Beilinius refert Illyricos Myrti foliis coria perficere, quemadmodum Macedones Rhoe, Ægyptios Acaciæ filiquis, Asiæ minoris incolas glandium Æsculi calycibus, Gallos Quercûs libro, Phryges sylvestris Pini corticibus. *Clus. hist. lib. 1. cap.*

N.

NAPUS sativa *C. B. Park.* Napus *J. B.*
 Bunias five Napus *Ad. Ger.* ~~Pavew~~-gentle.
 Circa Monspelim copiosè feritur : spontaneam etiam in satis sapius *D. Magnol.*

Narcissus medio-luteus Lob. Ger. medio-luteus copioso flore, odore gravi *C. B.* multos ferens flores medio-luteus Narbonensis *J. B.* Itinere à Lericio ad Massam, indeque ad Lucam copiosè. In pratis prope Monspelim nihil hoc frequentius videre est Martio & Aprili mensibus cum flore.

M. Narcissus albus magno odore flore, circulo pallido C. B. medio-purpureus magno flore, folio latiore J. B. latif. 7. Clus. In pratis Lateræ copiosè provenit, & paulò seriùs florèt quàm medio-luteus *Bot. Monsp.*

C. Narcissus niveus odoratus circulo rubello C. B. medio-purpureus minor J. B. latifolius 6. Clus. medio-purpureus stellaris *Park.* Magno milliari supra Ganingam Carthusianorum cœnobium, in pratis quibuldam altissimo lacui vicinis.

M. Narcissus albus circulo purpureo C. B. medio-purpureus J. B. Ger. medio-purpureus serotinus *Park.* Cum priore permixtus in pratis Lateræ reperitur. *Bot. Monsp.*

M. Narcissus albus circulo purpureo C. B. medio-purpureus J. B. Ger. medio-purpureus serotinus *Park.* Cum priore permixtus in pratis Lateræ reperitur. *Bot. Monsp.*

M. Narcissus albus circulo croceo polyanthos C. B. medio-croceus serotinus cum aliquot floribus J. B. mediocroceus polyanthos Park. In pratis quibusdam ad dextram *Ladi* amnis Monspeliaci, in loco dicto *en grammet*, elegantissimis floribus statim distinguitur. *Bot. Monsp.*

M. Narcissus medio-luteus foliis florum longioribus circulo patulo Bot. Monsp. an medio-luteus majoribus floribus

- floribus *C. B.* ? an potius *Narc. Narbonensis* major amplo flore *Park*? Aliis permixtus flore facile distinguitur.
- M. Narcissus angustifolius albus minor C. B. prod.* In sterilibus collibus circa montem Lupi, & in monte Cetio Aprili mense cum flore invenit *D. Magnol.*
- M. Narcissus juncifolius minor Clus. juncifolius luteus luteus minor C. B. juncifolius flore luteo J. B. juncifolius serotinus Ger.* In collibus plurimis circa Monspelium primo vere floret. Jam nē quis miretur tot *Narcissorum* species à *D. Magnol.* circa Monspelium observatas, à nobis autem nē unam quidem, sciat nos non ante Augustum medium, cū *Narcissi* omnes jam defloruerant, Monspelium accessisse, indēque ante exactam hyemem, mense sci. Februario discessisse.
- Nardus Celtica J. B. Ger. Celtica Dioscoridis C. B. Alpina Clus. Spica Celtica Park.* In summo Judenberg *Stiriacarum Alpium* jugo inter muscum saxosis locis copiosè: inque *Genuensibus* & *Liguria Alpibus*.
- C. Nardus montana radice olivari C. B. montana Clus. Ger. montana tuberosa Park.* Neapoli è monte Virgineo erutam ad Clusium misit *Fer. Imperatus.*
- B. Nardo Celticae similis inodora C. B. prod.* In monte Baldo, & *Alpibus Sumano* conterminis *C. B.* In monte *Drawenstein Austriae. Burser.*
- Natrix Plinii v. Anonis lutea major.*
- Nasturtialum supinum tenuissimè divisum J. B. C. B. Cardamine Alpina Ger. Alpina 3. minima Clus. Alpina minor Park.* In summis jugis montium *Juræ* & *Salevæ* prope *Genevam*, locis humidioribus.
- M. Nasturtium pratense parvo flore C. B. Cardamine minor laciniatis foliis Park.* In pratulo luci *Gramuntii* ubi *Gratiola* crescit semel tantum invenit *P. Magnol.* Circa *Montbelgardum* locis humidioribus.
- M. Nasturtium pumilum vernal C. B.* In vineis & saxosis locis supra *Boutonetum*, circa *Momman, la Colombiere* & alibi Februario, Martio, & Aprili mensibus copiosè floret
- M. Nasturtium pumilum supinum vernal Bot. Monsp.* ubi descriptionem & figuram vide. In humidis versùs *Lateram* & *Perauls.* Nasturtium

Nasturtium minimum vernum *Bot. Monsp.* nobis quidem idem videtur *Bursæ pastoris* minori seu *Nasturtio petræo* *Tab.*

Nasturtium montanum *Asari folio* *Boccon.* *Alpinum palustre rotundifolium* *Zanoni.* Circa fontes & rivulorum margines montis *Bargæ* in Etruria copiosè nascitur. *Boccon.* Loco aperto ubi pascuntur pecora in territorio Mutinensi, prope fontem jugem aquæ limpidae & frigidissimæ, ab indigenis pastoribus *Baccara* dictum.

B. *Nasturtium Alpinum minus* *Resedæ foliis* C. B. *Cardamine Alpina minor* *Resedæ foliis* C. B. In *Rhætorum* Alpibus *Julio* : in *Helvetiorum* Alpibus & *Pyrenæis* minus habetur.

B. *Nasturtium Alpinum capsulâ Nasturtii horrensis* C. B. *Park.* caps. *Nasturtii vulgaris* J. *Bauhini* J. B. In *Rhœtiæ* monte *Nombre* prope balneum *Wurmbes.*

B. *Nasturtium Alpinum Bellidis folio* majus C. B. *Park.* Circa *Fabarias* thermas ad aquæ defluxum.

B. *Nasturtium foliis Barbareæ* C. B. *Park.* In finibus *Bohemie* versus *Austrum.*

Nerium v. *Oleander* : *Alpinum* v. *Medon.*

Nigella arvensis *Park.* *arvensis cornuta* C. B. *Melanthium sylvestre* *Lob. Ger. sylv.* five *arvense* J. B. *Steld* *fennel-flower,* or *Nigella.* Per *Germaniam,* *Itali-* am, & *Galliam* *Narbonensem* inter segetes.

Nymphæa alba minor C. B. J. B. *Lob. Ger. Park.* item.

Nymphæa lutea minor eorundem. Utamque invenio in *Cat. Holl. Commel.* Priorem in *Catal. Monsp. Magnoli,* inque *Cat. Altdorfinarum.* Harum descriptiones accuratiores petimus ab *avroqais.*

O. *Ocymastrum*

O.

O Cymastrum Valerianthos v. Valeriana.
 Ocymoides repens v. Saponaria minor.
 Col. Ocimoides Lychnitis reptante radice
J. B. Lychnitis *Col.* Lychnis incana repens
C. B. In monte D. Mariæ Virginis appellato foci
 humentibus petrosis.

Ochrus five Ervilia *Dod. Lob. Ger.* Och. five Ervilia flore
 fructusque albo *Park.* folio integro capreolos emittente
C. B. Lathyri species, quæ Ervilia sylvestris *Dodonæo*
J. B. Inter segetes prope Liburnum portum in E-
 truria. Reperitur etiam circa Monspelium in satis.
Bot. Monsp.

Oenanthe Apii folio *C. B.* Filipendula angustifolia *Ger.*
 Oen. five Filipendula Monspessulana Apii folio *J. B.*
 Oenanthe Apii folio major *Park.* ~~Water Dropwort~~
 with Smallage Leaves. Florentem Monspelio inter
 locum & Perauls reperit *J. B. & Lobelius* prope pon-
 tem Cellæ novæ & Magallonæ inter Narcissos, atque
 circa Gramuntiam sylvain.

Olea sativa *J. B. C. B. Ger. Park.* The Olive-tree.
 In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi copiosissime.
 Qui perticis olivas decutiunt, id faciunt cum injuria
 arborum, sequentis anni damno. *Plin. lib. 15. cap. 3.*

Oleander flore rubro *Park.* Nerium five Oleander *Ger.*
 Nerium five Rhododendron *J. B.* Nerion floribus
 rubescentibus *C. B.* Oleander, or Rose-bay. In
 Sicilia ad aquarum rivulos in ascensu montis Ætnæ.

Oleander foetidus fruticosus major Creticus *Zanoni.* Va-
 leriana pumila supina serpyllifolia *Cat. Exor.* In rupi-
 bus maritimis prope Scaleam in Regno Neapolitano.
 Otenfa mihi postea fuit hæc planta sicca à *Joan.*
Maria Ferro Pharmacopœo Venetiano, Botanico in-
 signi, sub titulo *Periclymeni supini pumili.* Verum nec
 Valeriana est, neque Periclymenum.

C. Onobrychis quibusdam subcœruleo flore *J. B.* flori-
 bus Viciæ dilute cœruleis *C. B.* floribus cœruleis *Park.*

2. Clusii *Ger.* Infra Viennam, viâ publicâ, inter *Schwecker & Gotstorf*, item non procul à Znaim Moraviae oppido.

C. *Onobrychis spicata* floribus pallidis, nigris maculis notatis C. B. quibusdam, flore pallido, vel *Polygalon* *J. B.* 3. Clusii flore pallidiore *Ger.* foliis *Viciae* longioribus *Park.* Ad Hamburgum urbem, 2 supra *Posonium* mill. & ad oppidum *Fischmuntz* ad flumen *Fischam* situm paulo supra quàm in *Danubium* se exoneret, publicâ viâ.

B. *Onobrychis clypeata* laevis C. B. *prod. Park.* Alpibus *Helvericis*, ut monte *Fracto*, & ad *Thermas Fabarias*.

B. *Onobrychis incana* C. B. *prod.* In *Provincia Galliae*.

Onobrychis spicata flore purpureo *Park.* C. B. flore purpureo *Ger.* quibusdam flore purpureo *J. B.* In loco quodam glareoso non longè à *Vienna Austriae*.

Onobrychis vulgaris minor *Park.* fructu echinato minor C. B. Caput gallinaceum minus *Idem prod. The lesser Cocks-head-Wetch.* Ad radices *Vesuvii* montis & in insula saepius memorata ad *Promont. Siciliae* *Pachynum* dictum. Flos hujus purpureus est, totâque planta minor quàm vulgaris *Onobrychis*, fructus tamen echinatus major.

Onobrychis arvensis v. *Speculum Veneris*.

Semine clypeato aspero C. B. v. *Hedysarum clypeatum*.

Opuntia marina *Park.* *Scutellaria* sive *Opuntia marina* *J. B.* *Lichen marinus rotundifolius* *Ger.* *Fucus* folio rotundo C. B. *Sertolara Imperati.* In maris litora ejectam collegimus ad *Punto Cerciolo* non longè à *Castello Puzallu* in *Sicilia*.

M. *Orchis anthropophora* altera *Col.* *anthropophora oreades mas* *Park.* flore nudi hominis effigiem representans mas C. B. Floret *Aprili* mense in herbidis locis circa *Cannelle* & aliis, rarò tamen invenitur. *Bot. Monsp. App.* In *Aspensium* collibus umbrosis reperit *Columna*, necnon ad *Vesuvii* montis radices, *Vid. etiam Cat. Altd.*

† *Orchis galea* & alis fere cinereis *J. B.* *Cynosorchis latifolia* hiantе cucullo minor C. B. *Cynosorchis altera* *Dod.*

Dod. de floribus, ubi bona ejus habetur descriptio. Cyn. major altera *Ger.* latifolia minor *Park.* *Man-Dichies.* Circa Genevam ad agrorum margines Aprilis & Maio mensibus floret. Huic, ni magnitudo obstaret, Orchidem Zoophorum Cercopithecum referentem oreadem *Col.* eandem dicerem.

† Orchis anthropophora flore fusco seu ferrugineo *nobis.* anthropophora oreades *Col.* anthropophora oreades femina *Park.* flore nudi hominis effigiem repræsentans femina *C.B.* *Man-Dichies, with a dusky-flower.* In marginibus agrorum quorundam prope ripas Rhodani non procul à Geneva.

Orchis macrophyllus Columnæ *Park.* Orchis five Testiculus maximo flore *J. B.* montana Italica flore ferrugineo, linguâ oblongâ *C. B.* Per totam fere Italiam ad mare inferum: vidimus enim Massæ, Liburni, Neapoli in pascuis ficcioribus. Reperitur etiam circa Monspelium. *v. Bot. Monsp. App.*

Orchis magna, latis foliis, galea fusca vel nigricante *J. B.* Ad latera montis Salevæ prope Genevam. Thyrsus florum speciosus est.

Orchis strateumatica minor *Ger. J. B.* Cynoforchis militaris minor *C. B. Park.* In pascuis ad latera montis Salevæ.

Orchis rotunda Dalechampii *J. B.* Cynoforchis capitulo globoso *Park.* Cyn. globoso flore *C. B.* Round-headed *Dichies.* In summitatibus montis Juræ.

Orchis palmata minor odoratissima purpurea five nigra *J. B.* palmata 21. seu Alpina angustifolia nigro flore *C. B.* palmata angustifolia minor odoratissima *Park.* In herbidis jugis & pascuis montium Juræ & Salevæ prope Genevam copiosè.

Orchis foetida 3. seu odore hirci minor *C. B.* Tragorchis femina *Ger.* minor & verior *Park.* minor flore fuliginoso *J. B.* Small Goats-stones with a dusky flower. In pascuis quibusdam non longè à Geneva.

C. Orchis bifolia latissima *C. B.* Serapias bifolia latissima *Park.* 1. amplissimis foliis *Clus.* In declivitate montis cui inædificata est arx Greben, inter Savum & Dravum amne, binis ultra Warasdinum milliariibus.

- C. Orchis strateumatica** *Ger.* strateumatica major *J. B.* militaris seu strateumat. major *Park.* latifolia altera *Clus.* Cynosorchis militaris major *C. B.* In sylvis Nemethwywar oppido vicinis, & in Leytano saltu supra Manderstorf *Clus.* In sylvula Flotidæ vallis uberior ejus proventus *J. B.* In Muteto *C. B. Cat. Bas.*
- C. Orchis Pan ionica** 3. *Clus.* obscure purpurea odorata *C. B.* In pratis Nemethwywar vicinis supra Rabam & inter flumina Muram & Dravum.
- Orchis Pannonica** 5. *Clus.* cui similem in pratis urbi Londinensi proximis se observasse scribit Clusius, quænam planta sit me nescire fateor; aliquando pro Orchide nostra purpurea, spica congesta pyramidalis eam habui; verum nec descriptio, neque icon conveniunt. In pratis Viennæ vicinis passim oritur. Examine alii.
- C. Orchis palmata** Sambuci odore *C. B.* palmata, five Orchis Pannonica floribus exalbidis *J. B.* palmata Pannonica Clusii *Park.* palmata Pannonica 8. Clusii *Ger. emac.* In Leytano saltu supra Manderstorf, aliisque Austriæ inferioris sylvis, & editioribus quibuldam pratis Viennensi saltui proximis.
- B. pr. Orchis pumila** seu Chamæorchis Alpina folio gramineo *C. B. prod.* In monte Helvetiorum Gothardo copiose & acervatim, Junio.
- Col. Orchis Zoophora** Cercopithecum referens oreades *Col. Park.* flore Simiam referens *C. B.* In Equicollorum montibus, Maio.
- Col. Orchis macrophylla** *Col.* montana Italia linguâ oblongâ altera *C. B.* macrophyllos Columnæ *Park.*
- M. Orchis major** flore dilutè purpurascente five incarnato *Cam.* Cynosorchis latifolia spicâ compactâ. *C. B. Park.* Orchis seu Cynosorchis tertius Dodonæi, Lobelio major alter *J. B.* In herbidis locis Valenæ sylvæ viâ quâ itur ad pagum *Viols* Maio men. copiose florentem collegit *D. Magnol.*
- M. Orchis myodes** lutea *J. B. Ger.* muscam referens lutea *C. B.* myodes lutea Narbonensis *Lob. Park. Pelt. low fity=Orchis.* Variis in locis circa Salenovam, seu *Tarral* & pontem Castri novi invenit *D. Magnol.*

B. Orchis

- B. *Orchis mas latifolia Fuch.* *Cynosorchis latifolia* hianthe cucullo major *C. B.* Locis herbidis ad Birsam *C. Basil.*
- B. *Orchis seu Cynosorchis* hianthe cucullo angustifolia *C. B.* in *Prodromo* descripta. In montis Muteti pratis.
- B. *Orchis seu Cynosorchis militaris pratensis* elatior floribus variegatis *C. B. prod.* In pratis Michelfeldensibus & trans Rhenum.
- B. *M. Orchis muscam referens major C. B. myodes* flore grandiusculo *C. B. myodes major Park.* In monte Muteto. *D. Magnol* in pratis inter pontem Castri novi & lucum Gramuntium sitis, & in aliis pluribus herbidis locis oriri & Maio florere scribit.
- B. *Triorchis lutea* folio glabro *C. B. lutea Lob.* In colle circa Birsicam arcem.
- B. *Triorchis lutea altera C. B. Orchis minor* Leodien-
sis *Loh.* In monte *Wasserfall.*
- B. *Orchis minor radice repente seu Pseudo-orchis C. B.*
J. B. minor radice repente Cam. Park. Palma Christi radice repente *Ger.* In monte *Wasserfall*, inque um-
brosis & humidioribus Mauritanii versus Hispruccum
Cat. Altd.
- B. *Orchis palmata angustifolia major C. B. prod.* Michel-
feldæ in pratis.
- B. *Orchis palmata angustifolia minor C. B.* In pratis
Mutetæ.
- B. *Orchis palmata angustifolia minor odoratissima C. B.*
In pratis Michelfeldensibus Autumno floret.
- B. *Orchis palmata montana maxima C. B. prod.* In Mu-
teto monte & vicinis.
- A. *Orchis seu Cynosorchis montana* flore albo verna
Jungern. Cat. Altd. Maio & Junio in pratis monto-
sis circa *Hengen. Cat. Altd.*
- Oreoselinum v. Apium montanum nigrum.*
- M. *Origanum Monspeliense pulchrum Camerarii J. B.*
folio subrotundo *C. B. onites* Galloprovinciæ minus
Ad. Circa pontem Castri novi, & alibi in viarum &
vinearum marginibus. *Bor. Monsp.*
- C. *Ornithogalum spicatum* flore viridi lactescente *C. B.*
Pannonicum flore albo *Clus.* *Pannonicum Ger. Park.*
Creticum & Pannonicum flore albo *J. B.*

- C. *Ornithogalum Neapolitanum* Ger. *f. B. Park.* exoticum magno flore minori innato C. B. In agro Neapolitano frequentissima, eodem tempore cum *Hycintho botryode* vulgari floret. *Clus.*
- C. *Ornithogalo vulgari* simile latiore folio *f. B. umbellatum album medium latifolium* C. B. aliud vulgare *Clus.* E Tyrolensi comitatu habuit: quin & Neapoli ad *Clusium* misit Imperatus.
- C. *Ornithogalum luteum minus* *f. B. C. B.* Pannonicum luteo flore *Clus.* luteum parvum Ger. *emac.* Apud sylvulam pago *Lachn* vicinam; item in siccioribus agris inter *Nemethwywar* & *Zolnoch*.
- C. *Ornithogalum pallido flore* *Clus. f. B.* luteum seu pallidum majus C. B. In *Stiriacarum* & *Austriacarum* Alpium pratis, ubi sylvarum desinere solent.
- Col. *Ornithogalum bulbiferum luteum minimum tenuifolium* Col. angustifolium bulbiferum C. B. In agris tam calidarum quam frigidarum regionum.
- † *Ornithogalum luteum* C. B. *Dod.* luteum seu *Cape agraria* Ger. Bulbus sylvestris *Fuchsi* flore luteo seu *Ornithogalum luteum* *f. B. Yellow Star of Bethlehem.* In agro Pedemontano ad sepes & inter segetes: invenimus etiam in Helvetia. *V. Cat. Bas. & Cat. Altd.*
- Ornithogalum spicatum* Ger. spic. flore albo *Monspessulanum* *f. B.* majus spicatum flore albo C. B. In insula ad Promont. *Pachynum Sicil.* atque etiam *Monspeslii* inter segetes.
- Ornithogalum vulgare* Ger. vulgare & verius, majus & minus *f. B. umbellatum medium angustifolium* C. B. *Common Star of Bethlehem or Day-flower.* In Lombardia, Pedemontano & Lucensi agro inter segetes; *Monspeslii* quoque Aprili & Maio mensibus cum flore. In Anglia etiam in Pomariis & sepibus vidi, sponte ortum non ausim dicere.
- Ornithogalum spicatum flore virente v. Asphodelus bulbosus* *Dod.*
- Ornithopodium duplex* majus & minus invenio in *Cat. Indigenarum Hollandiae D. Commelini.* Orandi sunt Botanici Batavi, ut nobis satisfaciant in quibus differant

ferant hæ duæ plantæ, imò an differant omnino. Ornithopodio similis hirsuta scorpioides C. B. Scorpioides leguminosa J. B. Dod. Ger. Park. Circa Mesaniam Siciliæ & Neapolin Italiæ frequens : Monspelii quoque invenitur. v. Bot. Monsp.

Orobanche ramosa Ger. Park J. B. minor purpureis floribus sive ramosa C. B. In arvis demessa segete primò prope Ratisbonam in Germania observavimus, postea etiam in Italia & Gallia Narbonensi.

C. Orobanche radice dentata major C. B. Park. Dentaria aphyllus altera Clus. Ad radices Etſcheri jugi sub abietibus, &c. quò Sol vix unquam penetrat ; item in sylvula Francofurto ad Mænum vicina.

C. Orobanche radice coralloide C. B. Dentaria minor Ger. aphyllus minor Tabernæmontani J. B. coralloide radice seu aphyllus 3. Clus. In sylva recens cæsa paulò supra Entzeſtorf in Langethal.

Orob. receptus herbariorum Lob. Ger. vulgaris herbariorum Park. filiquis articulatis, semine majore C. B. Orob. sive Ervum multis J. B. Bitter Wetch. In agris circa Monspelium & Genevam.

Orob. sylvaticus purpureus vernus C. B. Pannonicus 1. Clus. sylvaticus purpureus major Park. sylvaticus vernus Ger. emac. Galega nemorensis verna J. B. In dumetis à la Bastie & alibi circa Genevam, inque Germaniæ & Helvetiæ sylvis frequens. In sylva Valena prope Monspelium viâ qua itur ad pagum Viols. Cat. Rom.

Orob. sylvaticus Viciæ foliis C. B. Pannonicus 2. Clus. Astragaloides Ger. Astragalus Herbariorum Park. Astragalus major Fuchsio J. B. Abundat in colle la Bastie ad ripas Rhodani, & in montis Salevæ sylvis prope Genevam. In Germania etiam non admodum rarus est. In monte Muteto & Monchenſtein prope Basileam. v. Cat. Bas.

M. Orob. Pannonicus 3. Clus. montanus angustifolius Ger. emac. sylvaticus angustifolius Park. quorundam radice bulbosa, flore albo J. B. sylvestris angustifolius Asphodeli radice C. B. In monte Serane, inter frutices Junio mense floret. In pratis Austriæ thermis Ba-

densibus vicinis, inque montosis ultra Danubium locis ad ceduarum sylvarum margines. *Clus.*

C. Galegæ nemorensi vernæ similis flore albo *J. B.* Orobis Pannonicus 4. *Clus.* Sylvaticus annuus flore albo *Park.* montanus flore albo *Ger. emac.* In Alpibus Austriacis, inque Pannonia interamni, in monte quodam sylvoso *Greiben* arcis vicino.

B. Orobum sylvaticum pallido flore C. B. Galegam montanam Dalechampi *J. B.* invenit J. Bauhinus in monte *Thuri* non longe à Genève. C. Bauhinus Galegam montanam Dalechamp pro Orobo Pannonicus 4. *Clus.* habet.

B. Orobis Alpinus latifolius C. B. *Park.* Ex Helvetiorum Alpibus habuit C. Bauhinus.

C. Orobis Venetus *Clus.* *Ger. emac.* sylvaticus Venetus *Park.* latifolius parvo flore purpureo C. B. Galegæ nemorensi vernæ similis multiflora flore purpureo & albo *J. B.* E semine Venetis misso enata est. *Clus.*

A. Orobis pratensis repens flore cœrulescente, filiquis nigris, semine albescente: An Aracus latifolius *Dod.* & Orobis Varietis *Clus.* Propè Altdorfium in pratis ante pagum *Gruppach* obvius in Jun. *Cat. Altd.*

Oryza *Lob.* *Ger. Park. J. B.* Italica C. B. In Italia palustribus Ferrariam inter & Bononiam latam vidimus. *Rice.*

Oxalis maxima sylvatica *J. B.* Acetosa montana maxima C. B. maxima Germanica *Park.* *Great Saxrel.* In monte *Thuri* prope Genèvam.

Oxyacantha Theophrasti *Ger. v.* Pyracantha.

Oxys lutea *Ger. J. B.* corniculata repens *Lob.* luteo flore *Park.* Trifolium acetosum 2. seu corniculatum C. B. *Yellow Wood-Saxrel.* In Italia & Sicilia, in umbrosis præsertim, ubique obvium.

Oxycedrus v. Cedrus Lycia retusa *J. B.* & Juniperus.

P.

P Aliurus *Dod. Lob. Ger.* Paliurus sive Rhamnus
3. Dioscoridis *C. B. Park.* Rhamnus sive Pa-
liurus folio Jujubino *J. B. Rham.* folio sub-
rotundo, fructu compresso *C. B. Thurst.*
Choyn. In sepibus circa Veronam, Bergamum, Ro-
mam in Italia, necnon circa Monspelium in Gallia.
Palma sive Manus marina *J. B. Urtica marina X;* sive
Manus marina *C. B. Habuimus ex sinu Adriatico &*
maris infero circa Romam.
Palma humidis sive Chamærrhiphes vel Palmites *Park.*
humilis spinosa *J. B. minor C. B. Chamærrhiphes*
Dod. Lob. Palmites seu Chamærrhiphes *Ger. Dwarf-*
Palm. In insula ad Promontorium Pachynum Sici-
liæ, inque rupibus maritimis Etruriæ. *Christi v. Ri-*
cinus.

Bellonius duas distinguit species, alteram cujus syno-
nyma dedimus spinosam, quæ sola nobis obser-
vata est; alteram Hispanicam non spinosam vo-
cat. Utraque species in Sicilia habetur teste
P. Boccone in *Catal. Sicularum.*

Col. Panax Asclepium Apulum Columnæ Park. Asclep.
semine folioso *C. B. Propè vineam Reguli Aquæmena*
dictum, & alibi in Apulia frequens.

Panax Herculeum majus Ger. Pastinacæ folio, an Syria-
cum Theophrasti *C. B. Heracleum alterum sive pere-*
grinum Dodonæi Park. Sphondylis vel potius Pasti-
nacæ Germanicæ affinis, Panax vel Pseudo-costus flore
luteo *J. B. In Sicilia non longè à castello Puzallu.*
Reperitur etiam circa Monspelium, necnon circa Ro-
mam. *Cat. Rom.*

Ex hujus vulnerato circa radicem caule succus æsti-
vis mensibus manat, æstate fervida etiam in Bel-
gio; qui genuinus Veterum Opopanax censendus
est. *Dod. Bocc.* quod abunde confirmatur Cou-
denber-

denbergii Antverpiensis Pharmacopœi experimento, cui ex semine in Opopanacis grumis reperto hæc planta in Belgio primum enata est.

S. Panax Siculum semine hirsuto, foliis Pastinacæ latifoliæ sativæ *Bocc.* Non solum Panormi ubi pro *Dabiso* notum, sed in tota *Marara* valle locis incultis & asperis copiose nascitur. Floris colore albo à præcedente distinguitur.

Pancratium *Lob.* marinum *Ger.* Monspeffulanum, multis Scilla alba parva *Ʒ. B.* Narcissus maritimus *C. B.* In arenoso maris litore prope Neapolin copiosè, nec minus prope Monspelium; post Solstitium æstivum floret.

Panicum sylvestre v. Gramen panicum.

Col. Paralytica montana rotundifolia *Æquicolorum Col.* *Primula veris montana incana lutea C. B.* *Æquicolorum* montibus supra Flaminianum, *lo Serrone* dicto loco in cacumine, Septentrioni opposito latere, humenti loco.

S. Parietaria *Alfines folio Sicula Bocc.* Passim per universam Siciliam viret: in montibus Hyblæis oppido *Melilli* vicinis *Catanæ*, *Messanæ* & *Agrigenti*.

Paronychia sive *Alfinefolia incana Ʒ. B.* *Anthyllis maritima incana Park.* *maritima Alfinæfolia C. B.* *marina incana Alfinefolia Ger.*

C. Parthenium Alpinum Clus. *Matricaria seu Parthenium Alpinum Clusii Park.* *Alpina, Chamæmeli foliis C. B.* *Matricaria Alpina Clusii Ger.* *Millefolium Alpinum Ʒ. B.* In *Sneberg*, *Snealben* & *Durrenstein* jugis magnâ copiâ, Augusto.

Passerina Lobelii Ʒ. B. altera *Ger.* *Linariæ folio Lobelii Ger.* *Lithospermum Linariæ folio Monspelienſe Park. IX.* seu *Linariæ folio Monspeliacum C. B.* Circa Monspelium. In insula ad Promont. Pachynum proceriorem observavimus.

Passerina Tragi Ʒ. B. altera *Ger.* *Lithospermum Linariæ folio C. B.* *Germanicum, Passerina Tragi Park.* In arvis demessa segete circa Basileam, Genevam, Monspelium, &c. *Romam. Cat. Rom.*

Pastinaca marina v. Crithmum.

Col.

Col. Pastinaca echinophora Apula Col. sylvestris angustifolia fructu echinato C. B. Cirinola in Apulia in campestribus, siccis, squalidis tophaceis marginibus viarum & fossis.

Col. Pastinaca sylvestris daucoides Apula Col. tenuifolia sylvestris umbella majore C. B. sylv. Apula Columnæ Park. Cirinola Apuliæ, Julio.

S. Pastinaca Oenanthes folio Boccon. Supra muros Leonate civitatis in Sicilia invenit P. Boccone.

A. Pastinaca latifolia peculiaris sylvestris Jungerm. Pastinacæ sativæ seu domesticæ similis, sed foliis angustioribus ferè incanis.

C. Pedicularis bulbosa J. B. Filipendula montana flore Pediculariæ montana C. B. Ger. montana major albida Park. Alektorolophos Alpina major 1. Clus. In summis Alpibus Durrenstein, Etscher, aliisque cellis & herbosis jugis.

Pedicularis five Crista galli Alpina floribus pallidis in spicam congestis. Yellow mountain Rattle or Cockscomb. In altissimis montibus max. Carthusianorum coenobium cingentibus. Hujus descriptionem v. in Hist. nost. p. 770.

Pedicularis five Crista galli vulgaris mas J. B. Male Yellow Rattle or Cockscomb. A foemina differt altitudine majore, interdum sesquipedali; caule robustiore, foliis latioribus, floribus multò majoribus, utriculis hirsutis. In pratis circa Genevam foeminæ permixta.

Peganium Narbonensium Lob. v. Ruta sylvestris minima.

Pentaphyllum v. Quinquefolium.

S. Peplis annua, foliis acutis, flore muscoso Boccon. In agro Lugdunensi in Gallia frequens inter legetes reperitur.

Iisdem in locis (inquit Clusius) invenitur, & aliud genus præcedente per omnia fere simile, sed longè mollius, flore nunc albo, nunc purpureo, radice crassa fibrosa.

Pepus

Peplus minor J. B. In agris prope Ladum Monspelicum annem, non longe à *Castelneuf*, & alibi circa Monspelium frequens.

Perfoliatum angustifolium montanum Col. *Perfoliata minor angustifolia* Bupleuri folio C. B. angustifolia Alpina minor Park. Auriculæ leporis affinis. *Odonitis lutea* Valerandi & Dalechampii J. B. *Narrow-leaved Mountain Thorough-war.* In agris quibdam Sicilia sterilioribus non longe à *Puzallu*. Reperitur etiam circa Monspelium. V. Bot. Monsp.

Perfoliata minor foliis gramineis J. B. Alpina gramineo folio, seu Bupleuron angustifolium Alpinum C. B. An *Perfoliata Alpina angustifolia graminea ejusdem?* *Small Mountain grass-leaved Thorough-war.* Leon Ponz, quam proponit Parkinsonus sub titulo Bupleuri angustifolii Alpini, Gerardus Sedi petri Bupleuri folio, huic nostræ plantæ non bene convenit.

B. *Perfoliata Alpina latifolia minor* C. B. *prod. Park.* In Helvetiorum Alpibus.

B. *Perfoliata Alpina angustifolia major* seu folio anguloso C. B. *prod. Park.* In Pyrenæis non longe Narbona.

B. *Perfoliata Alpina angustifolia media* C. B. *Prod.* Sola magnitudine & foliorum angustia à præcedente differt. E monte Gothardo. An *Perfoliata montana latifolia ejusdem* C. B. V. Hist. nost. p. 473.

B. *Perfoliata Alpina angustifolia minor* C. B. *prod. Park.* Ex Sumanò monte & Valesianorum Alpibus.

Perfoliata siliquosa v. *Brassica*.

Periclymenum perfoliatum Ger. J. B. C. B. *perfoliatum calidarum regionum* Lob. *perfoliatum*, sive *Italicum Double or perfoliate Honey-Suckle.* In Italia & Gallia Narbonensi frequens.

Periclymenum rectum fructu rubro J. B. Park. *rectum Germanicum* Ger. *Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro* C. B. *Upright Honey-Suckle with a double red fruit.* In Germania ad sepes & in dumetis vulgatissimum.

Periclymenum rectum fructu nigro Park. *rect. fructu gemino nigro* J. B. *Chamæcerasus Alpina fructu nigro gemino* C. B. *Upright Honey-Suckle with double red*

red frutt. In sylvis juxta sacellum Brunonis dictum à la *grand Chatreufe*, in Delphinatu Gallia.

Periclymenum rectum fructu rubro Ger. fructu rubro singulari majore *Park.* perperam, nam semper geminum habet. *Chamaecerasus Alpina* fructu rubro gemino duobus punctis notato *C. B.* *Chamaecerasus Gesneri*, seu *Chamaepericlymenum* quoddam *Alpinum* *J. B.* In monte Saleva propè Genevam copiose.

A. Periclymenum rectum *3. Clus.* *Chamaecerasus montana* fructu singulari coeruleo *C. B.* *Periclymenum rectum* fructu coeruleo *J. B. Ger. Park.* *Upright Honey-Suckle with single blue frutt.* In *Schlipfberg* propè Altdorfium initio Maii. Ad radices montis pago *Malitz* contigui in Stiria.

Petasites albus anguloso folio *J. B. minor C. B. Park.* *White Butter-Bur.* In declivibus montium quos transivimus eundo à Gavia ad Genuam, tribus circiter m. p. à Voltagio.

Peucedanum majus Ger. majus *Italicum Lob. J. B. C. B.* *Great Hogs-Fennel.* In lingula illa portum Messanensem à freto Siculo dividente.

Peucedanum Pannonicum Clus. quod multis Ungariae & Austriae inferioris locis, montium acclivitatibus, petroso & salebroso solo provenire scribit, J. Bauhinus querit annon sit *Daucus glauco folio similis foeniculo tortuoso* ?

Phalangium non ramosum Dod. Ger. pulchrius non ramosum *J. B.* An *Phalangium* flore *Lilii ejusdem* ? *Phal.* magno flore non ramosum *C. B.* *Spider-wort not branched with a large flower.* In monte Saleva non longè à Geneva : item in monte Jura, inque Alpibus Rheticis, &c.

B. Phalangium parvo flore non ramosum C. B. *Branched Spider-wort with a small flower.* *Michelfedz,* & in monte *Crentzacensi* & *Wasserfal. Cat. Bas.*

Phalangium parvo flore ramosius J. B. ramosum Ger. *Park.* parvo flore ramosum *C. B.* *Branched Spider-wort with a small flower.* Circa *Francofurtum, Basileam, Genevam* & alibi in *Germania*, in collibus, pascuis montosis & ericetis,

Pha-

Phalangium Cretæ Salonensis *Lob. Ger. Asphodelus* VII. seu foliis fistulosis *C. B.* minor foliis fistulosis *J. B.* In campis lapideis seu Creta Salonensi, vulgò *The Craux*, inter Arelaten urbem & oppidum Salonam copiosissimè.

Phalaris semine nigro *Park.* major semine nigro *C. B. J. B. Canary-grass, with black Seed.* Circa Messanam in Sicilia, Baias & Neapolin in Italia, & Monspelium in Gallia Narbonensi. Grana hujus multo minora sunt quàm sequentis.

M. Phalaris semine albo *C. B. Phalaris Ger. J. B. vulgaris Park. Canary-grass. i. e.* Gramen Canariense, quia semen ejus ex insulis Canariis adfertur, & passeribus Canariensibus alendis inservit. Circa Monspelium oritur variis in locis. *v. Bot. Monsp.*

Phillyrea ferrata 2. *Clus. & Phillyrea latifolia* spinosa seu 1. *Clus. Phillyrea folio Alaterni, & Phil. folio Ilicis J. B. Ph. latifolia aculeata, & Ph. folio lato ferrato Park. Dock=Privet, with a serrate, or prickly leaf.* In Etruria copiosissime; item circa Monspelium in præruptis clivis non longè à specu Frontignana, ad montem *Lupi*, & alibi.

Phillyrea angustifolia J. B. Ger. Lob. angustifolia prima C. B. angustif. secunda Park. Narrow leaved Dock=Privet. In Etruria abunde, necnon circa Monspelium.

Phillyrea latiusculo folio C. B. latiore folio Ger. angustifolia prima Park. malè: nam folium obtinet latum. 4. five folio Ligustri C. B. Broad-leaved Dock=Privet. In Etruria Massam inter & Lucam, necnon in Provincia Gallica. Hæc etiam circa Monspelium variis in locis reperitur: *v. Bot. Monsp.* In hujus plantæ, ut & Alaterni foliorum figurâ, colore, magnitudine, incisuris mirè ludit natura, ut nec quas recensui omnes distinctas species credam.

Philyca v. Alaternus. Phthora v. Thora. Phyllon thelygonon Dalech. v. Sedum.

Phyllon marificum & fœminificum *Park.* arrhenogonon & thelygonon folio incano Monspeffulanum *J. B.* Ph. testiculatum & Ph. spicatum *C. B.* Ph. arrhenogonon seu marificum, & thelygonon seu fœminificum *Ger.* Hæc enim duo non specie sed sexu tantum differunt. *Hoary Mercury.* In aggeribus fossarum & secus vias circa Monspelium præsertim prope aquas.

Phyteuma Monspeliensium *Lob. J. B.* Resedæ affinis Phyteuma *C. B.* non tantum Resedæ affinis, sed genuina Resedæ species est. Circa Monspelium passim. In Italia quoque circa Romam & alibi observavimus.

B. Pilosella major seu Hieracium murorum angustifolium non sinuatum *C. B. prod.* Circa Patavium.

Col. Pilosella major umbellifera *μακρόανθος* montana & pratensis *Col.* montana parvo flore *Park.* mont. hispida parvo flore *C. B.* In Æquicolorum montium jugis pratensibus herbosis altioribus.

Col. Pilosella incana saxatilis lutea *C. B.* Auricula muris altera incana saxatilis frigidarum regionum *Col.* E rimis saxorum via qua à Flaminiano villa ad montium cacumina S. Angeli dicta itur.

Pilosella minor folio angustiore minus piloso repens *J. B.* major repens, minus hirsuta *C. B.* *Narrow-leaved creeping House-ear.* In pascuis & collibus circa Genevam.

Pilosella minore flore hirsutior & elatior, non repens *J. B.* major erecta *C. B.* major *Ger.* altera erecta *Park.* Hanc etiam circa Genevam observavi. Reperitur quoque in monte Crentza & ad moenia Basileæ: & Monspelii in luco Gramuntio.

B. Pilosella major repens, minus hirsuta *C. B.* *Common creeping House-ear, less hairy.* Circa Basileam in graminosis. *Cat. Bas.*

A. Pilosella repens minor *πολύανθος* Jungermanni *Cat. Altd.* Ad margines sylvarum *am Heidenberg,* & in apricis ac mulcosis versus Norimbergam m. Jun. & seq.

Pilosella sive *Pulmonaria* lutea angustiore folio, valde pilosa altera *J. B.* In monte Saleva prope Genevam.

Pilosellæ majoris sive *Pulmonariæ* luteæ laciniatæ species minor *J. B.* In prædicto monte Saleva & rupium fissuris exit.

B. Pimpinella Saxifragia tenuifolia C. B. prod. Park. Ad lacum Genevensem copiosè.

C. Pinafter Austriacus 1. Clus. seu major, quem duorum esse generum scribit alterum majore, alterum minore cono. Hunc cum *Pinu sylvestri C. B. Hispanico 1.* seu majore *Clus.* eundem putamus.

C. Pinafter 2. Austriacus alter Clus. quem nigrum vocat. latif. julis virescentib. aut pallescentib. *C. B.*

C. Pinafter Austriacus 3. Clus. tenuifolius julo purpurascente *C. B. Park.* Ad nonnullorum Austriæ montium radices, & supra Badenses Austriæ thermas, in montium crepidine. Circa Binningen. *Cat. Bas.*

C. Pinafter Austriacus 4. seu pumilio Clus. conis erectis *C. B. Austriacus Ger. emac. pumilio montanus Park.* In summis Austriæ & Stiriz Alpium superciliis, inter saxa & scopulos, ut plurimum, ubi nullæ aliæ arbores proveniunt.

Pinus sylvestris C. B. An *Pinus vulgaris sylvestris Genevensis & Tæda J. B.?* An *Pinafter Austriacus major, albus & niger ejusdem?* item *Pinafter, sive Pinus sylvestris Hispanicus major Clus. J. B.* i. e. *Pinus maritima altera C. B.* In historia & synonymis hujus arboris valdè confusi & obscuri sunt Botanici. Folia habet longa, in viriditate nigricantia, caudicem contortum, rubro cortice vestitum, ramis hiulcum, conos oblongos, turbinatos, ramorum alas spectantes nucleis parvis, nec *Mali vulgaris* nucleis multò majoribus, quibus & figurâ suâ accedunt. Habetur in viridariis nostris frequens, nonnullis the Mountain-Pine, id est, *Pinus montana* dicta, ubi (ut rectè *Clusius*) in *Pini sativi* altitudinem excrescit. Provenit (auctore *Clusio*) in *Aquitania & Pyrenæis* frequentissimè, quod & *D. Willughby* nobis confirmavit, & plurimam resinam fundit. Est etiam in *Franconia, Suevia, Bavaria, Austria*

Austria &c. passim obvia, ubi arbusculæ magnitudinem non excedit. Pinastrer five Pinus sylvestris Hispanicus major *Clus.* vel ipso monente, à Pinastro II. Austriaco albo parùm, & solis fortè natalibus differt.

Pinus sylvestris foliis brevibus glaucis, conis parvis al-bentibus: Hortulanis nostris *The Scotch Firr*, i. e. *Abies Scotica* ineptè. Hanc in *Catalogo Exterarum* pro Pinastro altero Hispanico *Clus.* habui, verùm non convenit caudex inflexus & contortus, cum hujus rectus sit: Coni etiam majores pinguntur. In Alpi-bus Stiriacis observavimus.

Pinus sativa C. B. sativa five domestica *Ger.* urbana five domestica *Park.* officulis duris, foliis longis *J. B.* In Gallia Narbonensi & Italia, copiosissimè autem propè Ravennam. *The manured, or Garden Pine-tree.*

A. Pinus sylvestris montana altera C. B. Pinus sylvestris Mugo *Matth.* Pinus sylv. humilior *Cat. Altd.* In declivibus versus *Hagenhausen*, cujus ramis flexilibus ac obsequiosis valli præulsi sepium passim colligan-tur.

C. Pisum sylvestre *Clus.* sylvestre perenne C. B. *Park.* sylvestre alterum *Ger.* Variis Pannoniæ in locis invenit *Clusius*, & circa Viennam sylvos montibus.

M. Plantago maxima tota glabra C. B. maxima caule-scens *Cornut.* latifolia maxima *Park.* marina magna *J. B.* *Great Spanish Plantain.* In maritimis ver-sus *Perauls.*

Plantago quinquenervia cum globulis albis pilosis *J. B.* angustifolia VIII, seu paniculis Lagopi C. B. angusti-folia cum paniculis Lagopi *Park.* *Haresfoot-Plan-tain.* Circa Messanam, Montpelium & Nemausum.

B. Plantago angustifolia minor C. B. *Park.* quinquenervia minor *Ger.* Parvitate sola omnium partium à vulgari lanceolata differt. In viis circa Basileam. *Cat. Bas.*

B. Plantago trinervia folio angustissimo C. B. *Park.* angustifolia Alpina *J. B.* In summis jugis montis Juræ. Habetur etiam circa Montpelium in viis.

- Plantago* *Apula* *liacinata* *bulbosa* *Col.* *Apula* *bulbosa* *Park.* *pilosa* *bulbosa* *C. B.* In incultis *Apulæ*, præsertim *Cirinolæ*.
- Plumbago* *Plinii* *Ger.* *Dentellaria* *Rondeletii* *J. B.* *Lepidium* *Dentellaria* dictum *C. B.* *Lep. Monspeliacum* *Dentellaria* dictum *Park.* *Pliny's Leadwort.* Circa *Syracusas* in *Sicilia*, *Romam* & alibi in *Italia*, *Monspelum* in *Gallia Narbonensi*.
- Polemonium* five *Trifolium fruticans* *Ger.* *Pol.* five *Trif. fruticans*, vel *Jasminum luteum* vulgare *Park.* *Jasminum luteum* vulgo dictum *bacciferum* *C. B.* *Yellow Jessamy, or Shrub-trefoil.* In sepibus circa *Monspelum*. Vidimus etiam in regno *Neapolitano* prope *Scaleam*.
- Polium montanum album* *C. B.* *Ger.* *montanum* 1. albo flore *Clus.* *Monspessulanum* *J. B.* *Monspeliacum* *Park.* *White Poley=mountain.* In *Italia* & *Gallia Narbonensi* passim.
- Polium maritimum erectum* *Monspeliacum* *C. B.* *Ger.* *Hujus* & præcedentis speciei apud *Parkinsonum* epitheta permutata sunt. Hoc majus præcedente, & odore gratiore esse dicitur: eandem nihilominus plantam esse suspicor.
- Polium montanum Levandulæ folio* *Park.* *C. B.* *Levendulæ folio*, flore albo *Ger.* *Lavender-leaved Poley=mountain.* In montosis circa *Basileam*, *Genevam* & alibi. In *sylva Valena* non longè à *Monspelio* v. *Bot. Monsp.*
- C. *Polium montanum repens* *C. B.* *montanum minimum* *Ger. emac.* *mont. supinum minimum* *Park.* Nascitur publicâ viâ, in agro *Viennensi*.
- C. *Polygonatum* 3. latiore folio *Clus.* *latifolium Ellebori albi foliis* *C. B.* *maximo folio* *Park.* *amplitude foliorum Ellebori albi* *J. B.* *Umbrosis locis inter Brunnam & Weyspach*, aliisque vicinis montanis sylvis supra *Viennam Aultriæ*.
- C. *Polygonatum latifolium ramosum* *J. B.* *C. B.* *latifolium ramosum* five 4. *Clusii* *Park.* *ramosum* *Ger.*

C. *Polygonatum*

- C. *Polygonatum angustifolium ramosum* *ſ. B. C. B. Ger. Park. Polyg. 6. angustifolium 2. Clus.* Ex Silēſia habuit Cluſius, Achillis Cromeri munere.
- M. *Polygala major* *C. B. major prima Clus. hiſt.* In deſcenſu montis *Capouladou*, Maio & Junio menſibus floret. *Great Milkwort.* In *Leytenberg* ſupra *Manderſtorf* circa *Medeling* totāque illa montium ſerie quæ à Calenberg Danubio ſupra Viennam imminenti ad Auſtriacas ulque Alpes excurrit; & in Pannonia interamni ubique vulgaris.
- M. *Polygala annua erecta anguſtifolia*, floribus coloris obſoleti, carneis lineis virgatis *Bot. Monſp.* coloris obſoleti, foliis anguſtiſſimis *ſ. B.* Nimum anguſta folia pingit *C. B.* nec rectè *Polygalam* vulgarem vocat, rara enim eſt, & paucis Botanicis nota. Invenimus Maio & Julio menſibus florentem in ficcis locis, vulgò *Garrigues du Tarral* & prope *la Tevilliere de Maſſanes*.
- M. *Polygala acutioribus foliis Monſpeliaca* *C. B.* De hac planta conſule *Botan. Monſp.*
- Polygonatum minus* *Lob. Ger. anguſtifolium Park. ſ. B. anguſtifolium non ramosum C. B. Narrow-leaved Solomons=Seal.* In ſylvis circa Spadam urbeculam acidulis celebrem copioſiſſime, vidimus etiam in ſylvoſis montis *Saleve*.
- B. *Polygonatum latifolium minus flore majore* *C. B. prod. Park.* In ſaxoſis montis *Mutetæ* & *Crentzaci*. *Polygonatum latifolium* vulgare, quod in Anglia rarius eſt, in Belgio, Germania, Italia & Gallia in ſaxoſis & ad ſepes ubique occurrit.
- C. *Polygonatum latifolium 1. Clus.* majus, vulgari ſimile *ſ. B. majus Park. latifolium maximum C. B.* In quibuſdam Auſtriæ & Pannoniæ umbroſis locis vulgari permixtum. In umbroſis montis *Wechſal* ſylvis inque *Durrenſtein* inter ſaxa & frutices, &c. v. Cluſium.
- A. *Polygonatum latifolium maximum* *C. B. latifolium 2. Clus.* Pannonicum, majoribus baccis & foliis *Cam.* Floribus eſt candidioribus, amplioribus & ſingularibus. Ad ſaxa *am Hundsbeutel* circa *Hippolſtein* Norimb. Maio.

- Polygonum montanum niveum** *Park.* **montanum** *Ger.* minus candicans *C. B.* **Paronychia Hispanica** *Clusii*, five **Anthyllis nivea** *J. B.* **White mountain Knot-grass.** Circa Messanam copiosè.
- Polygonum** five **Herniaria fruticosa**, viticulis lignosis *C. B.* **Herniariæ facie & folio**, per ampla radice **Astragaliti** *Ad.* In plurimis satorum marginibus repit circa Boutonetum, & in sterilibus locis versus pontem Villæ novæ. Malè hoc confundit *Lugd.* cum præcedente.
- M. Polygonum muscosum minimum** *Boccon.* Maio mense plurimum vidit in satis luci Gramuntii *D. Magnol.* modò viride est; aliquando purpurascit.
- S. Polygonum capitulis ad genicula echinatis** *Bocc.* In *Iva* insula juxta *Portolongoni* munimenta & nova mœnia visitur.
- A. Polygonum minus caryophyllæum**, foliis angustissimis, flosculis tubulosis plurimis simul junctis incarnatis *Cat. Altd.* An **Polygono angustissimo folio affinis** *C. B.?* Passim ad saxa circa *Utenhoffen* mens. Jul.
- A. Polygonum Polonicum cocciferum** *J. B.* cocciferum & *Cam. ep.* **The Polonian Scarlet Knot-grass.** Hanc speciem invenio in *Cat. Altd.* An & quomodo differat à *Knawel* non dicit *Catalogi Autor Maur. Hofman. v. Hist. nost. p. 286.*
- B. Polygonum saxatile** *C. B. prod.* In petris arcis Waldeburgensis Basileensium. Parum differre videtur à **Polygono vulgari.**
- B. Polygonum littoreum minus**, flosculis spadiceo-albicantibus *C. B. prod.* alterum Germanicum *Park.* In arenosis ad Wieselam fluvium prope Basileam.
- Polygonum vel Linifolia** per terram sparsa, flore **Scorpioidis** *J. B.* In Etruria non longe à Viterbo, cum Romanam contenderemus observavimus. Invenitur etiam circa Monspelium *v. Bot. Moss.* Extra scopum jaculatur *J. Bauhinus* cum hanc ad Millegranam minimam *Lobelii* refert.
- Polygonum bacciferum maritimum** *v. Tragos.*
- Portulaca sylvestris** *Lob. Ger. Park.* sylv. minor five spontanea *J. B.* angustifolia five sylvestris *C. B.* **Portulane.** In Germania, Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi in vervactis & ad vias passim, Por-

Portulaca marina v. *Halimus*.

B. Potamogiton minimum capillaceo folio *C. B. J. B. Park.* In Ladi amnis aquis circa molendina. *Bot. Mon.*

B. Potamogiton capillaceum capitulis ad alas trifidis *C. B. J. B. Park.* Hoc etiam Monspelienſe eſt.

Prunella anguſtifolia *J. B. Hyſſopifolia* *C. B. Narrow-leaved Self-heal.* Circa Monspelium variis in locis.

Prunella coeruleo magno flore *C. B.* magno flore purpureo *Park.* flore magno, folio non laciniato *J. B. Self-heal with a large blue flower.* In Germania circa Moguntiam & alibi, necnon circa Genevam.

Prunella laciniata flore magno purpureo *J. B.* laciniato folio *Park. Brunella Lobelii* *Ger. Jagged Self-heal with a large flower.* Cum priore.

Pseudoasphodelus quibuſdam *J. B. Pseudoasphodelus minor* folio *Iridis anguſtifoliae* *Park.* *Pseudoasphodelus Alpinus* *C. B.* Ad radices montis Salevæ copioſe. *Pseudoasphodelus pumilio* foliis *Iridis* *Cluſ.* In monte Crentzach prope Baſileam. *Cat. Baſ.*

Pseudomelanthium glabrum *Siculum* v. *Lychnis*.

B. Pseudonarcifſus gramineo folio, ſive *Leuconarcifſus æſtivus* *C. B. prod.* In Alpibus Helvetiorum & Rhetorum, ut in monte *Spliegel* & ad thermas Fabarias, Jul. In Taurevo Aultriæ monte Aug.

Pseudostachys Alpina *C. B. prod. Salvia Alpina* *Tab.* In monte *Waſſerſal*, prope Scaphuſiam.

Pſyllium majus ſupinum *C. B. J. B.* majus ſemper virens *Park.* ſemper virens *Lobelii* *Ger. Great ever-green flea-wort.* Circa Monspelium & in Italia frequens.

Pſyllium vulgare *Park.* majus erectum *C. B. J. B. Pſyllium* ſive *Pulicaris herba* *Ger. Common flea-wort.* Circa Monspelium in agris copioſe; inque olivetis & ſabuloſis ſcrobibus. *Pſyllium* dicitur ob ſeminum cum pulicibus ſimilitudinem.

Pſyllium laciniatis foliis *Boccon.* *C. B.* Hanc ſpeciem in Sicilia & alibi obſervavimus. *Paul. Boccone* prope *Melillam* & *Saccam*.

Ptarmica Alpina *Matricariæ* foliis *Triumfetti.* *Corymbifera* *Millefolii umbella*, folio alato & laciniato *Hiſt. noſt. p. 344.* In ſylvis montofis propè maximum *Carthusia*.

thusianorum coenobium. Hæc planta à nobis edita est multis annis antequam Triumphetti liber prodiret.

Pulegium angustifolium *Ger. C.B. angustifolium* five *Cervinum Lob. Park. cervinum angustifolium J.B. Hartz Penny-royal*. Primò vidimus ad Rhodanum fluvium prope pontem S. Spiritus dictum; postea circa Monspelium in humidioribus. Isto utendum præcipere solebant Monspelienfes, quòd odor, sapor & vires multò quàm alterius gratiora, vehementiora & probatiora forent. *Lob.*

S. Pulegium tomentosum minimum *Boccon*. In pratis non longè à *Corleone* in Sicilia. Non alia in re à vulgari Pulegio quàm parvitate sua & foliis longioribus atque hirsutis differt.

Pulmonaria maculosa *Lob. Ger. maculata Park. Symphytum maculosum* five *Pulmonaria latifolia C. B. Pulmonaria Italarum* ad Buglossum accedens *J. B. Sage of Jerusalem* or *Sage of Bethlehem*. In sylvis prope Coloniam Agrippinam primò, postea in omnibus ferè montosis dumetis juxta Rhenum & prope Genavam in conspectum se dedit. Folia maculis albis plerunque notantur, interdum iis carent.

Hinc *Pulmonaria* folio non maculoso *Clus.* ab hac non videtur specie differre.

C. Pulmonaria angustifolia cœruleo flore *J. B. angustifolia 3. Clusii Ger. Symphytum maculosum*, five *Pulmonaria angustifolia cœrulea C. B.* Per Pannoniam & Austriam inferiorem, in montanis & cæduis sylvis passim.

Pulmonaria angustifolia rubente cœruleo flore *C. B. seu 5. Clus.* in Anglia à D. Goodyero inventa est olim. Huic tum forma, tum amplitudine foliorum respondet 4. Clusii flore rubro. Ambæ ad cæduarum sylvarum margines locis umbrosis in Pannonia inveniuntur.

Pulmonaria Gallorum v. Pilosella.

Pulsatilla alba *J. B. Park. flore albo C. B. Ger. White-flower'd Pasque-flower*. In summis jugis montis Juræ. Hæc non floris colore tantum, sed totâ specie distincta est à *Pulsatilla* nostrate vulgari flore clauso, quam flore albo alicubi vidisse memini; est enim planta multò elatior & speciosior.

M. Pul-

- M. Pulsatilla folio crassiore & majore flore C. B. vulgaris Ger. purpurea coeruleave J. B. Danica Park. Danish or greater Pasque-flower. In monte Serane copiose collegit P. Magnol. Invenitur etiam circa Altdorfium variis in locis, in montosis Palatinis. v. Cat. Altd.
- B. Pulsatilla palustris C. B. prod. In pratis udis & paludosis Michelsfeldæ.
- J. B. Pulsatilla lutea J. B. lut. Alpina hispidior C. B. In Rhætio monte Braulio, inque Gothardi monte.
- Punica malus sylvestris C. B. Ger. Punica sylvestris major five Balauftium majus Park. Malus Punica J. B. The wild Pomegranate-Tree. In Gallia Narbonensi & Provincia passim.
- Pyracantha Lob. Clus. Pyr. quibusdam J. B. Oxyacantha Theophrasti Ger. Oxyac. Dioscoridis five Spina acida Pyri folio C. B. Ever-green Thorn or Piracantha. Circa Florentiam & alibi in Etruria copiose.
- A. Pyrola rotundifolia minor C. B. 4. minima Clus. monanthemos odore Lillii Convallium Jungerm. Cat. Alt. Circa Altdorfium in umbrosis. v. loca. In Alpihus Sneberg, Hochbergerin, Durrenstein & aliis vicinis circa radices summorum illorum jugorum. Clus.
- C. Pyrola fruticans J. B. Park. 3. fruticans Clusii Ger. emac. frutescens Arbuti folio C. B. Abunde provenit in sylvis Entzestorf arcu vicinis Clus. Habetur in Catal. Sicularum Bocconi.
- Pyrola folio serrato J. B. folio mucronato serrato C. B. tenerior Park. 2. tenerior Clusii Ger. Winter-green with a pointed and dented leaf. In montibus Genevæ vicinis, inque sylvis montosis non longè à Constantia versùs Scaphusiam, & alibi in Alpihus frequens.
- In flore Pyrolæ vulgaris insignem observavi differentiam: In una enim planta inferior floris lacinia seu labellum productius est & magis dependet quàm in altera, stylus etiam in illa magis propendit & deorsum incurvatur quàm in hac. Fortè una sterilis est, illa nimirum cujus labellum & stylus propendent, cum & caulis ejus exsuccus & evanidus videatur; altera foecunda, cum caulis ejus robustior sit & succulentior.

Q.

C. **Q**uercus foliis molli lanugine pubescentibus altera species C. B. Robur 2. Clusii *J. B.* In Austria, Stiria, & Pannonia.

C. Quercus humilis, gallis binis, ternis aut pluribus simul junctis C. B. Robur 6. Clusii *J. B.* Nascitur in Austria & Pannonia, ubi rustici cum secundo confundunt : & fortasse non immerito : non enim placet Quercus species à Gallis distingui.

Quercus calyce echinato v. Cerrus.

Quinquefolium rectum flore albo *nobis.* Pentaphyllum rectum *J. B.* cujus figura plantæ nostræ optimè respondet. An Quinquefolium album majus caulescens C. B? Pentaphyllum majus luteo flore vel albo *Park.* Vidimus primò in Alpibus Carinthiacis, deinde in ascensu montis Salevæ prope Genevæ ; tandem ad latus portæ maximi Carthusianorum coenobii Gratianopolin ducentis, ubique è rupium fissuris exiens.

B. Quinquefolium album minus C. B. *prod.* In saxosis circa Curiam Rhætorum.

Quinquefolium album majus alterum C. B. sylvaticum majus flore albo *Ger.* Pentaphyllum album *J. B.* majus alterum album *Park* Great White Cinquefoil. In Alpibus Stiriacis inter oppidum S. Michaelis & *Knittefeld* : Clusius in montosis Sylvis in Austria, Moravia & Pannonia interamni. Folium supernè glabrum est & viride, infernè argentea lanugine villosum.

Quinquefolium Alpinum argenteum flore albo *nobis.* An Pentaphyllum foliis supernè & infernè incanis *J. B.* ? An Quinquefolium minus album alterum C. B ? Quinquefolium sylvaticum minus flore albo *Ger. emac.* ? Pentaphyllum album minus *Park* ? In summitatibus montium altissimorum max. Carthusianorum coenobio imminetium. Trifolium Alpinum argenteum *Ponæ* ab hoc

hoc non aliter differre videtur quam numero foliorum in eodem pediculo. Qu. an aliter differat Trifolium saxatile hirsutissimum *J. B. C. B.* Pentaphyllum minus albo flore *Clus.* quamvis ad hoc nostrum accedat, in nonnullis tamen ab eo in tantum differt, ut diversam speciem existimem.

Quinquefolii quarti prima & secunda species Clusii, an & quomodo differant à planta sequente considerandum. Nihil illo vulgatus locis siccis & nudis Pannoniæ, Austriæ inferioris, Moraviæ & Bohemiæ, secundum vias, mihi certe eadem videntur.

Quinquefolium minus repens luteum *C. B.* An Quinquefolium minus repens lanuginosum luteum *eiusdem*? incanum *Ger?* repens minus *Park?* Pentaph. parvum hirsutum *J. B?* In Episcopatu Tridentino & Helvetia; item circa Genevam *en plain palais.* Martio & Aprili floret, unde à Schwenckfeldio rectè denominatur Quinquefolium vernum minus.

Quinquefolium minus repens Alpinum aureum *C. B.* minus flore aureo *Ger. emac.* Alpinum splens flore aureo *J. B.* Pentaphyllum incanum repens Alpinum *Park.* In montis Juræ summo vertice *la Dolaz* dicto. In summis Austriacarum Alpium jugis quæ tamen herbosa sunt *Clus.*

A. Quinquefolium rectum majus *J. B.* majus erectum *Park.* Quinquef. majus rectum *Ger.* rectum luteum *C. B.* *Great upright Cinquefoil.* Flore est Sulphureo. In Schipfelberg prope Altdorfium m. Junio. In sylva Valena copiosè, atque etiam in monte *Capouladou.*

B. Quinquefolium erectum montanum hirsutum luteum *C. B. prod.* In monte Crenzacensi.

Quinquefolium rectum minus, angustioribus foliis Montpelienſe. In sylva Valena prope montem S. Lupi. *Caules* ex eadem radice plures exeunt, versùs terram reclinati in fastigio plures gestantes flores. *Folia* longis infident pediculis, & circumcirca dentata sunt denticulis majoribus, non admodum hirsuta. A præcedente diversum videtur.

Quinquefol. fragiferum *C. B.* Pentaphyllon fragiferum *Ger. Park.* Pentaphylloides erectum *J. B.* In monte Saleva, prope arcem antiquam vetustate collapsam. *Quin-*

Potentilla
montana
herb. L.

Quinquefolio Fragifero affinis C. B. Pentaphyllon lupinum
Potentillæ facie Ger. Park. Pentaphylloides lupinum
J. B. In Germania prope Rhenum infra Moguntiam,
& alibi.

B. Quinquefolio similis Enneaphyllos hirsuta C. B. prod.
Enneaphyllon Park. Ex Helvetiorum Alpibus.

Quercus latifolia mas quæ brevi est pediculo C. B. In
sylva Hagenfi, &c. Cat. Holl. Commelini.

R.

R

Adix cava v. Fumaria bulbosa.

Ranunculus albus simplici flore J. B. Alpi-
nus albus Ger. montanus albus minor sim-
plex Park. montanus, Aconiti folio, flore
albo minore C. B. White mountain single Crow-
foot. In Jura & Saleva montibus copiosè.

C. Ranunculus montanus, Aconiti folio albus, flore ma-
jore C. B. flore albo, Alpinus major J. B. montanus
maximus albus Park. Aconiti folio Ger. montani 4.
species altera Clus. In acclivi montis Wechsel, Sne-
berg, & aliorum montium sylvosis locis, copiosè.

Ranunculus montanus albus hirsutus J. B. montanus 3.
Clus. montanus Pennæi Park. mont. hirsutus purpu-
reus Ger. emac. montanus hirsutus purpurascens flore
C. B. In sylvosis prope verticem montis Thuri. Flores
velut in umbella gerit.

Ranunculus tenuifolius montanus luteus J. B. In mon-
tis Juræ præalta parte Thuri J. Bauhino, & post eum
nobis etiam observatus.

Ranunculus montanus lanuginosus foliis Ranunculi pra-
tensis repentis C. B. Park. magnus, valdè hirsutus,
flore luteo J. B. cujus descriptio, desumpta è Phyto-
pinace C. B. nostræ plantæ adamussim convenit. In
monte Saleva copiosè.

M. Ra-

- M. *Ranunculus montanus* foliis *Plantaginis* C. B. folio *Plantaginis* Ger. *Plantaginis* foliis *Park.* foliis sublongis, non laciniatis, albo flore *J. B.* In herbidis locis montis *Serane* cum floribus luteis Maio mense collegit P. Magnol. *Bot. Monsp. App.* E *Pyrenæis* erutus floribus erat niveis. *Clus.*
- C. *Ranunculus præcox* *Rutæ* sive *Coriandri* folio *Park.* *parad.* *Rutaceo* folio, flore suave-rubente C. B. *præcox* *Rutaceo* folio Ger. In inferioribus *Sneberg* jugis & vicinis montibus.
- C. *Ranunculus nemorosus* *Thaliætri* folio C. B. *præcox* 2. *Thaliætri* folio *Clus.* *Thaliætri* folio *J. B.* *Thaliætri* folio major *Park.* *præcox* *Thaliætri* folio Ger. *emac.* In saltu *Leytenberg* quinto ab urbe *Vienna* milliari, & quibusdam aliis umbrosis sylvis *Viennensis* agri, *Aprili.*
- C. *Ranunculus Alpinus* humilis rotundifolius flore minore C. B. *montanus* albus humilior *Park.* *montanus* flore minore Ger. *montani* 1. species 1. *Clus.* In summis *Sneberg* & vicinarum *Alpium* jugis, confragoso solo, & in ipsis prope petrarum fissuris.
- C. *Ranunculus Alpinus* humilis rotundifolius flore majore C. B. *montanus* flore majore Ger. *Ran. montani* 1. species altera *Clus.* Cum priore.
- C. *Ranunculus montanus* hirsutus albus elatior C. B. *montanus* 2. *Clus.* *montanus* albus major vel elatior *Park.* *parad.* In *Sneberg*, *Snealben*, aliarumque *Alpium* celsioribus jugis.
- C. *Ranunculus montanus* hirsutus humilior, *Narcissi* flore C. B. *Ran. montani* secundi species altera *Clus.* *R. hirsutus* *Alpinus*, flore albo Ger. *emac.* *montanus* maximus albus *Park.* In celsioribus earundem cum priore *Alpium* jugis.
- C. *Ranunculus montanus* 5. *Clus.* *Pannonicus* maximus *Park.* *montanus* latissimo folio hirsutus C. B. In nemoribus, & umbrosis declivibusque omnium *Austriacarum* atque *Stiriacarum* *Alpium* locis, juxta rivulos è liquescente nive profluentes. *Ran. πολυπλάτυλλον* Cat. *Ald.* In umbrosis circa *Altdorfium*.

- C. *Ranunc. lanuginosus angustifolius grumosa radice minor*
C. B. grumosa radice 4. Clus. hist. Illyricus Ger.
Illyricus minor Park. Illyricus radicibus bulbosis, fo-
liis longis J. B. In Hamburgensi monte secundus su-
pra Polonium Ungariæ milliaribus.
- B. *Ranunculus grumosa radice, folio Ranunculi bulbosi*
C. B. prod. grumosa radice Bononiensis Park. Agris
Bononiensibus familiaris est.
- B. *Ranunculus Geranii tuberosi folio C. B. prod. Non*
longè Patavio in Arqua.
- B. *Ranunculus montanus subhirsutus latifolius C. B. prod.*
In humidis montis Mutetæ.
- Col. *Ranunculus gramineus bulbosus Park. gramineo fo-*
lio bulbosus C. B. angustifolius bulbosus J. B. leptoma-
crophyllos bulbosus Col. In Æquicolorum montibus
supra D. Philippæ antrum.
- J. B. *Ranunculus montanus purpureus calyce villosa Fe-*
licis Plateri J. B. In Alpibus Valleis.
- B. *Ranunculus rotundifolius repens echinatus C. B. prod.*
Circa Bononiam in agris.
- M. *Ranunculus palustris echinatus J. B. C. B. Park. In*
fossis humidis juxta Ledum amnem copiose Pet. Magnol.
Ranunculus Apuleii Clus.
- M. *Ranunculus saxatilis magno flore C. B. Park. In*
saxosis circa Monspelium.
- M. *Ranunculus villosissimus Monspeliacus C. B. prod.*
Park. Hæc etiam Monspeffuli in saxosis oritur. Au-
tore C. B. Dubitat D. Magnol, an hæc sit tantum
varietas præcedentis.
- M. *Ranunculus saxatilis foliis subrotundis C. B. Park. In*
eisdem cum prioribus locis.
- M. *Ranunculus minimus saxatilis hirsutus C. B. Park.*
Non longè Monspelio ad Lattes provenit.
- M. *Ranunculus angustifolius lanuginosus grumosa radice*
major C. B. major Illyricus Clus. Park. In herbidis
ultra pontem Castri novi juxta Ladum amnem Maio
menfe florentem, & sese multum propagantem invenit
D. Magnol, tum & in aliis herbidis satorum marginibus,
foliis latis minus laciniatis.

M. Ranunculus chærophyllus Asphodeli radice C. B. Asphodeli radice flore luteo *Park.* montanus leptophyllos Asphodeli radice *Col.* In herbidis marginibus fatorum, quæ luco Gramuntio conclusa sunt, & circa ipsum lucum Maio mense floret, ac in plurimis aliis locis. *Bot. Monsp.* Collibus Campoclarensum & Æquicolorum valdè familiaris *Col.*

M. Ranunculus Coronopi-folius, capitulo Alopecuri, ceratophyllus, seminibus falcatis in spicam adactis *Hort. Blas. aust.* Male à Lobelio in *Adv.* Melampyrum perpusillum luteum vocatur. In satis ultra portam *du Peirou* & alibi vere copiosè floret.

M. Ranunculus montanus folio gramineo C.B. gramineus flore luteo simplici *Park.* pumilus gramineis foliis *J. B.* gramineus Lobelii *Ger. emac.* Grass-leaved Crow's foot. In pratis ponè publicum diversorium montis Lupi. *Lob. Ad.*

M. Ranunculus magnus valdè hirsutus *J. B.* In umbrosis herbidis montis *Capouladou*, & in aliis quibusdam locis circa *Monspelim* invenit *D. Magnol.*

M. Ranunculus arvensis parvus folio trifido C. B. minimus Apulus *Col. Park.* Julio & Augusto mensibus florentem invenit. *P. Magnol* in margine pratuli Gramuntii cum Bupleuro angustissimo folio.

Col. Ranunculus lanuginosus Apii folio, Asphodeli radice C. B. alter saxatilis Asphodeli radice *Col. Park.* In Æquicolorum montibus saxosis humentibus locis.

Ranunculus v. Aconitum & Thora.

M. Rhaphanus aquaticus foliis in profundas lacinias divisus C. B. Rhaphanus aquaticus *Tab.* Radicula sylv. seu palustris *J. B.* Copiosè oritur in aquis juxta *Ledum* amnem versus *Lateram.* v. *Botan. Monsp.* Habetur etiam in *Commelini Catalogo Hollandicarum.*

Rapistrum monospermon *J. B. C. B. Park.* In Italia non longè à *Liburno*; circa *Genevam* etiam & *Monspelim.*

Rapunculus spicatus C. B. spicatus sive comosus albus & coeruleus *J. B.* spicatus Alopecuroides *Park.* Rapuntium majus *Ger.* Primò eum observavimus in dumetis montosis circa *Spadam* urbeculam acidulis celebrem,

- brem, postea in collibus Genevæ vicinis, ut *la Bastie*, &c.
- Rapunculi genus folio serrato rotundiore *J. B.* In ascensu montis Juræ. Apud alios Autores nulla ejus mentio, quod sciam.
- Col. Rapunculus nemorosus magno flore *Park.* minor *C. B.* Rapuntium sive Erinos magno flore *Col.* In Aspresium colle quodam Castro subjacente.
- Col. Rapuntium umbellatum *Col.* An Telephium purpureum majus *C. B.* ? floribus purpureis *Park.* Ex semine misso Columnæ exortum est.
- Rapunculus orbiculatus folio tenui gramineo *J. B.* Hujus exemplar Monspelii in montibus vicinis collectum nobis communicavit *D. Car. Sweiker* Dantiscanus: In montibus Rhæticiis collegit *J. Bauhinus*.
- Rapunculus minor foliis incisfis *C. B.* Alfine folio oblongo serrato, flore cœruleo *J. B.* item Erinos Columnæ minor *ejusdem*. In muris & ficcioribus Messanzæ & Monspelii. Cùm hanc plantam primò vidimus ad Speculum Veneris eam retulimus, cujus revera species est; quippe vasculum seminale habet in filiquam productum.
- S. Rapuntium urens Solonienſe *Boccon.* Draba flore cœruleo galeato *C. B.* In humidis ericetis & sylvis annosis passim in agro Solonienſi: inque ericetis Regiæ intra septa *Chambort.* passim in humidis viget.
- Reseda alba *J. B.* maxima *Ger.* candida *Lugd.* *C. Bauhinus* Resedam majorem cum floribus luteis describit, qualem nondum vidimus. In Italia satis frequens est. *v. Cat. Rom.*
- Reseda Linariæ foliis *C. B. Park.* Circa Monspelium collectum mihi communicavit *D. Car. Zueicker,* Dantisc.
- M. Reseda foliis Calcitrapæ flore albo *Hort. Blas. auct.* An Reseda candida *Lugd.* ? Invenit *D. Magnol.* Maio mense prope pagum *Balleruch,* quâ itur ad Thermas.
- Resedæ affinis *v. Phyteuma.*
- Rhamnus cortice albo Monspelienſis *J. B. Rh. 1.* Clusii flore albo *Ger.* secundus Monspelienſium sive primus Clusii *Park.* cujus figura plantæ huic non respondet. *Rh.*

- Rh. spinis oblongis, flore candicante C. B. Circa Florentiam & Monspelium in sepibus.
- S. Rhamnus pentaphyllos Siculus *Bocc.* Prope Panormum in agro dicto *Fundaco* del Abbate ad Sepes, ubi à colonis & villicis *Zaccati* dicitur: In Africa etiam nasci aiunt.
- C. Rhamnus catharticus minor C. B. catharticus minor Pannonicus *Park.* solutivus minor *Ger.* solutivus pumilus Pannonicus 1. Clusii *J. B.* In Leytenberg & vicinis montanis sylvis frequens.
- C. Rhamnus solutivus Pannonicus 2. Clusii *J. B.* item Lycium Italicum *ejusdem* & *Park.* Lycium facie Pruni sylv. seu Italicum C. B. item Lycium Buxi folio *ejusdem.* vulgatus *Park.* In monte Badensibus thermis imminente, loco petroso & salebroso copiosè.
- Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso v. Paliurus. Rhododendron v. Oleander.
- Rhus folio Ulmi C. B. coriaria *Dod.* *Ger.* obsoniorum *Lob.* *Clus.* Rhus five Sumach *J. B.* Sumach five Rhus obsoniorum & coriariorum *Park.* Common Sumach. In collibus circa Monspelium prope *Castelneuf, aux Garrigues,* &c.
- Rhus myrtifolia Monspeliaca C. B. myrtifolia *Ger.* Plinii putata *J. B.* Plinii Myrtifolia *Park.* Myrtle-leaved Sumach. Circa Monspelium copiosè. Ad coria firmanda totæ Narbonæ notissimam & usitatissimam scribit Lobelius.
- Ricinus major vulgaris *J. B.* C. B. Ric. five Palma Christi *Ger.* Ricinus five Cataputia major vulgatio *Park.* Palma Christi. Circa Messanam Siciliae & Rhegium Calabriae in sepibus frequens. Ubi in fruticem satis grandem five arbusculam Sambuci æmulam adolescit, & multos annos durat. Semen Ricino insecto simile est, unde plantæ nomen.
- Rosa rubello flore parvo simplici, non spinosa *J. B.* sylvestris minor rubello flore C. B. In montibus circa Genevam.
- Rosa sylvestris rubella, parvo frutice *J. B.* In collibus circa Genevam, v. g. *la Bastie, Champe,* &c.

M. Rosa

- M. Rosa rubra milefia Plinii C. B. i. e. Rosa rubra.
The Red Rose. In vineis circa *Monteils* spontaneam
 sæpius legimus. *Bot. Monsp.*
- C. Rosa sylvestris pumila rubens C. B. sylvestris pumila
Clus. Fructus maximus & Pyri in modum turbinatus
 est. Passim in cæduis sylvis & desertis agris per totam
 Austriam & Pannoniam.
- Rosmarinus coronarius *Ger.* coronarius fruticosus *J. B.*
 spontaneus latiore folio C. B. Libanotis coronaria
 sive Rosmarinum vulgare *Park.* *Rosemary.* In Italia
 & Gallia Narbonensi in collibus saxosis propè mare
 affatim.
- Rubia angustifolia spicata *Park.* C. B. *Narrow-leaved*
spiked Madder. Circa Montpelium plurimis in locis,
 v. g. collibus juxta *Castelnau*, agris Gramontæ sylvæ
 vicinis, &c.
- Rubia marina *Ger.* *Park.* marina Narbonensium *J. B.*
 maritima C. B. *Sea-Madder.* Ad mare Mediterra-
 neum in litoribus arenosis prope Syracusas, Catanam,
 Terracinam, Montpelium.
- M. Rubia latifolia spicata C. B. spicata *J. B.* spicata
Cretica Clus. hist. Ger. emac. Spicata Cretica latiore
 folio *Park.* *Spiked-Madder.* In descensu montis
Capouladou copiosam collegit *D. Magnol*, in locis quæ
 vulgò vocant *las Rompudes*, Maio & Junio mensibus
 cum spica.
- M. Rubia spicata repens. In satis cis patibulum viæ Ca-
 stri novi. v. *Bot. Monsp.* nam *D. Magnol* de hac
 nondum satisfactum est, an sit nova species necne.
- M. Rubia montana angustifolia C. B. *prod.* Similem in-
 venit *D. Magnol*, in vervactis circa *la Valette*, & in
 luco Gramuntio.
- S. Rubia semine duplici hispido, latis & hirsutis foliis
Bocc. In Ilva sylva vidit & collegit *D. Boccone*. Sola
 foliorum hirsutie & magnitudine à Rubia semine du-
 plici hispido *J. B.* differt.
- Z. Rubia sylvestris aspera Ravennensis *Zanoni.* In syl-
 va Pineæ Ravennensi vulgò *la Pigneda* dicto pro-
 venit.

- B. *Rubia pratensis* lævis acuto folio C. B. *prod.* Apud
Valesianos in pratis ad thermas Leucenses.
- B. *Rubia quadrifolia* rotunda lævis C. B. *prod.* In
montibus Helvetiorum, ut Gothardo, & ad Eremitanos.
- B. *Rubeola saxatilis* C. B. *prod.* In saxosis Galloprovinciæ.
- B. *Rubia cynanchica* saxatilis C. B. *prod.* In saxosis
udis circa Valentiam Delphinatûs.
- Rubia lævis* Taurinensium Park. cruciata lævis Ger.
quadrifolia vel *latifolia* lævis C. B. *quadrifolia* Italica
hirsuta J. B. male. D. Willughby alicubi in Italia colle-
git, & ad nos attulit.
- Rubia echinata* saxatilis v. *Cruciata minima*. Sylvatica
lævis v. *Mollugo*.
- Ruta capraria* v. *Galega*. *canina* v. *Scrophularia*. pra-
tensis v. *Thalictrum*.
- Ruta sylvestris* Lob. sylv. major J. B. C. B. Park. sylv.
montana Ger. Wild-Bue. In Etruria non longè
ab oppido Massa spontaneam vidimus; item in colli-
bus petrosis circa Monspelium & Nemausum.
- Ruta sylvestris* minor C. B. J. B. Park. sylv. minima
Ger. *Peganium Narbonensium* Lob. In agris sterilio-
ribus non tantùm circa Monspelium, sed & per totam
Narbonensem Galliam.

S.

S Abina baccifera v. *Cedrus Lycia*.
Salix pumila Alpina *latifolia* glabra. An *Salix*
pumila latifolia prior Clus? An *Salix pumila*
folio utrinque glabro J. B? In altissimis mon-
tis Juræ cacuminibus. Descriptionem vide *Hist. nost.*
p. 1422. Sexu ut reliquæ Salices, differt: Masquæ
floreos duntaxat Julos profert, folia habet longiora &
acutiora, non minus tamen splendentia.

- C. *Salix pumila latifolia* 2. *Clusii*, *latifolia repens* C. B.
In herbosis & apertis montium jugis.
- B. *Salix saxatilis minima* C. B. *prod.* In Alpium Helvetiorum jugis.
- B. *Salix Alpina angustifolia repens* C. B. *prod.* In Helvetiorum Alpibus & monte Fracto.
- Salvia fruticosa lutea latifolia*, five *Verbascum sylvestre* quartum *Matthioli Park.* *Verbascum latis* *Salviæ* foliis C. B. *Matthioli Ger. sylv. salvifolium exoticum* folio rotundiore *J. B.* Circa *Tauromenium* in *Sicilia* copiosè.
- Salvia fruticosa lutea angustifolia*, five *Phlomos Lychnitis Dioscoridis Clusio Park.* *Verbascum angusto* *Salviæ* folio C. B. *Ger. Monipeliense flore luteo hian*te *J. B.* In collibus saxosis circa *Monspelim.*
- Sambucus racemosa rubra* C. B. *Park.* *racemosa acinis* rubris *J. B.* *racemosa vel cervina Ger. Cluster-Elder* with red berries. In Alpibus *Carinthiacis*, & in sylvis prope maximum *Carthusianorum* coenobium.
- Sanamunda prima Clus. v. Tarton rare.*
- Sanamunda tertia Clusii Ger. Park.* *Sesamoides parvum* *Dalechampii*, *Sanamunda tertia Clusii J. B.* *Thymelea tomentosa foliis Sedi minoris* C. B. In insula ad *Promont. Siciliæ* *Pachynum dictum* copiosè.
- C. *Saniculæ montanæ alterius species* 2. *Clus.* In *Snealben* vicinisque Alpibus. An *Sanicula montana minor* C. B. quæ in Alpibus *Helveticis* reperitur?
- Sanicula guttata Ger. Park.* *Alpina guttata J. B.* *montana rotundifolia major* C. B. In Alpibus *Helveticis*, inque monte *Jura & Saleva.* Duplex habetur, major & minor.
- Saponaria minor v. Lychnis.*
- S. *Saponaria frutescens acutis foliis* ex *Sicilia Beccon.* *Lychnis frutescens Myrtifolia*, *Ben albo* similis C. B. *Ben albo Offic. similis*, planta semper virens *J. B.* *Lych. sylvestris semper virens*, seu *Ocymoides arbo*reum semper virens *Clus.* Circa *Panormum & Agri*gentum inter saxa ubique erumpere monet *P. Becc. ne.*

Satureia hortensis Ger. vulgaris *Park.* durior *J. B.* montana *C. B.* ~~Winter-Savozy~~. i. e. *Satureia hyberna*, quia sci. perennis est, & fruticosa. In Gallia Narbonensi circa Monspelium, Nemausum, &c. in collibus: invenimus etiam in Hetruria in alveo cujusdam torrentis prope *Radicosani*.

Satureia æstiva hortensis Ger. hortensis *Park.* sativa *J. B.* hortensis, sive *Cunila sativa* Plinii *C. B.* ~~Summer-Savozy~~. In agris circa *Castelneuf* non longè à Monspelio copiosè.

Satureia S. Juliani Ger. spicata *C. B.* spicata *S. Juliani* *Park.* foliis tenuibus sive tenuifolia *S. Juliani* quorundam *J. B.* In collibus agri Messanensis non minùs frequens quàm in ipso monte *S. Juliani*. Vidimus & in ipsis Florentiæ urbis muris.

Col. Saxifragia alba altera bulbifera *Park.* bulbosa altera bulbifera montana *Col.* Saxifraga ad folia bulbos gerens *C. B.* Pratenfibus montium gaudet, & saxosis herbis umbrosis Campocleri & Æquicolorum.

M. Saxifraga magna *Matth.* Caryophyllus saxifragus *C. B.* In ipsis rupium fissuris montis Lupi qua Septentrionem spectat, Junio mense cum flore abundè colligit *P. Magnol.*

Saxifragia Venetorum *Adv.* Daucus Selinoides major *Park.* montanus Apii folio major *C. B.* Libanotis Alpina quorundam, aliis dicta Cervaria nigra *J. B.* Lib. Theophrasti nigra Ger. In pascuis montosis & vineis juxta Rhenum in Germania, & in collibus Genevæ vicinis copiosè.

Saxifragiæ tenuifoliæ affinis quibusdam *Caucalis J. B.* *Caucalis Peucedani* folio Ger. *C. B.* Fœniculi folio *Park.* malè inscribitur *Caucalis*. Plantam hujus iconi persimilem observavi in planitie quadam prope Augustam Vindelicorum, quâ indè Monachium Baviaræ itur.

C. Saxifraga Pannonica *Clus.* Saxifraga multifido folio *Pannonica J. B.* Daucus montanus multifido brevique folio *C. B.* montanus *Pannonicus Park.* Multis Ungariæ & Austriæ inferioris locis, montium acclivitatibus, petroso & sabuloso solo.

Scabiosa montana maxima *Park. Ger.* Alpina foliis Centaurii majoris *J. B.* maxima *Ad.* In ascensu montis Juræ non longè à præalto vertice *Thuri.* *The great-est mountain Scabious.*

Scabiosa argentea angustifolia *Park. C. B.* graminea argentea *J. B.* In planis Fori Julii depressis quæ aquæ ex Alpibus ubertim delabentes hyberno tempore aliquoties latè inundant; alveos torrentum posses dicere ni latitudo obstaret.

Scabiosa latifolia rubro flore *J. B.* montana *V.* sive latifolia rubra non laciniata secunda *C. B.* rubra Austriaca *Ger. emac.* In montibus Genævæ vicinis, inque Germanicis montosis sylvis passim luxuriat.

S. Scabiosa maritima Rutæ caninæ foliis *Bocc.* Nasce-
tur in Caietæ maritimis & arenosis litoribus.

C. Scabiosa 4. *Clus. hist.* montana latifolia non laciniata rubra & prima *C. B.* latifolia purpurante ex nigro flore *J. B.* Cum latifolia Pannonica tertia *Clus.*

C. Scabiosa montana glabro folio *Park.* montana glabra, foliis Scabiosæ vulgaris *C. B.* glabra carnosis foliis virentibus, flore ex cœruleo purpureo *J. B.* In summis Sneberg & Snealben Alpium Austriæ & Stiriæ jugis similiter in depressioribus nudisque circa Viennam collium superciliis.

Scabiosa major Pannonica albo flore seu 8. *Clus.* Circa Tirnaviam Pannoniæ Trans-danubianæ urbem provenit, atque etiam secundum ipsius urbis vallum, quâ meridiem spectat.

B. Scabiosa montana Dentis leonis folio *C. B. prod.* Mont-
spessuli in monte Calcaris *C. B.*

Col. Scabiosa minor capitulo globoso odore *C. B.* parva odorata, floris foliis maculis infectis *J. B.* In montibus Amalfæ oræ.

Scabiosa Pannonica flore albo *Park.* montana calidarum regionum major Lobelio *J. B.* montana alba *Ger.* fruticans angustifolia alba *C. B.* male fruticantem vocat. In collibus saxosis agri Narbonensis perquam familiaris. Ab hac non multum differt Scabiosa glabra foliis rigidis viridibus, ut ipsemet fatetur Lobelius: non multum dico? imò nihil omnino. Nobis etiam primo aspectu

aspectu eadem visa est, & etiamnum videtur. Cate-
rum,

Scabiosa multifido folio, flore albo, vel potiùs *ἡχερὰ λευκὰ*
f. B. multifido folio, flore flavescente C. B. flore pal-
lido Ger. *emac.* Pannonica flore albo, quoad figuram
Park. Circa Viennam Austriæ ad sepes & in pas-
cuis.

M. Scabiosa capitulis globosis, foliis in tenuissimas laci-
nias divisis C. B. In luco Gramuntio & in aliis locis
sterilibus circa Monspelium copiosè.

Scabiosa cum pulchro semine minor f. B. Hispanica mi-
nor Park. stellata folio laciniato minor five maritima
C. B. Nobis in Sicilia observata est. Huic eadem vi-
detur Scabiosa maritima parva f. B. quam copiosam
invenit D. Magnol in maritimis versùs Cetium mon-
tem.

M. Scabiosa annua integrifolia five foliis Bellidis Bot.
Monsp. ubi descriptionem vide. In segetibus eundo
à la Colombiere mense Maio florentem invenit D. Mag-
nol.

Scabiosa 10, five repens Clusii f. B. minima Bellidis fo-
lio Ger. Scab. Globulariæ Bellidis foliis Park. Bellis
montana frutescens C. B. quem justè reprehendit Parkin-
sonus quòd eam frutescere dicat. Ad radices montis
Salevæ copiosè.

Scammonea Monspeliaca dicta Park. Monspeliaca flore
parvo f. B. Monspel. foliis rotundioribus C. B. Mon-
speliensis Ger. *Scammony of Montpellier.* Ad mare
propè Monspelium. Folia rotundiora sunt quàm se-
quentis, & albidiora.

Scammoneæ Monspeliacæ affinis Park. Scammoneæ
Monspeliacæ affinis, foliis acutioribus C. B. Apocy-
num latifolium amplexicaule f. B. Cur autem lati-
folium appellat? Juxta Catanam Siciliæ urbem ad
mare.

Scolymus Theophrasti v. Cinara sylvestris.

Scandix Cretica minor C. B. Anthriscus Plinii Clus.
Cretica minor seu Anthriscus Park. Anisomarathrum
Apulum Col. *Shepherd's Needle of Candy.* In
sterilibus circa la Colombiere, & in colle Ferran, aliisque

in locis vere invenit *P. Magnol*, quæ suavem habuit odorem Anisi, imò & saporem.

Col. Scordio affinis Elephas ob florem *C. B. affin.* *Elephas Columnæ Park.* *Elephas Campoclarensum Col.* In valle Campoclarensum, locis umbrosis, frigidis & humentibus Septentrionalibus, Junio & Julio. Nos plantam hanc ad *Melampyrum rerulimus*.

Scorpioides Bupleuri folio Ger. C. B. filiqua campoide hispida J. B. *Bupleuri folio minor, pluribus corniculis asperis Park. Caterpillars.* *Messanæ* in collibus, & *Monspeli* in fossis & aggeribus ipsius arcis copiosè.

Scorpioides Telephium Anguillaræ Lob. *Scorpioides Matthioli Ger.* *Scorpioides Matthioli, sive Portulacæ folio Park.* *Telephium Scorpioides J. B.* *Telephium Dioscoridis, seu Scorpioides* ob filiquarum similitudinem *C. B.* Circa *Liburnum, Messanam, Monspelum* passim.

Scorpioides leguminosa v. Ornithopodio similis.

Scorpioides leguminosa altera J. B. In vineis & hortis ad latera montium *Messanæ* adjacentium copiosè. An hæc planta à quoquam alio proditum sit nescio.

C. Scorzonera humilis latifolia Pannonica 2. Clus. *humilis latif. Pannonica Park.* *latif. humilis nervosa C. B.* *Viperaria Pannonica Ger.* In monte *Badensibus* thermis imminenti vicinisque aliis.

C. Scorfonera humilis angustifolia Pannonica 3. Clus. *Pannonica angustifolia Ger. angustifol. 1. C. B.* *Tragopogonis species, sive Scorlonera humilis angustifolia J. B.* In *Hamburgensi* monte quâ parte glaber est, & tenui duntaxat gramine vestitus, & quâ *Austriam* spectat, inque *Prellenbergl, Leytenbergl, totaque illa catena montium à Calenberg ad Alpes* excurrentium.

C. Scorfonera major angustifolia coeruleo flore, 4. Clus. *angustif. subcoerulea C. B. elatior angustif. Pannonica Park. angustif. elatior Ger.* *Tragopogonis species, sive Scorzonera major angustif. subcoeruleo flore J. B.* Cum priore.

- Scrophularia Ruta canina* dicta *Park.* *Scr. Ruta canina* dicta vulgaris *C. B.* *Ruta canina* *Lob. Ger.* *Scroph.* 3. *Dodonæi tenuifolia*, *Ruta canina* quibusdam vocata. *Dogs=Blue*, *Figwort* so called. Ad Rheni ripas propè Basileam se primò nobis obviam dedit, deinde in Italia, Gallia Narbonensi & circa Genevam.
- Scrophularia folio Urticæ C. B.* peregrina *Park.* flore purpureo *Camerarii J. B.* Circa Pisas copiose in muris ipsius urbis & alibi in Italia.
- B. *Scrophularia palustris* non foetida sive aquatica minor *C. B.* foemina *Cam. ep.* palustris minùs foetida caule alato *Cat. Ald.* *Betonica aquatica Septentrionalium* species minor *Lob. obs.* *The lesser Water-Betony.* Circa Basileam, item circa Altdorsium in fossis pratorum post domum piscatoris & palustribus sub *Reicheneck* Maio & seq.
- B. *Scrophularia* flore luteo *Ger. C. B. Park.* montana maxima *Col.* lutea magna, amplis foliis *J. B.* *Lamium Pannonicum* alterum seu exoticum *Clus.* In valle *Campoclarensum*, atque etiam supra *Matesium* collegit *Columna*, in umbrosis *Septentrionalibus* nivosis.
- Securidaca major articulata Park.* dumetorum major, flore vario, siliquis articulatis *C. B.* *Melilotus quinta Tragi J. B.* Ad agrorum margines in Germania passim.
- Securidacæ* genus triphyllon *J. B.* *Fœnum Græcum sylvestre* alterum *polyceration C. B.* *Fœnum Græcum sylvestre Ger. Park.*
- C. *Securidaca lutea major C. B.* flore luteo, siliqua lata oblonga *J. B.* *Hedysarum majus Ger. majus*, seu *Securidaca major vera Park.* Inter legetes in Hispania *Clus.* Habetur etiam in agro Romano. *Cat. Rom.*
- Securidaca minor Lob.* minor lutea *Ger. emac.* altera sive minor *J. B.* lutea minor, corniculis recurvis *C. B.* *Hedysarum minus* sive *Securidaca minor Park.* *The lesser Hatched Cutch.* In collibus circa *Messanam* & *Monspelim.* Hæc planta pro *Altragalo Monspesulano* à nonnullis habita est, ob iconum transpositionem apud *Lobelium* & *Clusium*.

B. *Securidaca dumetorum minor pallidè coerulea* C. B.
Ger. Securidacæ secundæ altera species seu Securidaca
Pennæi Clus. In dumetis & monte Crentzacho. *Cat.*
Bas. item in agro Genevensi, non procul à Ponte tremulo, inter dumeta.

Securidaca filiquis planis dentatis *Ger. filiquis planis utrinque dentatis* C. B. peregrina Clusii *Park.* *Lunaria radiata* Robini *J.B.* Floribus est purpurascens, filiqua Serræ piscis rostrum referente. In lingula illa inter Zancleum portum & Fretum Siculum procurrente, & alibi circa Messanam in Sicilia.

Sedum majus vulgare C. B. *J. B. Park.* *Sempervivum majus* *Ger. Houfleeck.* In summis jugis montis Juræ, inque Alpibus Sabaudicis, Helveticis, &c.

C. *Sedum majus montanum foliis non dentatis, floribus rubentibus* C. B. mont. latifolium flore purpureo *J. B. majus angustifolium* *Park. Ger. Cotyledon altera tertia Clus.* In Taurinarum Alpium jugis non procul Salzburgo, Julio.

Col. *Sedum rubrum tomentosum* *Park.* montanum tomentosum C. B. *Sempervivum rubrum montanum* *γναφαλῶδες Col.* In Æquicolorum montibus, jugis altissimis, nudis, saxosis; supra montem Flaminianum, vulgo *le Serrone*.

Sedum ferratum *J. B. Cotyledon media foliis oblongis ferratis* C. B. *Umbilicus Veneris minor* *Ger.* In montibus Tyrolensibus & Helveticis, itemque in Jura & Saleva Genevæ vicinis.

Sedum ferratum alterum foliis longis angustis. An *Sedum Pyrenæum ferratum longifolium* *Hort. Blas?* an *Sanicula montana longifolia ferrata* C. B? an *Sedum ferratum majus foliis trium quatuorve unciarum?* Invenimus in Alpium præruptis, non longè à Ponteba, postea in horto Regio Parisiensi cultum vidimus.

Sedum minimum Alpium villosum *Park.* Alpium 4. Clusii *Ger. emac.* Alpium hirsutum lacteo flore C. B. *Chamæiasme Alpina* *J. B. Tom. 3. Append.* In altissimo vertice montis Juræ *la Dolaz* dicto. Flores gerit velut in umbella. Flos autem candidus ætate rubescit, dum recens odoratissimus est Jasmini instar.

J. Bauhinus

J. Bauhinus veniendo Tiguro Burmum invenit : Clusius in Sneberg & vicinis jugis.

Sedum parvum folio circinato flore albo *J. B.* minus folio circinato *C. B.* *Vermicularis* dasphyllus *Park.* Circa Genevam, Monspelium, &c. in muris & rupibus copiosè.

Sedum echinatum vel stellatum longifolium flore albicante. *Cepæa* altera sive secunda *Cas.* In mulcosis sepium aggeribus non longè à Genevâ, secus viam quæ inde ad oppidum *Jay* ducit, *Messanæ* quoque similibus in locis invenimus.

Sedum Aparines facie Tauromenitanum. Radix huic parva, fibrosa. Folia prima seu ad radicem subrotunda denso cæspite terram operiunt, & nonnihil similia sunt foliis illis foeniculi aquatici stellati quæ summis aquis innatant. Caulis teres, subhirsutus quem ad intervalla ambiunt folia Aparines foliis non dissimilia, eodémque modo circa caulem ad genicula stellatim sita, excepto quòd in hac planta non plura quatuor observaverim folia ad eundem nodum. Hinc emergunt racemuli flosculorum hexapetalorum è rubro albicantium, stellæ in modum expansorum. In summis caulibus non inveniuntur illæ foliorum corollæ, verum è singulorum foliorum sinubus singuli florum racemuli exeuntes caulem conscendunt. Florum petala perangusta in acutam spinulam desinunt.

Hæc etiam planta ad *Cepæam* accedit.

Sedum echinatum flore luteo *J. B.* Circa Portum Veneris & alibi in Italia.

Sedum Alpinum hirsutum luteum *C. B.* petræum *Ger. Lob.* petræum montanum luteum *Park.* Phyllon thelygonon Dalechampio *J. B.* In monte Saleva Genevæ vicino. Leucoium luteum aizoides montanum *Col.* Sedum minus 12. Alpinum 6. *Clus.* In monte Richenstein *Cat. Bas.*

C. Sedum minus 9. sive Alpinum 3. *Clus.* Alpinum minimum, foliis cinereis, flore candido *J. B.* Alpinum album foliolis compactis *C. B.* minimum Alpinum muscoides *Park.* Alpinum 3. *Clusii Ger. emac.* In Baldo, Braulio & Monte fracto sive Pilati, inque præruptis Snealben, & Sneberg locis inter saxa.

Sedum

- Sedum montanum* minimum non acre flore purpurascens parvo. Hæc etiam semine est stellato. In altissimis rupibus montis Juræ.
- Sedum* minimum non acre, totum rubrum, flore hexaphyllo purpureo. Catanzæ in muris & tectis copiosè.
- Sedum* medium flore albo, staminibus apices luteos gestantibus. In muris quibusdam prope Messanam Siciliæ.
- Sedum* quoddam flore albo quadrifolio, propè Voltagium in territorio Genevensi in rupibus copiosè nascens in notis meis invenio. Verùm suspicor errorem aliquem fuisse nam Seda omnia vel hexapetala sunt, vel pentapetala.
- Sedum tridactylites* Alpinum minimum hirsutum nobis. tridactylites Alpinum minus C. B. Monspeliense & Pyrenæum laciniatum Park. In montium Lupi & Calcaris rupibus v. Hist. nost. p. 1043.
- B. *Sedum tridactylites* Alpinum majus C. B. prod. E monte Baldo. v. Ponam. Hujus tres recentet varietates C. B. p. 131. Sedi tridactylitis majoris speciem ramosam inter plantas meas siccas invenio.
- B. *Sedum montanum* ericoides C. B. prod. Alpinum ericoides purpurascens. Ex Horto Dei habuit C. B.
- B. *Sedum saxatile* hirsutum purpureum C. B. Park. Ex Pyrenæis.
- B. *Sedum saxatile* atro-rubentibus floribus C. B. Park. cum priore.
- B. *Sedum saxatile* variegato flore C. B. prod. Park. Inter Valesiam & Augustam vellent in monte Sletsburg.
- B. *Sedum* Alpinum foliolis crenatis asperis C. B. In ascensu montis S. Bernardi majoris & Gothardi.
- Col. *Sedum* Alpinum T. Gregorii Rhegiensis 1. Col. Alp. exiguis foliis C. B. Sui generis planta est.
- S. *Sedum* Siculum maritimum vermiculatum, flore Saxifragiæ albæ, semine villoso Boccon. Frutescit ut plurimum Thymi capitati modo, ad Granarium Agrigentinum.

M. *Sedum Alpinum* flore pallido C. B. *Park.* parvum montanum luteum *J. B.* *Alpinum primum Clusii Ger. emac.* Provenit in monte Baldo, in monte Pilati & Gothardo : in descensu montis *Capouladou* non procul Monspelio Julio mente florens : in Sneberg & aliarum Stiriacarum Alpinum jugis.

M. *Sedum annuum* minimum stellatum rubrum *Bor. Monsp.* ubi iconem & descriptionem ejus vide. In ingressu luci Gramuntii sub ilicibus cum musco sæpius vidit *Magnol.*

B. *Sedum arvense* flore rubente C. B. In agris circa Huningen non longe à Basilea. *Cat. Basil.*

B. *Sedum Alpinum* gramineo folio, lacteo flore C. B. minimum Alpinum gramineo folio *Park.* minus 11. *Clus.* In monte *Wasserfall* : In Sneberg & vicinis jugis. *Clus.*

A. *Sempervivum* minus vermiculatum insipidum C. B. *Aizoon* minimum alterum insipidum *Cerde.* *Vermicularis* insipida *Thal & Eystet.* *Insipid small Sengreen or Wall-Hepper.* A priore non solum gustu differt, sed etiam foliolis longioribus, teretioribus, tenuioribus & à caule reflexis. *Cat. Altd.*

Senecio folio non laciniato *J. B.* folio non laciniato *Myconi Park.* VI. seu folio non laciniato C. B. *Groundsel with undivided leaves.* Inter oppidum *Rot & Norimbergam* Germaniæ urbem observavimus : Eandem etiam Messanæ in ascensu montium observavi.

C. *Serpyllum angustifolium* glabrum C. B. Pannonicum *Clusii Park.* angusto folio, odore nucis Juglandis, vel nullo *J. B.* angusto glabròque folio *Clus.* Cum sequenti.

C. *Serpyllum* angusto lanuginosòque folio *J. B.* angustifolium hirsutum, vel montanum repens hirsutum C. B. hirsutum *Ger.* *Serpylli* Pannonici *Clusii* varietas altera *Park.* In Ungaria, Austria & Moravia mixtim cum vulgari *Serpyllo.* In squalidis & incultis vix montis *Lupi* copiose.

Seseli Ethiopicum Salicis folio C. B. *Ethiopicum* fruticosa *Park Ger.* *Ethiopicum* fruticosum, folio *Periclymeni J. B.* *Ethiopian Shrub Hartwrot.* In rupibus

- pibus oppido *S. Chamas* in Gallo-provincia vicinis:
item in Promont. Ceti tum prope stagnum tum ver-
sus mare.
- H. Sefeli palustre lactescens *C.B. Park.* palustre lactescens
acre, foliis ferulaceis, flore albo, semine lato *J. B.*
Cat. Holl. Commel.
- B. Sefeli montanum *Cicutæ* folio subhirsutum *C.B. Park.*
In monte *Wasserfal* propè *Scaphusiam*.
- C. Sefeli montanum *Cicutæ* folio glabrum *C. B. Park.*
Alpinum sive montanum 1. *Clusio*, folio splendente,
flosculis albis *J. B.* montanum majus *Ger.* In celsis
Sneberg & aliarum *Austriæ* Alpium jugis.
- C. Sefeli 2. montanum *Pannonicum Clus.* Valde bonæ
nomine missa *Libanotidis* secundæ quorundam sive *Cer-*
variæ nigræ species *J. B.* *Daucus* montanus *Apri* fo-
lio albicans *C. B.* *Daucus* *Selinoides* maximus *Park.*
In omnibus *Pannoniæ* & *Austriæ* inferioris montibus,
aspero solo ventisque perflato.
- C. Sefeli montanum angustifolium 3. *Clusii*, folio Sefeli
Massiliensis Matthioli, semine *Angelicæ J. B.* monta-
num *Foeniculi* folio *C. B.* In plerisque *Austriæ* & *Sti-*
riæ montanis pratis.
- Sefeli *Creticum* minus v. *Caucalis* minor pulchro semine.
Massiliensium v. *Foeniculum* tortuosum. *Officinarum*
v. *Siler* montanum.
- Sideritis* *Montspessulana J. B.* *Scordioides Ger.* *Mon-*
speliensis Scordioides Lob. *Montspeliensis Lobelii*
Park. foliis hirsutis, profundè crenatis *C. B.* *Montspeli*
circa patibulum copiosè, & alibi etiam *aux Gar-*
rigues.
- Sideritis* vulgaris *Ger.* vulgaris *Clusii Park.* vulgaris hir-
suta *J. B.* vulgaris hirsuta erecta *C. B.* *Common*
Iron-wort. Per *Germaniam*, *Italiam*, & *Galliam* in
agrorum marginibus vulgarissima.
- C. *Sideritis* hirsuta vulgaris humilior *C. B.* *Sid.* secunda
Clusio capitato flore *J. B.* In agris & inter segetes,
multis *Pannoniæ* & *Austriæ* in locis.
- C. *Sideritis* hirsuta pallido flore *C.B. angustifolia Ger.* *Ger-*
manica parva Park. 6. *Pannonica Clus.* flosculis vix è
vasculis prominentibus fuscis *J. B.* In *Pannoniæ* *Au-*
*striæ*que

strizque inferioris arvis inter segetes, macro & sterili solo.

Col. Sideritis montana parvo varióque flore C. B. montana Apula versicolor *Park.* montana parva, flore nigro-purpureo, medio croceo *Col.* In sterilibus & saxosis *Æquicolorum*, supra Capuccinorum sylvulam.

Sideritis genus verticillis spinosis *J. B.* An Sideritis s. *Clus?* In Italia & Gallia Narbonensi in agris & locis ficcioribus frequens occurrit.

Sideritis Valerandi Dourez brevi spica *J. B.* Alpina Hyssopifolia *Ger.* C. B. montana Hyssopifolia *Park.* In monte *Thuir.* Attendantur figura & descriptio *J. B.* Nam aliorum neque figuræ, neque descriptiones per omnia quadrant.

M. Sideritis Salviæ folio *Donati.* *Park.* *Hort. Blas. auct.* Æstate florentem vidit *P. Magnol* in maritimis sabulosis inter *Perauls* & *Mangio*, *Bot. Monsp.*

Sideritis Hyssopifolia seu folio angustissimo caule rubro. In Etruriæ maritimis & circa Florentiam.

Sideritis pratensis lutea v. *Euphrasia pratensis lutea.*

Sigillum Solomonis v. *Polygonatum.*

Siler montanum Officinarum *Lob.* *Ger.* Sefeli seu Siler montanum vulgare *J. B.* Siler montanum vulgò Sefelios *Park.* Ligusticum, quod Sefeli Officinarum C. B. In Jura & Saleva montibus propè Genevam, inque Alpibus *Pontebæ* vicinis.

B. Ligusticum five Siler montanum angustifolium C. B. *prod. Park.* Prope oppidum *Stain* Austriæ. *Burserus.*

Silqua arbor five Ceratia. *J. B.* Silqua edulis C. B. dulcis seu vulgatio *Park.* Ceratia filiqua five Ceratonia *Ger.* In Sicilia & sponte & copiosè provenit: item in Regno Neapolitano, via à Neapoli ad Romam. Officinis *Caroba* dicitur hæc arbor, Germanis Panis S. Joannis, (Baptistæ sci.) Rectiùs panis Prodigii Evangelici diceretur. *The Carob-Tree.*

Sinapi Genevense sylvestre *J. B.* Siliquam habet tenuem longissimam. In alveo fluvii *Arve* propè Genevam copiosè.

Sinapi agreste flore purpureo *J. B.* umbellâ purpureâ *C. B.* agreste Neapolitanum *Park* alterum agreste nostras *Col.* In agro Neapolitano, in valle supra ædem S. Mariæ vitæ inter rubos, Martio & Aprili.

Sinapi echinatum v. *Eruca echinata.*

B. Sinapi parvum filiqua aspera *C. B. prod.* Circa Monspelium. Inter Lateram & Perauls in humidis *Magnol.*

S. Sio minimo Alpini affinis filiquis latis *Bocc.* Nascitur in *Madonia* monte in *Sicilia* veteribus *Nebrode* dicto.

Silon *Alpin. exot.* Prope Gratianopolim in planitie ad flumen solo arenoso invenimus plantam cui Alpini descriptio apprimè quadrat.

Col. Sisyrrhynchium Theophrasti *Col.* minus angustifolium *C. B.* Per viarum margines herbidos *Cirinolæ Col.*

Col. Sisyrrhynchium alterum latifolium *Col.* minus latifolium *C. B.* Viâ qua ad Acquamenam vineam itur inter Orchides sphegodes.

Col. Sisyrrhynchium Asprensium angustifolium *Col.* minus angustifolium, flore majore variegato *C. B.* In Castro *Aspra* dicto in Sabinis, olim *Casseries* appellato.

Smilax aspera *Lob. Ger. J. B.* aspera fructu rubente *C. B. Park. Prickly-Whinweed.* In *Sicilia*, Italia & Gallia Narbonensi in sepibus passim.

Smyrnum *Lob. Creticum Ger. Park.* Creticum perforiatum *J. B.* peregrinum rotundo folio *C. B.* In *Sicilia* ad *Punto Cerciolo.*

Solidago Saracenica *Dod. Lob.* Saracenica vera Salicis folio *Park.* Virga aurea angustifolia ferrata *C. B.* aurea angustifolia ferrata, seu *Solidago Saracenica J. B. Saracens Confound.* In fossis & umbrosis aggeribus prope Argentoratum & alibi in Germania, inque summis jugis montis Juræ ad scaturigines aquarum.

Solanum halicacabum v. *Alkekengi.*

Solanum vulgare sive *Officinarum* acinis luteis. *Common Nightshade with Yellow Berries.* Circa Florentiam in Italia & Monspelium in Gallia Narbonensi in vineis. Hanc baccarum differentiam *Matthiolus* etiam olim observavit.

- Soldanella Alpina quibusdam *J. B.* Alpina major & minor *Park. Ger. emac.* Alpina rotundifolia *C. B.* In monte Jura & Alpibus Sabaudicis copiosè,
C. Soldanella Alpina minor *Clus.* Alpina folio minùs rotundo *C. B.* In Austriæ & Stiriz Alpibus.
B. Sonchus montanus lævis laciniatus minor *C. B. prod.* In montibus Euganeis frequens.
M. Sonchus asper laciniatus Creticus *C. B. Park.* Chondrillæ Creticæ nomine missa semine crispo *J. B.* In humidis herbidis locis circa Monspelium passim oritur. *Bot. Monsp.*
M. Sonchus angustifolius maritimus *C. B. prod.* In maritimis Monspeliensibus inter juncos copiosè repit, & Augusto mense floret. *Bot. Monsp.*
Sonchus lanatus Dalechampii J. B. villosus luteus major *C. B. Park.* Circa Messanam & Monspelium copiose in saxosis & apricis. Hieracii potiùs quàm Sonchi species est.
B. Sonchus villosus luteus *C. B. prod. Park.* rectius Hieracium tomentosum minus. Monspelii in luco Gramuntio *C. B.* Nos circa Messanam Siciliæ alteram Sonchi lanati speciem à lanato *Dalechamp.* diversam & minorem invenimus, foliis tamen (quantum memini) non laciniatis.
Sonchus cœruleus latifolius J. B. lævis laciniatus cœruleus sive Alpinus cœruleus *C. B.* Alpinus cœruleus *Park.* Blue mountain Sowthistle. In monte Jura in sylvosis, inque montibus maximo Carthusianorum cœnobio vicinis.
Sonchis affinis Terracrepola J. B. lævis angustifolius *C. B. Ger. emac. Park.* Herba quæ nobis Monspelii pro Terracrepola ostensa fuit similis erat figuræ istius plantæ quam *J. Bauhinus* Chondrillis affinem aliquam laciniatam, an Trinciattellam nuncupat, cui etiam icones Terracrepolæ apud *Lobelium, Gerardum & Parkinsonum* bene respondent. Figura quam dat *J. Bauhinus* pro Terracrepola vitiosa est, facta ad malam figuram *Crepididis Dalechampii* apud *Lugd.* Monspeliensibus in acetariis frequens hujus usus est.

B. A. *Sonchus sylvaticus palustris major & minor Jungermanni Cat. Altd.* *Sylvaticus 3. Tab. Soncho affinis Lampfana sylvatica C. B. foliis integris, supina parte incanis. In sylva circa Huningen. Cat. Bas.* In sylvis umbrosis Pfaffenthalii & editioribus udis. M. Jul. & seqq. *Cat. Altd.*

† *Sorbus domestica Lob. legitima Park. sativa J. B. Sorbus J. B. Fer. The true Service-Tree.* In montibus supra Messanam spontaneam vidimus. In alsiosis montibus ad Rhenum, neque non sylvis Mediomatricum ad fluvios Saram & Bilsam dictos admodum familiaris est, autore Trago.

Sorghum v. Mica.

C. *Spartum Austriacum pennatum Clus. Austriacum Ger. Gramen sparteum pennatum C. B. pennatum aliis sparteum J. B. plumarium Park.* In monte Badensibus thermis imminente, &c. v. *Clusium.*

Spartum maximum maritimum Hollandicum spicâ Secalinâ. In arenosis ad vicum Schevelingam uno infra Hagam Comitum milliari.

Speculum Veneris Ger. Veneris majus Park. Avicularia Sylvi quibusdam J. B. Onobrychis arvensis, seu Campanula arvensis erecta C. B. Venus's Looking Glass. In Germania, Italia & Gallia Narbonensi, inter segetes passim.

Spartium arborescens v. Genista Hispanica.

B. *Sphondylium Alpinum glabrum C. B. J. B. Park. In monte Wasserfall.*

Sphondylium Alpinum parvum C. B. J. B. Park. Ex Austria Alpibus habuit C. Bauhinus.

C. *Spiræa Theophrasti Clus. Ger. Sp. Theophrasti fortè Clusio J. B. Park. Frutex spicatus, foliis Salignis serratis C. B. Brigâ Silesiæ ad Clusium missus est.*

M. *Staphis agria Matth. J. B. C. B. Ger. Park. Stabel-acre or Louse-wort, i.e. pedicularis quia pediculos interimit. In sabulosis inter pontem Castrî novi & lucum Gramuntium sed rariùs invenit P. Magnol, circa pagum Affas copiosius. In opacis in Istria, Dalmatia, Apulia & Calabria.*

Stoebe Salmantica prima Clusii *Park.* Salmanticensis prior Clusio seu Jacea Intybacea *J. B.* argentea major *Ger.* major, foliis Cichoraceis mollibus lanuginosis *C. B.* Circa Monspelium passim, nec minus frequens in Sicilia & Italia.

Stoebe calyculis argenteis *C. B.* argentea minor *Ger.* Salmantica argentea, sive tertia Clusii *Park.* Scabiosa squamata argentea *J. B.* *Silber-Anapweed.* In Italia prope Tropiam Calabriae urbem & alibi.

C. Stoebe Austriaca humilis *Clus.* incana Cyano similis tenuifolia *C. B.* Austriaca humilior *Park.* In collibus & montibus Viennae urbi vicinis.

Stoebe major calyculis non splendentibus *C. B.* Austriaca elatior *Park.* Centaurii majoris species tenuifolia *J. B.* In Germania, Italia & Gallia Narbonensi frequens: in locis *Garrigues* dictis circa Monspelium copiose.

Stoechas citrina Germanica latiore folio *J. B.* Elichryson seu Stoechas citrina latifolia *C. B.* Amarantus luteus latifolius *Ger.* *Broad-leaved German Stoechas* or *French Lavender.* In sterilioribus prope Rhenum supra Coloniam Agrippinam plurima.

Stoechas citrina tenuifolia Narbonensis *J. B.* Elichrysum seu Stoechas citrina angustifolia *C. B.* Stoechas citrina seu Amarantus luteus *Ger.* Chrysocome seu Coma aurea & Stoechas citrina vulgaris *Park.* Circa Monspelium & alibi in Gallia Narbonensi vulgarissima.

Stoechas citrina altera tenuifolia sive Italica *J. B.* Elichrysum foliis oblongis Stoechadi citrinae similis *Dod.* *C. B.* In montosis Liguria non procul Gavia oppido territorii Genuensis & alibi.

Stoechadi citrinae alteri inodora Lobelii affinis capitulis brevioribus *J. B.* Heliochryso sylvestri flore oblongo similis *C. B.* Stoechas citrina sylvestrior *Park.* In muris & rupibus prope Messanam Siciliae urbem copiose provenit.

Hujus aliam speciem observavimus prope Tolonam Provinciae portum, foliis longioribus, angustioribus in caule crebrioribus, supernè pallidius virentibus;

tibus, subtus minus incanis, uti sunt & caules. Chrysocome peregrina altera seu r. *Clus.* ab hac nostra differt, quod multos flores in ramulorum fastigiis gestat; cum nostra singulos tantum, eosque majores quam vulgaris Chrysocomes.

Stoechadi citrinæ affinis, capitulis parvis, raris, squamosis, in pappos evanescentibus *J. B. v. Chrylcome.*

Stoechas citrina altera inodora *Lob.* Helichrysum sylvestre flore oblongo *C. B.* Stoechas purpurea odorata *Park.* In Ilicetis cocciferis *Sommieres* inter & Monspelium. Ego cum *J. Bauhino* hanc plantam Stoechadi purpureæ *Pilleterii* eandem esse existimo; neutram autem hujus loci esse.

Stoechas five Spica hortulana *Ger.* vulgaris *Park.* purpurea *C. B.* Arabica vulgò dicta *J. B.* *Stricadove* or *Castidony*, *French Lavender.* In sylvâ Gramontia & alibi circa Monspelium. Observavimus etiam medio circiter itinere inter Arelatē & Monspelium.

M. Stoechas Arabica cum ligulis albis *Bot. Monsp.* An Stoechas latifolia flore albo *C. B.?* Circa pagum dictum *Pignan* quâ inde redeundo itur versus pagum *S. Fordi*, in sterilibus locis, & lapidosis vinearum marginibus. *V. Bot. Monsp.* Præcedentis varietas est.

Styrax arbor *Ger. J. B.* Sty. arbor vulgaris *Park.* Styrax folio Mali cotonei *C. B.* *The Storax-Tree.* Circa Tusculum in sylvis & sepibus copiosè; ubi & *Cæsalpinus* eam olim observavit.

Suber latifolium *J. B. Ger. Park.* latifolium perpetuò virens *C. B.* *The broad-leaved Cork-Tree.* Itinere à Neapoli ad Romam observavit & ad nos attulit *D. Willughby.*

T. Succisa Alpina Globulariæ foliis *Triumf.* In salubrosis nudisque celebrem Centauri hortum circumvalantibus.

T. Succisa angustifolia palustris *Triumf.* Uliginosa loca ac umbras expetit.

Sumach *v. Rhus.* Symphytum maculosum *v. Pulmonaria* maculosa.

M. Symphy-

- M. *Symphytum majus tuberosa radice* C. B. *Knobby-rooted Comfrey*. Circa Monspelium unà cum vulgari *Consolida*. *Symph. tuberosum* J. B. *Ger. Park.* In omnibus Austriæ & Pannoniæ sylvis in umbrosis.
- Sysirhynchium majus* *Ger. Clus. Park.* majus flore luteâ macula-notato C. B. Iridi bulbosæ affine *Sysirhynchium majus* J. B. *The greater Spanish Nut.* In lingula illa inter Fretum Siculum & portum Messanensem percurrente, inque insula ad Promontorium Pachynum; utrobique copiosè.

T.

T *Amarix* five *Tamariscus* v. *Myrica*.
Tanacetum inodorum *Park.* non odorum *Ger.*
montanum inodorum minore flore C. B. *album* J. B. *Unsavory Tansie, or Tansie-leaved Or-Gee.* In colle la Bastie prope Genevam & ad Rhodani ripas.

C. *Tanacetum inodorum primum* *Clus.* inodorum flore majore C. B. In omnibus utriusque Pannoniæ & Austriæ montibus humilioribus, & cæduis sylvis. In montibus Francofurto vicinis, & quâ Septentrionem spectat oppositis.

Hæc planta florem habet radiatum *Bellidis* majoris æmulum, ideoque & quòd nec *Tanaceti* odorem habeat, rectius ad *Bellides* refertur, & *Bellis leucanthemos Tanaceti* folio à *Morisono* denominatur.

Tarton raire Gallo-provinciæ *Lob. Ger.* *Massiliensis* *Park.* *Massil. Sanamunda* r. *Clusio* J. B. *Thymelæa* foliis candicantibus, *Serici* instar mollibus C. B. In rupibus maritimis non longè à Salerno.

C. *Telephium purpureum majus* C. B. floribus purpureis *Ger. Anacampteros purpurea* J. B.

Telephium scorpioides *J. B. v. Scorpioides.* Terræ glandes *v. Chamæbalanus leguminosa.*

Terebinthus *Ger. J. B. vulgaris C. B. angustiore folio vulgarior Park. The Turpentine-Tree.* Circa Monspelium in sylvis Gramontia & Valena: invenimus etiam in Etruria.

Terebinthus major Pistaciæ folio Ad. latifolia Ger. Park. The broader leaved Turpentine-Tree. In sylva Valena propè Monspelium. Ast non tantum folia latiora & rotundiora habet quàm vulgaris *Terebinthus*, sed & fructum duplo aut triplo majorem, ut affirmat *D. Magnol*, quicquid dicat *Lobelius. V. Bot. Monsp.*

Teucrium C. B. majus vulgare Park. latifolium Ger. Teucrium multis J. B. Tree Germander. In Sicilia & Italia perquam familiare est. Reperitur etiam circa Monspelium in saxosis ascendendo ad montem Lupi, &c.

Teucrium Bæticum Ger. Baticum & Creticum Clusii J. B. Teucr. Baticum, & Teucr. Creticum Park. Nam putamus hæc duo non differre specie: peregrinum folio sinuoso *C. B. & Creticum incanum ejusdem.* Prope Syracusas, in insula ad promont. Pachynum, circa Puzallu, & alibi in Sicilia. Invenit *D. Willughby* in Italia, itinere à Neapoli ad Romam.

Teucrium Alpinum inodorum magno flore C. B. prod. Alpinum inodorum Park. In monte majore S. Bernhardi & Augusta valle. *Teucrium foliis Scorodoniæ C. B. pro eadem specie habet.*

Teucrium majus Pannonicum i. e. Chamædrys falsa maxima v. Veronica.

Alpinum Cisti flore v. Caryophyllata.

Thalictrum angustissimo folio Park. pratense angustiss. folio C. B. prod. Ad fluvium Lycum prope Augustam Vindelicorum in Germania, item in pratis Michelfeldensibus prope Basileam.

B. Thalictrum minimum foetidissimum C. B. prod. J. B. Park. In Valesia reperitur.

Thali-

Thalictrum majus Hispanicum *Ger. emac.* majus album Hispanicum *Park.* majus folliculis angulosis, caule lævi *℞. B.* majus florum staminulis purpurascens *C. B.* *Great Goats-Rue* or *Spanish Columbines.* In sylvis montis Juræ circa *Thuiri.*

M. Thalictrum pratense maximum *Monspeliensium* asperioribus foliis *Hort. Reg. Blas.* An *Thalictrum pratense* elatius, longioribus & magis atris foliis, & quodammodo splendentibus *Clus?* In pratis ad lævam parùm ultra Lateram fitis abundat, Junio & Julio florens. *Bot. Monsp.*

Thapsia latifolia Messanensis. An *Thapsia latifolia Clusii* *Ger?* latif. *Clus.* flore luteo, semine lato, similis *Seseli Peloponnesii Lobelii* *℞. B?* latifolia Hispanica *Clusii Park?* *Messanæ* in lingula Fretum Siculum & portum intercurrente. *Petrus Castellus* in *Cat. Messan.* hanc *Thapsiæ* speciem à *Garganica*, & à descriptis à *Clusio* diversam, esse fidenter affirmat, quam *Messanenses* *Ferulazzam*, i.e. *Ferulaginem*, vocant, sed acerrima est, & vera *Thapsia*, cujus radices sunt *Turbith Catanensium.* Caulis crassus est, non assurgens ultra cubitum. Imperatus *Messanenses* pro *Turbith* hæc plantâ uti notat, quod *Castellus* non confirmat.

B. Thapsia sive *Turbith Garganicum* semine latissimo *℞. B.* In monte Virgineo *Campaniæ* & *Gargano* *Apuliæ.* *Imper.*

Thlaspi clypeatum Hieracifolium majus Park. biscutatum asperum *Hieracifolium*, & majus *C. B.* clypeatum *Lobelii Ger.* *Lunaria biscutata* *℞. B.* In *Germania*, *Italia*, *Sicilia* & *Gallia* frequens.

Thlaspi minus clypeatum Ger. clyp. minus *Serpylli folio Park.* clyp. *Serpylli folio C. B.* *Lunaria peltata minima*, quibusdam ad *Thlaspi* referenda *℞. B.* Circa *Monspelim*, sed rarius occurrit. Capsulâ est monospermâ.

Thlaspi Candia Ger. umbellatum *Creticum Iberidis folio C. B.* *Creticum* quibusdam flore rubente *℞. B.* *Candy-Tuft.* In dumetis montosis propè *Salernum* in Regno *Neapolitano*, & *Viterbum* in *Etruria.*

Thlaspi umbellatum arvense amarum *J. B.* *umbellatum* arvense Iberidis folio *C. B.* *Park.* amarum *Ger.* Inter segetes in monte Saleva, necnon circa *Thuir* duabus à Geneva leucis copiose.

Thlaspi umbellatum Nasturtii folio Monspeliacum *C. B.* *Park.* *umbellatum* Narbonense *Ger.* *umbellatum*, tenuiter diviso folio, amarum Narbonense Lobelii *J. B.* In agris Castri novi Monspelio vicinis, & alibi circa urbem. Persimile est præcedenti, diversum tamen, siquidem minus est, & foliis minoribus, tenuius dissectis.

Thlaspi spinosum *Ger.* spinosum fruticosum *Park.* *C. B.* Leucoium spinosum sive *Thlaspi spinosum* aliis *J. B.* *Dicty Shrub-Dustard.* In summis rupibus montis Lupi non longe à Monspelio, Maio mense florens.

Thlaspi capsulis sublongis incanum *J. B.* fruticosum incanum *Ger.* *C. B.* incanum Mechliniense *Park.* In agro Romano abundat, ad hyemem usque florens.

Thlaspi Narbonense Centunculi angusto folio *Ad.* Narbonense Lobelii *Ger.* Nasturtium vel *Thlaspi maritimum* *J. B.* *Thl. Alysson* dictum maritimum *C. B.* Ad mare Mediterraneum ubique feré.

Thlaspi minus quibusdam, aliis *Alysson minus* *J. B.* *Alysson* dictum campestre minus *C. B.* arvense minus luteum *Park.* Græcum *Lob.* Circa Genevam in glareosis passim, atque etiam circa Moguntiam & Monspelim, Singulare est in hac specie quòd folia calicis retineat, nec abjiciat unà cum flore, ut reliquæ omnes tetrapetalæ filiquosæ & capsulatæ solent.

M. Thlaspi Alysson dictum minus, capsulis majoribus rotundis non foliatis *Bot.* *Monsp.* *Thlaspi montanum* luteum *J. B.* *montanum* incanum luteum Serpylli folio majus *C. B.* *Ionthlaspi* luteo flore incanum montanum *Col.* Invenit C. Bauhinus prope Basileam, circa *Burfecken* supra rudera in monte. Differt à præcedente quòd calicis folia abjiciat.

Thlaspi oleraceum *Tab.* rotundifolium *Ger.* arvense perfoliatum majus *C. B.* Bursa pastoris foliis Perfoliata *J. B.* Circa Bresciam in Lombardia, Alexandriam in agro Pedemontano ; & Genevam in Gallia, in glareosis & inter segetes.

C. Thla-

C. *Thlaspi arvense perfoliatum minus C. B. perfoliatum minus Park. minus Clusii Ger.* In petris & siccis quibusdam, umbrosis tamen, Austriae collibus. Q an differat specie à præcedente ?

B. *Thlaspi Vaccariae folio, Bursæ pastoris siliquis C. B. prod.* In horto Dei non longè à Monspelio.

B. *Thlaspi Vaccariae incano folio minus C.B. Park.* In agris Monspeliensibus repens, prope Massiliam paulò majus & erectius. Circa Monspelium in sylva Valena, via qua itur ad pagum *Viols. Magnol.*

M. *Thlaspi villosum capsulis hirsutis C. B. prod.* Monspeffuli in luco *la Colombiere*, sed abundantius in Valena sylva. *Bot. Monsp.*

Thlaspi Alpinum minus capitulo rotundo. C. B. Park. petræum minus Ger. emac. petræum Myagrodies Pona. In devexis Montis *Capouladou à las Cambrettes*, cum flore & semine Maio & Julio collegit *P. Magnol.* Nos in descensu montis 4. m. p. à Luca versus Lericium collegimus ; inque rupibus humidioribus montium *Jura & Saleva.*

Thlaspi foliis Sonchi lanati Dalechampii, eodem in loco.

C. *Thlaspi montanum Glasti folio C. B. mont. Glasti folio majus Park. Pannonicum Clusii Ger. folio Alliarie 7. B.* Umbrosis locis ad arcem *Stichenstain*, & qua inde iter est ad *Sneberg.*

Col. *Thlaspi saxatile vermiculato folio C. B. montanum vermiculato acuto folio Park. Lithothlaspi montanum fruticosius fruticosus vermiculato acuto folio Col.* In Anversæ Valvæ saxosis montibus ubi nihil terreni, Maio.

Col. *Thlaspi seu Leucoium Alyssoides umbellatum montanum Col.* An *Thlaspi montanum biseutatum asperum Hieracifolium & majus C. B.* In excelsis *Æquicolum* frigidisque jugis herbidis *Cornino* dictis, &c.

Col. *Thlaspi biseutatum asperum minus C. B. clypeatum asperum minus Park. Iontraba Alyssoides Apula spicata Col.* *Cirinolæ* in sylva prope *D. Rocchi Mezzana* appellata inter pyrastros, &c.

Col. Thlaspi biscutatum villosum, flore calcari donato
C. B. *Park.* Leucoium montanum flore pedato Col.
Ex opido *Fillettino* in montibus Romanæ ditionis. In
saxosis Gallo-provinciæ C. B.

Col. Thlaspi saxatile incanum luteum Serpylli folio minus
C. B. montanum luteum minus *Park.* Ionthlaspi luteo
flore incanum *Sironomides* montanum umbellatum Col.
In Æquicolorum montibus Maio & Junio frequentis-
sima.

M. Thlaspi parvum saxatile flore rubente C. B. *Park.*
Litho-thlaspi quartum carnoso rotundo folio Col. In
declivibus montis *Capouladou* abundat, sicut & circa
Grabels, juxta fluvium in satis sub magnis rupibus sitis,
Maio floret. *Bor. Monsp.*

S. Thlaspi biscutatum Rraphani & Irionis folio *Boccon.*
Circa Panormum, Agrigentum & Massiliam copiosè
oritur locis incultis & asperis.

S. Thlaspi fruticosum latifolium platycarpon, Leucii fo-
liis *Boccon.* Per totum annum floret in Sicilia, ut vi-
dere est in loco *Mariduci* dicto prope Panormum. Idem
esse putat *D. Boccone* quod describitur à C. Bauhino in
Prod.

Thora Valdensis *Ger.* Phthora folio Cyclamini *J. B.*
Aconitum pardalianches 2. sive Thora minor C. B.
Park. fortè etiam Thora major eorundem. In altissimis
jugis montis Juræ prope *Thuiri*.

Thymelæa *Ger. Park.* foliis Lini C. B. Monspeliaca *J. B.*
In Italia & Gallia Narbonensi, agris depressioribus,
inter alios frutices passim.

Thymelæa minor Cordi *J. B.* Thymelææ affinis facie,
externa C. B. Thymelæa minor, sive Cneorum Mat-
thioli *Park.* In Germania circa Basileam, & alibi: ut
montibus Viennæ vicinis. *Clus.*

Thymelæa seu Chamelæa Sabaudica folio utrinque in-
cano, flore albo. In sylvosis rupibus ad latera montis
Salevæ ex parte quæ Genevæ respicit è saxorum fis-
suris.

M. Thymelæa foliis Polygalæ glabris C. B. Sanamunda
glabra *J. B.* Sanamunda Monspeliaca glabra *Park.*
Oritur ultra *S. Pauli* pagum, eundo ad oppidum Gignac
in

in locis incultis, & Maio mense floret *Bot. Monsp. App.*
In maritimo tractu Narbonensi propè *Agdes* oppidum
collegit J. Bauhinus.

Thymelæa tomentosa v. *Sanamunda* ; foliis candicantibus
v. *Tarton-raire*.

Thymum durius *Ger.* durius vulgare *Park.* vulgare rigi-
dius folio cinereo *J. B.* vulgare, folio tenuiore *C. B.*
~~Musk~~-*Thyme*. In Gallia Narbonensi vix alia com-
munior planta.

Thymus capitatus, qui *Dioscoridis* *C. B.* *Thymum legi-*
timum capitatum *Park.* *Creticum* *Ger.* *Creticum*
five *Antiquorum* *J. B.* *The true Thyme of the*
Ancients. In saxosis propè *Syraculas* *Siciliæ* urbem.
Circa *Hispalin* copiosè nascitur. *Clus.*

M. *Thymum supinum* candicans odoratum. Istud in-
venit *P. Magnol* in sterilibus versùs *Clapiès* & *Jacou*
priore humilior, foliis candidioribus, odoratissimum.

M. *Tilia vulgaris platyphyllos* *J. B.* foemina folio majore
C. B. In declivibus umbrosis montis *Capouladou* ex
ipsis rupium fissuris oritur, præcipuè propè fonticulum,
vulgò *la Font de portes*.

B. *Tilia montana* maximo folio *C. B.* sylvestris five mon-
tana *Thal.* In monte *Muteto*, in qua nullum ha-
ctenus fructum observavit *C. Bauhinus*. In *Lenzen-*
berg & *Buchberg* circa *Altdorfium*. *Broad-leaved*
mountain Lime, Lime, or Linden-Tree.

Tithymalus folio longo glauco, caule rubro, seminibus
verrucosis. Prope *Messanam* in *Sicilia*. *Elatior* & ma-
jor est multo *Tithymalo* verrucoso vulgari.

M. *Tithymalus Lithospermi* majoris folio. *Bot. Monsp.*
App. Oritur in pratis *Salenovæ* & *Laterensibus* : De-
scriptionem vide apud *D. Magnol*.

Tithymalus arboreus *Park.* dendroides *J. B.* dendroides
ex codice *Cæsareo* *Ger.* dendroides. *Ital*is *Tithymalo*
arboreo *Lob.* myrtifolius arboreus *C. B.* Mihi folia ad
Mezereon *Germanicum* propius accedere videbantur.
In montosis non longe à *Massa*, inque Regno *Neapo-*
litano propè *Salernum*, & alibi in *Italia* ; necnon in *Si-*
cilia prope *Messanam*. In magnum & lignosum fru-
ticem adolescit.

Tithy-

Tithymalus non acris flore rubro *J. B.* *Tithymalus* montanus non acris *C. B.* qui huc refert *Esulam* dulcem Tragi, & *Pityusam* sive *Esulam* minorem alteram rubris floribus *Lob. Ger. Park.* A *J. Bauhino* optimè descripta est.

C. Tithymalus tuberosa pyriformi radice *C. B.* *Apios* *J. B.* vera *Ger. Ap.* seu *Tithymalus* tuberosus *Park.* *Apuliæ* peculiarem esse *Clusium* monuit *Imperatus.*

Col. Tithymalus lunato flore *Col. Park.* *Sylvaticus* lunato flore *C. B.* In valle supra *D. Mariæ* sanitatis *Neapoli*, inque *Asprensis* *Sabinorum* vallibus.

Tithymalus myrsinites *Lob. J. B. Park.* *myrsinites* latifolius *C. B.* *myrtifolius* latifolius *Ger.* *Broad-leaved Myrtle-Spurge.* Juxta arcem *Rhegi* in *Calabria.* *Tithymalum* *myrsinitem* angustifolium *C. B.* pro eadem planta habeo. *V. Hist. nost.* p. 866.

Tithymalus maritimus *Juniperi* folio *Boccon.* An *Tithymalus* *Cyparissias* vulgaris *Park?* Prope *Massiliam* in arenosis ad mare. Planta est grandiuscula & perennis. Icon *Lobeliana* *Tithymali* *myrsinitis* angustifolii huic plantæ respondet, unde in *Catalogo* exterarum pro eadem habuimus.

Tithymalus pineus *Ger.* foliis *Pini*, fortè *Dioscoridis* *Pityusa* *C. B.* *Pityusa*, *Tithymalus* *Pineus*, sive *Esula* minor *Park.* *Tithymalo* *Cyparissias* similis, *Pityusa* multis *J. B.* *Pine-Spurge.* *Crepidines* sabulosi fluminum & vicini colles frequentius hunc alunt *J. B.* quod & nos verum comperimus in *Germania.* Huic nobis idem videtur *Tithymalus* *cyparissias* *J. B. C. B. Ger.* Cujus certè tum descriptio tum locus *Tithymalo* *Pineo* seu *Esulæ* minori *Officinarum* conveniunt. Mirum interim nobis videtur, *Botanicos* de *Tithymalo* *pineo*, planta passim cognita, & vulgò in hortis culta tam confusè & obscure scribere, eamque *Cyparissiam* potius quàm *Pineam* denominare. Ab aliis autem speciebus, mihi saltem cognitis, discretu facilis est, statura humili, foliis longis, angustis, virentibus, mollibus & teneris, in caule creberrimis, *Linariæ* adeò similibus, ut obiter intuentem pro iis fallant: cum *Cupresso* verò nihil fere habet similitudinis.

Tithyma-

Tithymalus Amygdaloides five *characias* *J. B.* *characias rubens peregrinus C. B.* *characias Monspeliensium Ger. Park.* In saxosis circa Monspelim, quin & in Italia circa Lericiu, & alibi nobis se stitit.

Tithymalus serratus Dalechampii *J. B.* *characias serratus Ger. characias folio serrato C. B.* *chara. serratus Monspeliensium Park.* In Gallia Narbonensi passim & copiosè, circa Nemaufum, Monspelim, &c.

† *Tithymalus verrucosus* *J. B.* *verrucosus Dalechampii Park.* *myrsinites fructu verrucæ simili C. B.* *Warty-Spurge.* Circa pagum *Thuri* duabus à Geneva leucis; quin & in Germania eum aliquoties invenimus.

Tithymalus magnus multicaulis five *Esula major* *J. B.* *Tithym. palustris fruticosus C. B.* *Esula major Germanica Ger. Park.* In humidis & Michelfeldæ *Cat. Bas.* Circa Genevam & in planis campis agri Lugdunensis, per quos Geneva Lugdunum iter est.

Tithymalus palustris Pisanus. An *Tithymalus myrsinites incanus Herbariorum?* An *Tithymalus characias pratensis incanus Bot. Monsp?* *incanus hirsutus C. B.* In paludibus Pisanis frequens est; unde non dubito quin eadem sit quam Cæsalpinus *Tithymali palustris* nomine intelligit. Folia ejus hirsuta sunt, & ad *Tithymali characiæ Amygdaloidis* nostratis folia accedunt. *Tithym. characias pratensis incanus Bot. Monsp.* In pratis circa Lateram reperitur.

M. *Tithymalus characias rubens Germanicus C. B.* *characias angustifolius Park. Ger. emac.* *Tith.* fortè dictus Lucæ Ghino *Pityula*, quibusdam *characias Pannonicus J. B. D. Magnol* in umbrosis circa pontem Castri novi, Salenovæ & Lateræ passim reperiri asserit.

M. *Tithymalus Amygdaloides angustifolius Tab. i. c.* *Tithymalo maritimo affinis Linariæ folio C. B.* In declivibus montis *Capouladou* soli expositis, inter rupes versùs *las Cambrettes* & in aliis campestribus lapidosis copiosè oritur. Habetur & in *Cat. Sic. P. Boccone.*

M. *Tithymalus exiguus saxatilis angustifolius C. B. prod.* In sterilibus ultra pontem Salenovæ & à la *Colomariere* copiosè. Iconem hujus & descriptionem v. in *Bot. Monsp.*

M. *Tithy-*

M. *Tithymalus annuus* Lini folio acuto. An annuus Pityusæ facie *Lob* ? In marginibus satorum circa Salenovam, la Colombiere, &c. Descriptionem v. in *Bot. Monsp.*

Col. *Tordylium minimum* Apulum *Col.* *Seseli Creticum* minimum *C. B.* Apulum Creticum minimum *Park.* In incultis & sylvula illa propè D. Rocchi ædem Ciri-nolæ. *Col.*

Trachelium parvum folio *Bellidis* subrotundo. Radix ei alba, simplex, lignosa, annua. Caulis erectus, striatus: Folia alternatim posita, subrotunda, sine pediculis caulibus adnexa. Flores *Trachelii* majoris. Circa Messanam.

C. *Trachelium pumilum* Alpinum *Clus.* *Park.* pumilum Alpinum, singulis floribus ex singulis ramulis, satis magnis *J. B.* *Campanula Alpina* pumila lanuginosa *C. B.* In Sneberg aliarumque vicinarum Alpium jugis.

Trachelium Alpinum, &c. v. *Echium* Alpinum luteum.

Tragacantha *C. B.* vera *Park.* *Massiliensis* *J. B.* *Tragacantha*, sive *Spina hirci* *Ger.* Circa Massiliam ad maris litus. ~~Goats=Thorn.~~

Tragacantha altera sive *Poterium* densius ramificatum *Alpin. exot.* In Sicilia ad pedem *Ætnæ* montis, loco satis frigido collegimus.

Tragium v. *Androsæmum* foetidum. *Tragorchis* v. *Orchis*.

A. *Tragopogon laciniatus* luteum *C. B.* foliis laciniatis *Col.* *Acorus Theophrasti* *Ang.* saxatile quorundam, cujus folia prima graminea integra sunt, succedentia *Coronopum* æmulantur. M. Junio & Julio prope *Hagenhusam* in asperis.

M. *Tragopogon tenuissimè laciniatus* *C. B. prod.* An *Trag.* folio laciniato *Monspeliense* *J. B.* Certè nec figura neque descriptio *J. B.* hanc rite demonstrant. Descriptio *C. B.* bene convenit, & icon *Matthiolina Chondrillæ* alterius ad eam satis accedit. Vulgo hinc *Chondrilla* *Coronopi* folio vocatur: in herbis satorum & vinearum marginibus copiosè oritur. *Bot. Monsp.*

M. Tra-

M. *Tragopogon purpureo-coeruleum porrifolium* C. B. in
iisdem marginibus herbidis Maio mense sæpius occurrit.

Bot. Monsp.

Tragopogon perenne seu *Scorzonera foliis angustis inca-*
nis, floribus dilutè purpureis. In insula ad Promont.
Siciliæ *Pachynum.*

M. *Tragopogon Hispanicum* seu *Scorzonera* *J. B.* *Scor-*
zonera latifolia sinuata C. B. Allatum ex pratensibus
circa S. Martin vidit P. Magnol, quod & ipse olim col-
legit in pratis montis Calcaris. *Bot. Monsp.*

M. *Tragopogon* seu *Scorzonera latifolia altera* C. B.
Scorzonera major Pannonica 1. *Clus.* ma. Pann. lati-
folia *Park.* *Broad-leaved Wipers-grass* or *Scor-*
zonera. In herbidis montis *Serane*, ubi multò etiam
angustioribus foliis invenimus. P. Magnol. Præce-
dentis potiùs varietas esse videtur quàm species di-
stincta.

M. *Tragopogon* five *Scorzonera humilis* crassiore folio
Bot. Monsp. App. ubi descriptionem vide. An *Hie-*
racium 7. *Clus.* quod in C. B. pinace bis ponitur,
primò pro *Scorzonera angustifolia altera*; Secundò
pro *Hieracio Tragopogonis folio.*

M. *Tragopogon Apulum humile hirsutum* Col. *hirsutum*
J. B. *hirsutum humile* *Park.* *Small rough yellow*
Goats-beard. In planis herbidis montis *Serane.* Junio
mense floret. Columna *Cirinolæ* in *Apulia* invenit.
Habetur etiam in *Cat. Sic. Boccon.*

M. *Tragopogon purpureo-coeruleum crocifolium* C. B.
crocifolium purpureum *Park.* *crocifolium mont. flore ni-*
gro-purpureo, sive Theophrasti & Dioscoridis Col. In
iisdem locis & eodem tempore cum præcedente floret.
Bot. Monsp. App. Reperitur etiam in *Sicilia.* *Cat. Sic.*
P. Boccone. In *Æquicolorum* montibus, &c. Col.

Col. *Tragopogon gramineis foliis hirsutus* C. B. *Apulum*
suave-rubens *Park.* alter *gramineo folio, suave-rubente*
flore Col. *Cirinolæ* *Apuliæ* in *pyrastrorum sylvæ* prope
D. Rocchi ædem.

M. *Tragopogon* seu *Scorzonera angustifolia Germanica*
Tab. minor *angustifolia Pannonica* *Park.* foliis nervo-
sis C. B. In depressis herbidis & incultis locis, ad
dextram

dextram viæ qua à ponte Villæ novæ itur ad Miramvallem reperit *D. Foly*, M. D. Junio mense cum flore.

Tragos five Uva marina herbariorum major *Lob.* Uva marina major *Ger.* Polygonum bacciferum five Uva marina major *Park.* Tragos five Uva marina major *J. B.* Polygonum bacciferum maritimum majus *C. B.* In Sicilia prope *Punto Cerciolo*, ubi humanam altitudinem superat, & multis stolonibus & ramis fuitat.

Tragos five Uva marina minor *J. B.* Uva marina minor *Ger.* Polygonum bacciferum maritimum minus *C. B.* Pol. baccif. minus seu Uva marina minor *Park.* In arenosis litoribus prope promontorium Ceti & oppidum Frontignanum, atque etiam in saxosis collibus vicinis.

Tribulus terrestris *J. B.* *Ger. Park.* terrestris Ciceris folio, fructu aculeato *C. B.* In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensi, in sabulosis & glareosis passim.

Tribulus aquaticus *J. B.* *C. B.* *Ger.* aquaticus major *Park.* Matthiolum in plerisque Italiæ fluminibus & lacubus provenire ait, præsertim in agro Mantuano & Ferrariensi. Fructus magnus est, esculentus, per maturitatem niger: Venetiis venales vidimus. Holland. v. *Cat. Commel.*

Trifolium bituminosum *Ger.* Asphaltites five bituminosum *Park.* Asphaltites, five bitumen redolens *C. B.* Asph. five bituminosum odoratum *J. B.* In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi, in saxosis collibus non procul à mari copiosissimè.

Trifolium Alpinum argenteum *Park.* Alpinum argenteum Perfici flore *C. B.* In præruptis altissimorum montium max. Carthusianorum in Delphinatu coenobio iminentium.

† Trifolium capitulis globosis sine pediculis caulium geniculis adnatis. Circa Messanam alteram Siciliæ metropolin invenimus.

Trifolium minimum supinum, flosculorum & seminum globulis plurimis ad radicem confertim nascentibus. Circa Messanam in sterilioribus & arenosis.

Trifo-

Trifolium erectum annuum, capitulis sublongis, è calycibus magnis constatis, Calabrense. In Regno Neapolitano ad maris litus. Hist. nost. p. 950.

Trifolium cochleatum, echinatum, peltatum, orbiculatum, &c. v. Medica.

M. *Trifolium fragiferum* tomentosum *Bot. Monsp.* An *Trif.* capitulo spumoso lævi C. B. ? qui tamen flores luteos illi attribuit. *Trif.* glomerulis tomentosis per caulium longitudinem *J. B.* Maio & Junio reperitur in viis herbidis, præcipuè ubi aquæ per hyemem stagnarant, circa Gramuntium quâ itur *Grabels*, & alibi.

M. *Trifolium glomerulis* Personatæ Cherleri *J. B.* globosum repens C. B. Monspelii in squalidis & siccis locis circa Episcopi castellum, & in luco Gramuntio. *Bot. Monsp.*

Trifolium fragiferum sive vesicarium floribus nitidis rabelis. *Trifolium pratense* Salmanticum Clusii *Park.* folliculaceum seu vesicarium minus purpureum *J. B.* pratense folliculatum C. B. Circa Liburnum portum & alibi in Italia, ad agrorum margines.

M. *Trifolium capitulo* glomerato rigido *J. B.* globoso flore, vel capitulo *Lagopi* rotundiore C. B. capitulo globoso *Park.* In satis copiosè oritur, sed semper cum floribus rufescentibus.

Trifolium fruticans v. *Polemonium*.

Trifolium pratense album à Fuchsis depictum sive mas *J. B.* Alii Botanici speciem hanc vel cum *Trifolio* albo vulgari confundunt, vel pro *Trifolio* majore flore albo incano (Clusii ut puto) habent, & revera descriptiones utriusque conveniunt. Circa Genevam in pascuis & agrorum marginibus observavi. In Catalogo Altdorfino invenio *Trifolium montanum* album C. B. majus flore albo sive I. *Clus.* ad margines sylvarum montosar. uti in ascensu Mauriti m. Jun. & seqq. Foliorum fibrillis elegantissimè dispositis, floribusque suavissimi odoris albis & luteo-pallidis. Est autem *Trifolium majus* flore albo incanum Clusii, h. e. montanum majus flore albo *Park.* majus flore albo *Ger.* in pratis siccioribus Viennæ, Austriæ vicinis, rum in Moravia & Bohemia frequens, quia & prope Monspelium in herbidis sylvæ Valenæ occurrit. *D. Magnol.*

Trifo-

Trifolium montanum purpureum majus C. B. Park. majus Clusii secundum, non album sed rubrum J. B. majus flore purpureo Ger. In Hamburgensi aliisque Panoniz & Austriæ montibus, Alpestribusque pratis, præsertim siccioribus Viennæ vicinis. In monte Crenza-censi Cat. Bas.

Trifolium spicâ oblonga rubra C. B. majus flore purpureo Ger. montanum majus purpureum Park. majus tertium purpureum Clusio J. B. Cum priore. Parùm admodum differt à Lagopo majore folio pinnato Park.

Z. *Trifolium glutinosum saxatile argenteum flore luteo odorato Zanoni. Ad pedem montis Baldi, & locis saxosis gaudet. Speciem hanc à Loto fruticoso incano siliquoso C. B. Trifolio argentato floribus luteis J. B. diversam esse mihi nondum plene persuasum est. Cæterum*

Trifolium argentatum floribus luteis J. B. in collibus circa Monspelium, inque planitie quam transivimus eundo ad montem Lupi collegimus.

B. *Trifolium montanum purpureum folio acuto crenato C. B. prod. In montosis pratis.*

B. *Trifolium montanum purpurascens folio obtuso crenato C. B. prod. Park. In pratis montosis circa Genevam.*

B. *Trifolium capitulo spumoso aspero majus C. B. prod. In salicetis Michelsfeldæ Huningam versùs. Bas. Cat.*

B. *Trifolium capitulo spumoso aspero minus C. B. prod. Ad Rheni ripam herbido & arenoso loco juxta Barr.*

B. *Trifolium saxatile hirsutissimum C. B. prod. In Helvetiorum altissimis jugis.*

B. *Trifolium Alpinum flore magno, radice dulci C. B. Alpinum Rhæticum Astragaloides J. B. angustifolium Alpinum Park. Ger. emac. Ex Bernatum Alpibus primum habuit, deinde in Horto Dei Monspelienfium collegit. Duplex est, majus & minus.*

B. *Trifolium angustifolium repens, folliculis rotundis C. B. prod. Monspeffuli in arvis & ad pedem montis Lupi.*

Trifolium stellatum C. B. stellatum Monspelienfium Park. stellatum purpureum Monspeffulanum J. B. Ad radices Vesuvii montis copiosè, nec minùs circa Messanam in Sicilia & Monspelium in Gallia Narbonensi.

Trifolium

Trifolium annuum erectum capitulis è glumis acerosis conflatis. Hanc speciem in Regno Neapolitano ad maris litus collegi, cum Messana Neapolin redirem.

Tripolium minus *J. B. C. B. Park.* minus vulgare *Ger. The lesser Sea-Starwort.* Ad mare propè Monspelium. Omnibus suis partibus *Tripolio* nostrate minus est.

Tubera *J. B. Park.* *Tuber C. B.* *Tubera terræ* *Ger. Trubs* or *Truffles.* *Tarentali* *Ital.* Hæc ipsi è terra nunquam eruimus, verùm tum in Italia tum etiam in Gallia nobis in cibis apposita sunt. Ea autem porcelli ope exquirunt : modum vide in Hist. nost.

Tussilago Alpina *Ger. emac.* *Alpina* minor folio rotundo *J. B.* *Alpina rotundifolia glabra C. B.* *Alpina folio glabro* *Park.* *Round-leaved small mountain Coltsfoot.* In Alpibus *Stiriæ* primò, postea in monte *Jura* invenimus.

Tussilago Alpina folio longo *J. B.* *Alpina folio oblongo* *Park. C. B.* In montis *Juræ* partibus altissimis *Thuri* & *Dole.* Hæc planta *Aismati Matthioli* sive *Plantagini* *Alpinæ* dictæ persimilis est, non tamen eadem, ad *Doronicæ* potius quàm ad *Tussilagines* referri debet.

C. Tussilago Alpina glabro folio *Clus. Park.* *Alpina rotundifolia glabra C. B.* In superiore collis parte post monasterium *Neuberg,* ad radices celsissimi jugi ejusdem nominis ; & in inferioribus jugis aliarum *Alpium.*

Typha minor *J. B. minima* *Park.* palustris minor *C. B.* *Small Reed-mace.* Hanc plantam in eodem loco in quo olim *Lobelius* nimirum ad fluvium *Arve* prope *Genavam* inveni. Cum primum eam observavi verno tempore perexigua fuit, clava gracili, unde minime tum dubitavi quin distincta species esset : postea verò caput cylindraceum clavatum in tantam intumuit crassitiem, ut merito dubitaverim, annon ipsius parvitas loco potius (siquidem extra aquas crevit) quàm plantæ naturæ imputanda esset.

Typha angustifolia

V Accaria Ger. v. *Lychnis segetum rubra*. *Vaccinia* v. *Vitis Idæa*.

Valeriana rubra Dodonæi Ger. Park. rubra
C. B. latifolia rubra *J. B. Ocymastrum*

Valerianthon Lob. Messanæ in muris antiquis. In Italia quoque, locis plurimis, e muris & saxis erumpit. Prope Montepellium in monte Caponladou. v. Bot. Monsp.

Valeriana rubra angustifolia C. B. J. B. Narrow-leaved red Valerian. Ubi *J. Bauhinus* eam invenit, ibi & nos quoque nimirum Nantua Sabaudorum, in colle extra portam quæ itur Lugdunum ad dextram. Provenit quoque copiose in rupibus montis Lupi.

Valeriana Mexicana Ger. Indica sive Mexicana Park. C. B. peregrina seu Indica J. B. Circa Messanam Sicilia copiose provenit. Reperitur etiam in Italia.

M. Valeriana cornucopiodes Col. Valerianella echinata C. B. Circa Montepellium inter segetes vere passim reperitur. Bot. Monsp.

M. Valerianella semine stellato C. B. altera tenuifolia, scabiosa semine stellato Col. In satis etiam copiose oritur. Loca v. in Col. Ecphr.

M. Valerianella semine umbilicato rotundo nudo Moris. Phu minimum Ad. Cum priore permixta passim etiam occurrit.

M. Valerianella semine umbilicato nudo oblongo Moris. Hæc etiam in satis invenitur. Folia habet albidiora non dissecta, semen oblongum, umbilicatum, superiore albidius.

Valeriana Alpina J. B. ff. seu Alpina altera C. B. Alpina major sive latifolia Park. In monte Saleva, supra Carthusianorum coenobium. Planta quam intelligimus Trachelii majoris vulgaris folia habet, radicem odoratam, fortè Valeriana Trachelii folio Hort. Pat.

Vale-

Valeriana Alpina, foliis integris, radice repente inodora. In montibus circa Genevam copiosè provenit. Descriptionem v. Hist. nost. p. 389.

C. Valeriana Alpina 2. sive saxatilis *Clus.* Alpina, Nardo Celticæ similis C. B. Alpina angustifolia *Ger.* An Valeriana minima Nardifolia *J. B.*? Inter saxa ad fluvium *Myrtæ* quod monasterium *Neuberg* alluit.

M. Valeriana annua *Clusii Ger.* annua sive ætiva *Clusii Park.* foliis Calcitræ C. B. Annual Valerian. In quamplurimis umbrosis vinearum sepibus occurrit circa pontem Castri novi & alibi. *Bot. Monsp.*

Valeriana annua Sicula. An Valeriana minor annua *Park.*? In promontoriolo *Punto Cerciolo* dicto ad occidentale Siciliæ latus.

B. Valeriana palustris major profundè laciniata C. B. *prod.* In loco palustri prope Budissinam urbem.

B. Valeriana palustris inodora parum laciniata C. B. *prod.* In palustribus Michelsfeldensibus prope Basileam.

B. Valeriana Alpina Scrophulariæ folio C. B. *J. B.* In monte *Wasserfal.* *Cat. Basf.*

B. Valeriana sylvestris major montana C. B. Val. 3. *Trag.* montana & 3. *Tab.* In sylvis caduis circa Basileam.

Verbascum latis Salviæ foliis C. B. v. Salvia fruticosa lutea latifolia.

Verbascum crispum & sinuatum *J. B.* laciniatum *Park.* nigrum folio Papaveris corniculati : & *Cam. C. B.* Jagged *Wallein.* In Italia ad vias passim : item circa *Monspelim.*

Verbascum folio subrotundo, flore Blattariæ C. B. *Park.* In umbrosis & herbidis citra antrum viâ Frontignanâ, & inter rupes montis Lupi sapius collegit *P. Magnol.* Figura Arcturi Cretici *Belli Pon.* nullo modo huic nostro convenit, quod non est laciniatum, quamvis idem statuat *J. Bauhinus.*

Verbascum foemina flore luteo magno C. B. maximum album foemina, flore subpallido *Lob.* In arenosis ad *Wiesam* *Cat. Basf.* post arcem *Heimberg* aliisque editoribus *Palatinatus Cat. Altd.*

C. Verbenæ supina *Clus.* *f. B.* supina five foemina *Park.* tenuifolia C. B. sacra *Ger.* Salmanticensi agro frequens est, & aliis Castellæ in locis.

Veronica, Chamædrys spuria dicta, major altera five frutescens C. B. Chamædrys falsa maxima, an Teucrium 1. seu majus Pannonicum *Clusio f. B.* Cham. spur. major frutescens *Park.* Teucrium majus Pannonicum *Clusio Ger.* The greatest bastard German-der. In sylvis Germaniæ atque etiam circa Genevam multis in locis.

Veronica supina facie Teucii pratensis *Lob.* supina *Ger.* Teucii facie *Park.* Chamædrys spuria angustifolia *f. B.* spuria major angustifolia C. B. Narrow-leaved bastard-Germander or Speedwell with Germander-leaves. Circa Genevam, & in Germania in pascuis propè Rhenum frequens.

Veronica Chamædrys spuria dicta minor latifolia C. B. *Park.* Chamædryos falsa species, Teucrium V. *Clusii f. B.* Teucrium Pannonicum *Ger.* In omnibus fere siccioribus agris incultis, herbosisque aggeribus & colliculis secundum vias publicas inferioris Austriæ.

C. Veronica petraea semper virens *Pouæ.* Teucrium 6. *Clus.* petraeum pumilum *Ger. emac.* Chamædrys Alpina laxatilis C. B. *Park.* In summo *Escheri* jugo, nec usquam alibi invenit *Clusius.*

C. *†* Veronica spicata latifolia C. B. *Ger.* major latifolia foliis splendentibus & non splendentibus *f. B.* spicata latifolia major *Park.* Hujus duas habet species seu varietates *Clusius*, alteram foliis minus atris & non splendentibus; alteram foliis evidentius crenatis, florum spicis longioribus. In multis Pannoniæ sylvis montibus, & ad radices Stiriacarum, Austriacarumque Alpium; Julio.

C. Veronica 2. erectior angustifolia *Clus.* Spicata angustifolia C. B. cum priore. An & quomodo differat à Veronica recta vulgari majore *Clus.* inquirendum. Hujus duas species constituit *Clusius*, foliis latioribus, & fol. paulo angustioribus, caulibus ramosioribus & minus ramosis, floribus saturatoribus & dilutioribus.

B. *Veronica Alpina* Bellidis folio hirsuta C. B. *prod.* In Alpibus Helvetiorum.

Veronica tetragona montana recta minima Col. Chamædrydys spuria latifolia minima C. B. In summis frigidisque montium Æquicolorum pascuis. Col.

Veronica saxatilis J. B. minor Alpina Park. Serpyllifolia omnium minima Pona. Alpina frutescens C. B. frutescens Serpyllifolia Ger. *emac.* In summis jugis montis Juræ prope *Thuri*: Pona in altioribus summitatibus Baldi Orientem versus. Uterque Bauhinus huic synonymam faciunt Veronicam 3. fruticantem Clus. minus rectè, ut mihi quidem videtur: Parkinsonus rectius Veronicam frut. Clusii ab Alpina minore Serpyllifolia separat. Hæc enim non fruticat, neque pedalem longitudinem assequitur, sed palmaris est & herbacea semper; quin & florum colore differt.

Veronica fruticulosa

Veronica parva saxatilis, cauliculis nudis. Chamædrydys spuria minima Park. Teucrium minimum Clus. *hist.* In montis Juræ vertice *Thuri* copiosam invenimus. Clusius in summo *Sneberg* jugo.

Vicia sylvatica maxima Pilo sylvestri similis J. B. In sylvis in ascensu montis Salevæ ab eo latere quod Genevam spectat.

Vicia maritima multiflora alba Messanensis. In Sicilia circa Messanam & alibi ad maris litus.

Vicia luteo flore sylvestris J. B. sylv. lutea, siliquâ hirsutâ, nondum descripta C. B. Circa Liburnum & alibi in Italia inter segetes: item circa Monspelium.

Vicia floribus pallidè luteis amplissimis Neapolitana. Neapoli in ascensu ad Camaldulensium coenobium.

M. *Vicia angustifolia* purpuro-violacea, siliquâ latâ glabrâ Bot. *Monsp.* ubi descriptionem ejus vide. Hæc est, inquit, sine dubio quam invenit J. B. inter saxa mense Aprili, quâ itur Frontignanam, foliis angustiss. flore pulchro purpureo.

M. *Vicia multifolia* cum siliquis latis J. B. In satis intra & circa lucum Gramuntium Aprili & Maio mensibus. Flos non luteus est, sed pallidè albus.

- M. *Vicia* similis supra infraque terram fructum edens C. B. *Arachydnæ* aut *Aracoides* *Honorii Belli* *J. B.* *Arachidna* *Cretica* *Park.* In loco dicto *la Garrigue dau Tarral* plurima provenit. *Bot. Monsp.*
- M. *Vicia* perennis incana multiflora *Bot. Monsp.* ubi descriptionem vide. In pratis circa Lateram Junio mense floret.
- M. *Vicia* sive *Cracca* foliis & filiquis longioribus *Bot. Monsp.* *Viciæ* parvum genus folio longo *J. B.* In iisdem cum superiore locis oritur, & in plurimis siccioribus satorum marginibus.
- B. *Vicia* sepium folio rotundiore acuto C. B. *Aphaca* *Matth.* *Vicia* *Dod. Lob. Clus.* Ad sepes. *Cat. Bas.* Habetur etiam in *Cat. Altd.*
- C. *Vicia* sylvestris quasi incana, flore albo *J. B.* *sylv. flore albo Ger. emac. sylv. alba Park. sylv. hirsuta incana C. B.* In arvis desertis apud *Chyzreg* *Pannoniæ* oppidum.
- Viciam* sylvestrem spicatam seu secundam *Clusii* *J. Bauhinus* pro *Vicia* Multiflora C. B. nonnullis *Galega* sylvestri, ubique vulgarissima, habet.
- B. *Vicia* *Onobrychidis* flore C. B. *prod.* *Monspessuli* provenit.
- Vinca* pervinca v. *Clematis* *Daphnoides.* *Viola* bulbosa v. *Leucoium* bulbosum.
- Viola* *Martia* lutea *Ger. Park. J. B.* Alpina rotundifolia lutea C. B. In suprema parte montis *Juræ* circa *Thuri.*
- C. *Viola* Alpina purpurea exiguis foliis C. B. montana purpurea, solidiore folio *J. B.* montana 2. *Clus.* In summi *Sneberg* jugi vertice.
- C. *Viola* surrecta purpurea *Park.* *Martia* arborescens purpurea C. B. assurgens tricolor *Ger.* *Jacea* tricolor surrectis cauliculis, quibusdam arborea dicta *J. B.* In *Austriæ* & *Stiriæ* nemoribus frequens. *Clus.* In limitibus *Montbelgarden*sibus, versus *Matthæi* arcem, inter vepres. *J. B.*
- C. *Viola* montana tricolor odoratissima C. B. *Jacea* tricoloris sive *Floris Trinitatis* genus flore luteo & purpureo magno, repens, non annuum *J. B.* *Viola* mon-

montana 3. five tricolor *Clus.* In Alpibus Helveticis.

J. B. Viola Alpina, folio in plures partes dissecto C. B. montana folio multifido J. B. montana laciniato folio *Clus. Park. 7. Ger.* In monte Nombres Rhetorum, prope balneum *Wurms.*

B. Virga aurea latifolia ferrata C. B. aurea ferratis foliis *Park.* aurea Arnoldi Villanovani *Ger.* aurea seu Solidago Saracenica latifolia ferrata J. B. In Basileensi monte *Munchenstein.* In monte *Rosberg* prope *Mas-munster* J. B.

Viola lunaris longioribus filiquis *Ger.* lunaria 3. five major, filiqua oblonga C. B. Lunaria major, filiqua longiore J. B. In montibus Saleva & Jura, sed rarius.

Viola matronalis flore purpureo *Ger.* matronalis five Hesperis hortensis C. B. Hesperis J. B. Cum à Salerno Neapolin iter facerem hanc in pratis observavi.

Vilnaga J. B. *Matth. Lob.* Vilnaga Gingidium appellata *Park.* Gingidium Hispanicum *Ger.* Gingidium umbellâ longâ C. B. Spanish Dicktooth, quia Umbellæ radiis pro dentiscalpiis ob rigiditatem & suaveolentiam utuntur Hispani. In pratis quibusdam non longè à *Miravalle* prope *Monspelim*: copiose etiam in Etruriæ agris, & circa *Catanam* Siciliæ.

Vitex v. Agnus castus.

Vitis Idæa foliis carnosiss & velut punctatis five Idæa radix Dioscoridis C. B. Radix Idæa putata & Uva ursi J. B. Uva ursi Galeni *Clusio Park.* Vaccinia ursi, five Uva ursi apud *Clusium* *Ger.* In montibus Saleva & Jura Genevæ vicinis, item in Colle *la Bastie* prope eandem urbem.

A. Vitis Idæa rubra major *Gesf. Cam.* Idæa altera *Clus.* foliis subrotundis exalbidis C. B. Circa *Altdorfium*, loca vide in *Cat. Altd.*

C. Vitis Idæa fructu nigro J. B. Idæa foliis oblongis albicantibus C. B. Vaccinia nigra Pannonica *Park.* Vac. Pannonica seu Vitis Idæa *Ger.* In unius *Snealben* jugo supra *Neuberg* scopulis Augusto. *Clus.*

Vitis Idæa v. Diospyros. Ulmaria major v. Barba capræ. Unifolium v. Monophyllum.

Uva crispa Ger. *Dod. Lob.* Crispa five *Grossularia* J. B. *Grof. vulgaris* Park. *Grossular. simplici acino vel spinosa sylvestris* C. B. *Wild Gooseberry.* Per totam Helvetiam in sepibus frequentissima est. In Sicilia in hortis studiosè colitur, & pro Plantâ rarâ nobis ostensa fuit. Amat enim frigidos tractus, in calidioribus minus frequens est.

Uva marina v. *Tragos.* *Uva ursi* v. *Vitis Idæa.*

X.

X *Ylon* v. *Gossipium.*

Z.

Z *Acyntha* v. *Cichorium verrucarium.* *Zea monococos* v. *Briza.* *Ziziphus* five *Jujuba sylvestris* Park. *Jujuba sylvestris* C. B. *Zizipha sylvestria* J. B. *Wild Jujubes.* In rupibus ad Tropiam Calabriae urbeculam copiosè.

Planta

Plantæ à nobis in Itinere transmarino observatæ, præsertim in Italia, Sicilia, Helvetia, & Gallo-provincia.

Plantæ à nobis observatæ Itinere ab Augusta Taurinorum ad Genuam. Martii 18. 1664.

IN ascensu montis Pado flumini imminensis, sesquimilliarî Italico à Taurino, quâ Astam itur; in sylvosis & scrobibus.

Dens caninus flo. purpur. Ger.

Leucoium bulbosum primum Tab. bulbosum vulgare C. B.

A. Dentaria *ἄφουλλος* Clus. sive Anblatum Cordi.

Doronicum vulgare f. B.

Hepaticum trifolium Lob. Ger.

Hyacinthus botryodes 2. Clus. coeruleus Ger. Hic in aggeribus terrenis ad agrorum margines, & juxta vias toto itinere à Taurino ad Genuam usque copiosè provenit.

In agris propè Alexandriam inter segetes.

Ornithogalum luteum sive Cæpe agraria Ger.

Thlaspi oleraceum Tab.

In montibus & salebrosis præruptisque inter Gavium oppidum & Voltagium 15. à Genua m. p.

Dens caninus flore purpureo Ger.

Stoechados citrinæ species, an Italica f. B? Odorata planta & incana, foliis Rorismarini angustioribus, floribus velut in umbella, vasculis seminalibus jam siccis Hyperici similibus: passim in hisce montibus & copiosissimè.

Psyllium semper virens Lobelii Ger. majus supinum C. B. circa Gavium & Voltagium abundè.

Sedi

Sedi species flo. albo quadrifolio : in rupibus prope Voltagium Martii 20. in flore.

Erica arborescens Monspeliensis flore purpurascens, ramulis ternis *J. B.* Assurgit in magnitudinem Genistæ æmulam, Inter Gavium & Genuam & montibus abunde.

Petasites flore albo. In montibus 3. vel 4. milliaribus à Voltagio distitis Genuam versús.

In rupibus prope Pharon Genuensem.

Trifolium bituminosum *Ger.*

Jacobæa marina sive Cineraria *J. B.*

Conyza major Monspel. odorata *J. B.*

Alaternus. Carduus galactites *J. B.*

Thymum vulgare rigidius folio cinereo *J. B.*

Geranium folio Althææ *C. B.*

Thlaspi Alysson dictum maritimum *C. B.*

Lotus Libyca Dalechampii *Lugd.*

Lotus pentaphyllos filiquosus villosus *C. B.*

Smilax aspera. *J. B. Lob. Ger.*

Adiantum sive Capillus Veneris *J. B.*

Hyoisycamus 2. *Tab. 100.* albus *Park.* Hæc species, quam in muris crescentem vidimus & in rupibus circa Genuam, à nigro vulgari differt, quòd folia habeat breviora, viridiora, rotundiora, minùs laciniata, florèm minorem in nonnullis totum luteum, in aliis fundo obscure purpureo.

In itinere à Lericio ad Lucam.

S Crophularia folio Urticæ *C. B.* Hæc etiam abundat Pisis intra muros ipsius urbis.

Orchis macrophyl^a *Col.* inter Sarzanam & Massam.

Moly parvum caule triangulo *C. B.*

Narcissus medioluteus polyanthos *Ger.* Inter segetes toto hoc itinere copiosissime.

Inter Massam & Lucam ad radices & in lateribus montium quos præterivimus.

A. Orchis fuciflora galea & aliis herbis *J. B.*

Antir-

Antirrhinum luteo flore C. B. luteo flore grandi Cam.
Tithymalus dendroides J. B. Lentiscus.
Anagiris five Laburnum majus.
Colutea vesicaria. C. B. J. B.
Colutea Scorpioides J. B. major C. B.
Ocymoides repens montanum C. B. quibus Saponaria
minor.

Ruta sylvestris major J. B. C. B. Laurus vulgaris.
Teucrium multis J. B.

In aggeribus fossarum & umbrosis juxta vias toto hoc itinere.

Anisum latifolium Clus. Park.

Aristolochia rotunda Lob. Ger.

In humidis & umbrosis juxta fluvium quendam medio inter Massam & Lucam itinere.

Ex. Dentariæ quædam species flo. purpureo. Humilis est, & quasi acaulis hujusce flos. Planta autem ipsa denso cæspite terram operit Sedi majoris in modum. Radix autem dentata est : Aprili mense florentem invenimus.

Inter segetes Lini.

Lychnis folio angustissimo flo. rubello erecta.

Ornithogalum vulgare Ger. inter segetes copiosè.

In montosis iterum.

Cyclamen vernum, copiosè, in flore Aprilis 3. S. V.

Myrtus minor vulgaris, seu communis Italica C. B.

Philyrrea angustifolia J. B. Ger. Philyrrea 3. Clus.

Genista Hispanica Ger.

In descensu montium 4. m. à Lucâ distantium.

Hesperis Italica, seu sylv. latifolia flo. albo parvo Park.

Alfina myosotis flore maximo.

Guajacum Patavinum, eive similis frutex.

Planta Thlaspi congener flo. albo quadrifolio monospermus, fortè Thlaspi Alpin. minus capitulo rotundo C. B.

Sedum minus semine stellato. An Cephæ congener in rupibus & aggeribus sepium ?

A. Alfina foliis hederaceis Rutæ modo divisis flo. albo.

Thlaspeos quædam species, cujus folia Sonchi lanati foliis similia, nondum floruerat.

Anemone tuberosa radice *Ger.*

Alfene folio crasso: circa Portum Veneris.

Inter Lucam & Pisas.

- A. **B** Urfa pastoris major folio non sinuato C. B.
 Rapiſtrum ſiliquâ echinatâ. Sinapi echina-
 tum *J. B.*
 Stoechas Arabica.
 Polium montanum album: in montibus.
 Ciſtus ladanifera Monſpeliaca.

*Circa portum Liburnum ad litora maris
 & in agris.*

- K** Ali geniculatum majus. In fruticem lignoſum
 ſatis magnum adoleſcit, adeò ut Kali arbo-
 reſcens merito dici poſſit.
 Abſinthium Seriphium Gallicum C. B.
 Iamarix major ſive arborea Narbonenſis *J. B.*
 A. Leucoium marinum folio ſinuato: quod habetur etiam
 in Angliæ maritimis occidentalibus.
 Medica cochleata ſpinofa. Medica doliata ſpinofa.
 Caltha arvenſis C. B.
 Hyacinthi paluſtris ſpecies floribus veluti fimbriatis albis.
 Hyacinthus comofus major purpureus C. B.
 Lathyrus flore coccineo, ſeu vario ex albo & coccineo.
 Vicia flo. luteo ſylveſtris *J. B.*
 Cruciata minima muralis *Col.*
 Iris pumila latifolia flo. violaceo.
 flo. luteo in rupeculis quibuſdam
 mari circumfluſis, uno ſerè à Liburno milliari, verſus
 montem Nigrum.
 Ochrus ſive Ervilia *Dod.* inter ſegetes.
 A. Trifolium pumilum ſupinum ſtoſculis longis albis P. B.
 A. Peplis.
 Phyteuma Monſpelienſium: Reſedæ ſpecies.
 Telephium ſcorpionides *J. B.* leguminofa planta.
 Anthyl.

Anthyllis leguminosa flo. purpureo.

A. Orchis fuciflora galea & alis herbidis *J. B.*

Cichorium pratense vesicarium *Col.*

Medica marina. Medica scutellata J. B.

Ageratum five *Balsamita mas.*

Gladiolus Narbonensis. inter segetes.

Paronychia five *Alsinifolia incana J. B.*

Herniaria hirsuta. *Allii species, an Ampeloprasum?*

A. Eranthemum five *Flos Adonis.* flore phoeniceo.

Draba multis flo. albo *J. B. vulgaris Park.*

Pentaphyllum parvum hirsutum J. B.

Chrysanthemum tenuifolium Baticum Boelii Ger.

Ferrum equinum Ger.

Orchis macrophylla Col.

Trifolium fragiferum five *vesicarium* floribus nitidis rubellis. An *Trifolium pratense Salmanticum Clus?*

Erica major scoparia foliis deciduis *C. B.*

Observavi insuper in siccioribus colliculis prope maris litus, non longè à Liburno, plantulam bulbosam folio pallidè viridi, hirsuto, molli & prorsus gramineo, non crasso & succulento, prout solent bulborum folia. Radix ei oblongior, exterius squamis obducta. Florem non vidi, jam enim Aprilis medio præterierat. Vascula seminalia subrotunda, deorsum nutantia in eodem cauliculo duo vel tria, singulis singula pedicellis satis longis dependentia.

Circa Neapolin ad maris litus & inde non longe.

Trifolium corniculatum incanum maritimum majus.

Lotus filiquis Ornithopodii.

Abrotanum quoddam inodorum in rupibus prope urbem. florem non vidimus, quamvis iterum

mente Julio Neapolin reversi sumus.

Medica orbiculata orbiculis minoribus.

Medica doliata spinosa.

Jacea maritima purpurea capitulo spinoso.

Rhamnus

- Rhamnus spinis oblongis flore candicante C. B.
 Stoechas citrina tenuifolia, Italica.
 Linaria purpurea magna 7. B. nobis Hungarica dici
 solita.
 Medica marina, in omnibus hisce litoribus.
 Urtica Romana.
 Sonchus Creticus foliis laciniatis C. B.
 Chrysanthemum Creticum.
 Faba sylvestris fructu rotundo atro C. B. ad Baias inde
 pibus.
 Polemonium petraeum Gesneri 7. B.
 Lychnis flo. parvo purpureo, brevissimis pediculis inf.
 stente. an Lychnis 5. Clus?
 Echii nova species. q.

In rupibus & pascuis circa Baias & Purcoles

- C** Yrtis Maranthæ filiquâ lunatâ.
 Acanthus mellis five Branca ursina.
 Laurus tinus.
 Acacia altera trifolia Ger.
 A. Gnaphalium maritimum.
 Moly parvum caule triangulo C. B.
 Centaurium luteum novum Col.
 Cerinthe folio lævi, flore luteo.
 Gramen tremulum maximum. Alopecuros Ger.
 Lagopus major Ger.

In Vesuvio monte ejusque vicinia.

- H** Elanthemum flo. maculoso Col.
 Onobrychis fructu echinato minor C. B.
 Trifolium stellatum C. B.
 Lathyrus gramineus flore coccineo.
 Colutea scorpioides & vesicaria. Lotus arbor.
 Genista Hispanica. Arbutus.
 Linaria graminea flore cæruleo, erecta, floribus conge-
 stis purpureis C. B.

Propè montis verticem inter cineres, ubi nihil ferè aliud crevit Acetosa ovilla sive Oxalis minima.

Circa Messanam, in lingua illa inter fretum Siculum & portum Messanensem.

P Eucedanum majus Italicum.
Linaria pumila angustifolia flo. luteo, vulgari similis : an pumila Hispanica *Clus?*
Sideritis verticillis spinosis.

Glaux peregrina annua, sub nomine Securidacæ à Londinensibus olim missa.

Vicia sylvestris maritima multiflora floribus albis, vel pallide cæruleis.

Jacea lutea caule alato, capitulis spinosis, spinis sursum spectantibus : Carduus solstitialis.

Lunaria biseutata *J. B.* Trifolium stellatum.

Polygonum niveum montanum *Park.*

Securidaca filiquis planis dentatis *Ger.*

A. Trifolium capitulis globosis sine pediculis caulibus adnexis.

Trifolium capitulis rotundis mollibus, Lagopus maximus *Ger.*

Gramen tremulum maximum.

Melilotus major lutea spica florum brevior, verum seminibus grandioribus quam vulgaris.

Agilops Narbonensis *Lob.*

Ornithopodio similis hirsuta scorpioides *C. B.*

Graminis alopecuroidis nova species.

Sylvestrium majus *Clus.*

In lateribus montium supra urbem.

R Icinus vulgaris sive Palma Christi copiose.

Caucalis minor pulchro semine sive Belionii *J. B.*

Ammi vulgare, & folio magis dissecto.

Convulvulus argenteus Althææ folio, *C. B.*

Alfine

Alfne oblongo folio serrato flo. cæruleo *J. B.* *Speculum Veneris medium nobis dictum.*

Valeriana Mexicana Ger.

Sonchus lanatus Dalechamp. *Arbutus.*

Geranicum cicutæ folio, acu longissima C. B. *Cretico dicto simillimum est, nisi quod folia magis dissecta majisque hirsuta sint.*

Lupinus sylv. flore luteo.

Lychnis parva, folio angusto, flo. rubello. Ab aliis facile distinguitur, quod calyx floris prælongus sit & tenuis ipsaque florum foliola in medio ad unguem propè fissâ quemadmodum in *Alfne* majori, *Gramine leucanthemo* & similibus.

Senecio quædam folio Bellidis, aut Jacobææ Senecionis folio. Calyx floris *Seneciois* calycem exactè refert, verùm circulum seu coronam habet foliolorum luteorum in margine ad modum *Chrysanthemi*. Plantula tenera est, radice fibrosa, foliis *Bellidis*. *Sen. folio non laciniato J. B. C. B.*

Trifolium halicacabum sive vesicarium J. B.

Hedysarum clypeatum flo. coccineo & flo. albo.

Trifolium bituminosum ubique.

Lotus flore fusco tetragonolobus J. B.

Gladiolus Narbonensis. Medica orbiculata J. B.

Medica echinata elliptica, sive ovata.

Scorpioides siliquâ campoide hispida J. B.

Anagyris foetida.

Crista galli flo. luteo grandi. Radix ei ramosa & non simplex, annua tamen. Caulis erectus, firmus, quadratus, cubitalis aut etiam altior, nonnihil lanuginosus. Folia plerunque ex adverso bina longa, angusta pallidè viridia rariùs dentata, & omnino foliis *Cratægoni* *Euphrosynes* facie similia sed crassiora. Spica florum in summo congesta, quadrata, lanuginosa & nonnihil etiam viscosa. Flores lutei ampli cucullati, figurâ florum *Ladani* segetum.

Hæc planta unâ cum sequenti ad *Antirrhinum* à *J. Bauhino*, quantum conjicio, refertur : verùm vasculum seminale non convenit. Propius accedit ad *Euphrasias* aut *Alectorolophos*. Eandem putamus quam *Columna*

lumna describit sub titulo Trixaginis Apulæ unicaulis
τριξάγινος.

Crista galli flo. vario ex albo & purpureo. Priori simillimum est; in his præcipue differt, quod non sit adeo procerum, quod caules & interdum etiam margines foliorum rubeant, quod flores minores nonnihil sint & diversi coloris, cuculli v. g. rubent. Labella in medio albet, ad margines rubore diluantur.

Holosteum plantagini simile *J. B.*

Gramen dactylongeminâ duntaxat spicâ.

Asphodelus major ramosus flo. albo *J. B.*

Aster luteus foliolis ad florem rigidis *C. B.*

Trachelium parvum folio Bellidis subrotundo. *Radix* ei alba simplex lignosa annua. *Caulis* erectus striatus: folia alternatim posita, subrotunda, sine pediculis caulibus adnexa.

Trifolium album rectum hirsutum valde *J. B.*

Portulaca sylvestris.

Cuminum sylvestre alterum Dioscoridis Italarum *Lob.*

Medica orbiculata fructu circum oras dentato.

Pseudomelanthium glabrum Caryophylli facie. *Radix* ei alba lignosa, unde & ipsam plantam annuam esse apparet. *Caulis* nunc simplex nunc multiplex, rotundus, lævis ab imo statim, ramosus pro ratione foli in quo crescit magis minusve pedalis aut cubitalis. Folia ad genicula bina ex adverso longa, angusta, Graminis Leucanthemi foliis nonnihil similia, raris pilis hirsuta. Flores in summitatibus ramulorum pediculis longis insidentes, ut in Caryophyllis & Lychnidibus ferè sit, quinquefolii, pallide purpurei, vice staminum in medio habentes calycem foliorum quinque in summo bifidum. Calyx floris striatus quemadmodum & Pseudomelanthii.

Trifolium angustifolium spicatum *J. B.* v. descrip.

Sedum echinatum vel stellatum flo. albo.

Abfinthium arborescens *Lob.*

Anthyllis maritima alfinefolia C. B. Radix huic nunc simplex, nunc ramosa, alba, pluribus fibris capillata. Cauliculi plures palmares, rotundi, rubri, humi procumbentes. Folia serpylli bina ex adverso. Flores in summitatibus conferti & Millegranæ minimæ similes.

Androsæmum foetidum capitulis longissimis filamentis donatis C. B. i. *Tragium*.

Acanthus Sativus.

Sedum medium flo. albo, apicibus luteis.

Thapsia latifolia P. Castello, aliis & vulgò *Ferulago*.

Betureia montis S. Juliani.

Halimus Lob. in sepibus juxta mare, *Tauromenium* verus, itemque propè Pharon abundè.

Oleander. Ad aquarum rivulòs frequens.

Sorbus domestica. *Myrtus angustifolia*.

Thymelæa foliis Lini C. B.

Hieracium calyce barbato Col.

Chondrilla saxatilis vilcosa caule *κνημιδοφόρα* Col.

Acetosa ocymi folio Neapolitana *βενιφαληφόρα* Col.

Scrophularia Ruta canina dicta C. B.

Linaria altera botryodes montana Col. *Passerina* Trag.

Asteries species an *Baccharis* Col.

Daucus tertius Dioscoridis, Col.

Carlina sylvestris Clus. *Carlina perennis polycephalos* & *multicaulis*.

Psyllium vulgare.

Kali majus semine cochleato. C. B.

Lotus arbor. *Ocimastrum Valerianthon* in muris.

Astirrhinum luteo flore C. B. *ibid*.

Chrysocome capitulis conglobatis Ger.

Colutea Scorpioides.

A. *Geranium moschatum*.

Alfine folio crasso P. Castelli in Catal. plant. Messan.

Lanaria five *Struthium Dioscoridis* Imperato J. B.

Tithymalus lini folio.

Foeniculum tortuosum five *Seseli Massiliense* Dod.

Agnus castus, in arenosis ad maris litus.

Scammonæ Monspeliacæ affinis foliis acutioribus C. B. *ibidem*.

Acarna flore purpuro rubente patulo C. B. v. descr.

Millefo-

Millefolium odoratum.

Sedum parvum vasculis seminalibus echinatis stellatis.

Hyacinthus major comosus purpureus *C. B.*

A. Anagallis foemina flore caeruleo. frequentissima.

Asparagus petraeus sive *Corruda*. *Ger.*

Smilax aspera.

Antirrhinum minus flo. carneo rictu striato.

Arum venis albis *C. B.* *Atractylis vulgaris.*

Heliotropium majus. *Blitum rubrum minus.*

Buglossum vulgare majus.

Carduus leucographus tenuifolius *Messanensis P. Castel.*

Carduus galactites *J. B.*

Observavimus etiam duas diversas *Echii* species, unam sc. caulibus maculatis, ad tactum magis asperam & ferè spinosam; alterum molliorem nec ità maculatam, hujus etiam caules magis procumbunt, cum alterius erigantur.

Cerinth flore pallidè luteo.

Chondrilla viminea *Lob.* *Cicer sativum.*

Plurimas etiam *Astragali* *Lathyr* & *Viciae* species, quas omnes distinguere non vacabat.

Cymbalaria Italica. *Cucumis asininus.*

Hyoscyamus foliis rotundiusculis, floribus pallidè luteis.

Cynoglossum majus floribus expansis pallidè luteis, à nostrate (si bene memini) diversum.

A. Juncus acutus maritimus capitulis rotundis. *C. B.*

Stoebe Salmantica prima *Clus.*

Caucalis marina supina echinato magno fructu *J. B.*

Melanthium sylv. *Lob.* *Oxys lutea* *J. B.*

Reseda alba *J. B.* *Rhamnus primus* *Clus.*

Scrophularia urticae foliis *C. B.*

Linaria pusilla procumbens flo. albo rictu luteo. Radix huic simplex quidem sed multis fibris majoribus praedita, sublutea, annua. Cauliculi exinde emergunt plures, infirmi, rotundi, palmares humi procumbentes, glauci, quemadmodum & folia quæ nunc singula, nunc bina ex adverso, nunc terna & interdum etiam quaterna simul oriuntur; & proinde ramuli nunc singuli, nunc bini, nunc terni simul oriuntur. Folia poly-

goni foliorum æmula sed minora. Flores longis pedicellis subnixi albi, rictu luteo, calcaribus tenuibus longissimis. Pars illa floris quæ erigitur in medio fissa duas veluti auriculas repræsentat, ut in *Linaria purpurea* parva *J.B.* Florem circumstant quinque foliola viridia velut calix. Postquam flos evanuit ejus pediculus deorsum incurvatur. Vasculum seminale rotundum, sed tamen, si curiose spectetur, duos habet lobos feminibus repletos pusillis rufis. Frequens est Messanæ in vineis & hortis. Quàmprimum semen maturescit seminale vasculum dehiscit, adeò ut difficile sit semina ejus colligere. Floret Maio & Junio. *Melissæ* similis, foliis parvis, flo. albo, labro punctato.

Lamium fruticosum non maculatum *Creticum* *Zanon.*

Tithymalus dendroides. *Teucrium vulgare.*

Iberis Cardamantica. *Alaternus.*

Elatine folio acuminato flo. cæruleo *C. B.*

Cyperus paniculâ sparsa speciosâ *J. B.*

Anthyllis leguminosa flo. purpureo.

Erica arborescens ramulis ternis *J. B.*

Tithymalus folio longo glauco, caule rubro, feminibus verrucosis.

Securidaca lutea minor corniculis recurvis *C. B.*

Helianthemum flo. luteo erectum annuum, an *Tuberaria Myconi?*

Ononis purpurea parva procumbens, sive minima supina.

Catania in litore maris & locis vicinis.

Plumbago Plinii.

Agnus castus.

Juncus acutus maritimus capitulis rotundis *C. B.*

Rubia marina *Ger.*

Anonis lutea parva procumbens. In Arenosis crescit radice albâ longâ simplici raris fibris capillatâ [in nonnullis fibræ plures sunt & majores] Cauliculi plures rotundi villosi, nonnihil rubentes, humi procumbunt. *Folia* parva tripartitè divisa pediculis nullis, (verùm duæ divisiones inferiores caulem amplectuntur, ut in *Lotis* fit,

fit, ac proinde hæc planta eo modo trifolia est quo Lotus quinquefolia) saturè viridia, in margine eleganter dentata, alternatim posita & non ex adverso. Flores lutei Anonidis. Siliquæ breves tumidæ subrotundæ duobus intus ordinibus seminum figurâ lienis. In arenosis maris litoribus in Sicilia frequens, non hæc duntaxat, sed ad promontorium Pachynum & Puzallu, &c.

Geranium Althææ folio dissecto.

Sedum minimum murale non acre totum rubrum flore hexaphyllo purpureo. In muris & tectis copiosè.

Medica doliata lævis.

Scammonææ Monspeliacæ affinis foliis acutioribus C. B.

Circa Syracusas.

Verbascum 4. Matthioli.

Majorana flore albo capitulis squammatis rotundiusculis. q.

Melissæ similis seu Moluccæ, floribus albis labro punctato. Cortex ramorum antiquiorum cinericeus, juniorum virgularum ruber : Caules quadrati : Folia bina ex adverso Melissæ, minora, crenata, pediculis satis longis subnixa : Flores cucullati albi cum aliqua tamen arboris mixtura, labello punctato. Vascula seminalia qualia Moluccæ lævis ferè, excepto quòd in quinque lacinias dividantur, tribus superius duobus inferius sitis quatuor singula continentes semina Moluccæ similia odor plantæ gravis.

Teucrium Bæticum Ger.

Anonis purpurea parva procumbens.

Thymum Creticum Ger.

Jacea lutea capite spinoso C. B.

*Ad Promontorium Pachynum in insula abi
turris presidio Hispanico tenetur.*

- Lotus flore fusco tetragonolobus.
Siliquis Ornithopodii.
flo. luteo, siliquis magnis recurvis, an Latopisum
Belli? Lentiscus.
- ~~Chamaerops~~ Plinio, Palma minor C. B. copiosè.
Limonium elegans Rauwolfii.
A. Gnaphalium marinum.
Chrysanthemum Creticum.
Aster luteus foliis ad florem rigidis C. B.
Medica magna turbinata J. B.
Auricula muris Camerario ejusdem.
Medica doliata spinosa. Gnaphalium roseum.
Hedysarum clypeatum minus flo. purpureo, An. Onobry-
chis semine clypeato aspero minor C. B.
Onobrychis minor flo. parvis purpureis semine echinato
grandi. Onobr. fructu echinato minor C. B.
Trifolium halicacabum five vesicarium. Lotus penta-
phyllus vesicaria C. B.
Asphodelus major ramosus flo. albo.
luteus, five Hastula regia.
minor ramosus flo. albo.
- Echium procumbens flore parvo cæruleo.
Ornithogalum spicatum Ger.
Jacea lutea capite spinoso C. B.
Sylbum majus annuum Park.
Carduus galactites J. Bauhini. Sive minor flore palli-
diore.
- Teucrium Bæticum Ger.
Scorzonera foliis angustis incanis, floribus dilutè pur-
pureis.
- Sanamunda 3. Clus. Caules habet hic frutex rotundos in-
canos, folia Illecebræ in crucis formam disposita, su-
pina parte viridia, pronâ incana. Flores parvos ex
herbaceo luteos, quadrifolios.
- Asteris species an Baccharis Col.

- Anonis lutea non spinosa, Dalechampio Natrix *J. B.*
 Campanula minor foliis violæ foliorum æmulis, floribus
 cæruleis : nobis *cærulea Hispanica* dici solita.
 Ammi vulgare & foliis magis incis. *J. B.*
 Medica orbiculata *J. B.*
 Tordylium. Caulalis major, sem. minùs pulchro hirsuto *J. B.*
 Scorpioides siliquâ campoide hispida *J. B.*
 Crithmum spinosum sive Pastinaca marina.
 Linum sylv. flo. parvo luteo. Passerina *Lob.* Radix ei
 alba simplex lignosa. Caules pedales & altiores rotundi. Folia lini nullo ordine positi. Flores parvi
 lutei quinquefolii ; pediculis vel nullis brevissimis.
 Aparine semine verrucoso.
 Trifolium stellatum *C. B.*
 Moluca sylv. flo. albo, antea descripta.
 Nigella vulgaris. Systrygium majus *Clus.*
 Ægilops Narbonensis. Limonium minus *J. B.*
 A. Leucoium murinum majus, folio sinuato.
 Cichorea spinosa Cretica *Pon.e.*
 Daucus folio splendente.
 Asparagus sylvestris petræus sive Corruda.
 Beta aculeato semine seu Cretica *Ger.*
 Tragos sive Uva marina major *J. B.* Frutex hic interdum humanam altitudinem excedit. Color caulium adultiorum cinereus. Folia habet nulla, sed viticulos solummodo geniculatos saturè virides Equiseti instar. Flores ad nodos seu genicula verticillati lutei è staminibus compositi. Fructum non vidimus.
 Trifolium capitulis glomeratis, glomerulis spinosis.
 Linum sylv. cæruleum. Calendula minor sylv.
 Atractylis. Philyrrea 2. serrata *Clus.*
 Cruciata minima muralis *Col.*
 Iva moschata Monspeliensium. Corruda 3. *Clus.*
 Coronopus foliis acutis in margine dentatis.
 Mava flore carneo minore. Ex rad. alba simplici plures emittit caules humi procumbentes hirsutos superius rubentes. Folia ima subrotunda, longis pediculis annexa : quæ in caulibus sunt in tres aut quinque lacinias divisa, hirsuta & circa margines crenata.

Flores parvi quinquefolii carnei. Semina Malvæ vulgaris.

Malva sylv. flo. carneo major.

Aizoon Scorpioides.

Geranium procumbens Althææ folio minus. Cauliculi ex eadem radice plures, humi procumbentes, rotundi, rara & brevi lanugine obtekti. Folia Althææ bina ex adverso in margine crenata, non autem laciniata, ne illa quidem quæ in summis ramis consistunt. Flores purpurei parvi: Rostra breviora.

Ad portulum & promontoriolum dictum Punto Cerciolo, non longè à Castello Puzallu in Sicilia.

Panax Herculeum majus Ger.

Cinara sylvestris. Utrumque copiosè.

Ruta sylv. major.

Hieracium falcatum seu semine adunco.

Limonium elegans Rauwolfii.

Beta aculeato semine Ger.

Medica orbiculata 7. B.

orbiculata, fructu circum oras velut rugis dentato, per maturitatem albo.

doliata spinosa major.

Auriculæ leporis affinis, Odontitis lutea Valerandi & Dalechampii 7. B. Folia angusta sunt, acuta in caule alternatim posita. Caules rotundi: Flores velut in umbella, quos quinque foliola acuta stellæ radiantis modo circumstant; Flores Perfoliatæ lutei muscosi.

Siliqua arbor sive Panis S. Joannis.

Medica marina.

Panicratium radice grandissima, foliis latis, An Scyllæ quædam species?

Cistus mas 4. folio oblongo albido 7. B.

Lotus flo. lateo corniculis articulatis. Radix simplex alba, in nonnullis in fibras spargitur circa imum. Cauliculi plures, in terram procumbentes: Folia glauca, è quinque

quinque pinnis composita, si annumeres auriculas ad caulem adnexas (quod in omnibus Lotis usu venit) *Flores* parvi lutei trifolii corniculati, sed minores, ad nodos vel singulares vel bini & interdum terni simul. *Siliquæ* longæ tenues corniculatæ seu contortæ spiræ in modum, articulatæ, seminibus oblongis in singulis internodiis.

Caucalis marina supina echinato magno fructu *J. B.*
v. descript. nostram.

Smyrnium Creticum.

Gladiolus Narbonensis.

Polium montanum album.

Saxifraga Venetorum Lob.

Valeriana quædam annua. *Radix simplex alba tenera :*

Caulis singularis erectus pedalis, ab imo statim ramulosus. *Folia* bina ex adverso ad singula internodia, *Valerianæ sylvestris majoris*, laciniata. *Flores* parvi purpurei, in summitatibus ramulorum alii super alios alternatim scandentes. Color totius plantæ ruber, sapor amarus. Provenit in arenosis collibus, florens circa finem Maii.

Acanthium Illyricum.

Telephium Scorpioides Anguillaræ.

A. Orchis fuciflora.

Opuntia marina, *Sertolara Imperato.*

† *Arancio marino Imperat.* *Bursa marina Ces.*

In insula Melita.

Plerasque omnes easdem hîc observavi plantas quas in Sicilia, atque insuper,

Hypericum supinum tomentosum Lob.

Delphinium flo. cæruleo obsoleto minore.

Carduum lacteum peregrinum Cam. potius *Sylibum majus annuum Park.*

Echium majus & asperius flo. albo, *C. B.*

Vulgò autem hic feruntur : *Anisum.*

Cuminum semine lævi.

aspero.

Gossypium seu *Xylon Ger.*

Prope

*Prope Tauromenium.**Glycyrrhiza vulgaris.**Asparagus sylvestris spinosus Clusii Ger.**Verbascum quartum Matthioli, in ascensu montis prope urbem, copiose.**Marrubium album fatuum P. Castelli.**Circa Rhegium in Calabria.**Palma Christi seu Ricinus copiose.**Medica echinata & cochleata variae species.**Caput gallinaceum minus.**Vitex seu Agnus castus.**Scammonia Monspeliaca affinis foliis acutioribus.**Fithymalus Myrsinites latifolius C. B. copiose.**An Lotopisum Belli? Botrys Officin.**Tribulus terrestris. Hic in regionibus calidioribus ubique provenit. v. Descrip. nost.**Erysimum Matthioli alterum Lob. v. Descrip. Plurimas alias invenimus cum Sicilia communes.**In itinere à Messana ad Neapolin. Circa Tropiam & S. Lucidum.**Ziziphus rutila Clus. in rupibus prope Tropiam & S. Lucidi oppidum copiose.**Conyza minor vera.**Ricinus.**Stoebe calyculis argenteis C. B.**Tragium, praeter alias plurimas quas in Sicilia quoque invenimus.**Circa*

Circa Scaleam & Portum S. Nicolai.

Lyfimachia galericulata folio urticæ hirsuto; *Lamium*
scutellaria dictum. Cupressus.

Rosmarinum vulgare, quod in toto hoc litore in rupibus
 copiosè provenit.

Sabina folio Cupressi C. B.

Cuscuta Belgarum. *Chondrilla* rara purpurea.

Meum vulgare an spurium *Italicum*? quod etiam circa
 Salernum in rupibus copiosè crescit.

Caryophyllus sylvestris ruber, an *Caryophyllus* sylv. hu-
 milis flo. unico C. B?

Scorzonera quædam minima.

Jacea nigra incana laciniata.

Herba foliis Ocyimi aut Serpylli, flo. *Valeriana*. Hanc
 nobis monstravit etiam Joannes-Maria Ferro Pharma-
 copœus Venetus, cui *Periclymeni* seu *Caprifolii* no-
 men imposuit. Ad portum S. Nicolai in rupibus.

Myrtus latifolia. *Auricula urfi* foliis cinereis.

Casia poetarum Lob.

Agnus castus: in hoc litore frequentissimus.

Campanula flo. cærulea grandi pentagono, folio campa-
 nula rotundifolia vulgaris, quæ in locis nonnullis hir-
 suta est, in aliis glabra.

Allium quoddam seu *Moly montanum*.

Circa Salernum.

Barba Jovis frutex, copiose.

Satureia durior J. B.

Laurus tinus, cœrulea bacca J. B.

Coronilla sive *Colutea minima*, Ger.

Melissa sylvestris hirsutior, minus odorata. An *Melisso-*
phylli sylv. genus *Marth*.

Echium majus & asperius flo. albo, C. B.

Rosmarinum vulgare. *Cardamine impatiens*.

Hemionitis multifida C. B.

Digitalis

Digitalis flo. parvo luteo, intus ferrugineo.
 Thlaspi umbellatum Creticum.
 Plantæ folio Urticæ aut Nepetæ, flore Lyfimachiæ gale-
 riculatæ purpureo. Lamium peregrinum Scutellaria
 dictum.
 Sorbus fativa.
 A. Peucedani facie pusilla planta Lob.
 Lotus arbor. Staphylodendron.
 Colus Jovis.
 Anthrimum majus alterum folio longiore C. B. flo. purp.
 Lentiscus. Alaternus.
 Conyza major Monspeliaca odorata J. B.
 Ricinus. Tithymalus dendroides.
 Valeriana rubra Dod. Chrysanthemum Bellidis folio.
 Periclymenum Italicum perfoliatum.
 Anagris foetida. Branca ursina.
 Martagon Chymicorum.
 Geranium Romanum versicolor five striatum Park.
 Tarton raire Gallo-provinciæ Lob. Ger. in rupibus mari-
 timis 3 à Salerno m. p. versus Neapolin copiosè.
 Cytisus glaber siliquâ latâ J. B.
 Sanamunda 3. Clus.

*Prope Neapolin ascendendo ad Monasterium
 Camaldulensium in sylvis & ad vias.*

Martagon Chymistarum Lob.
 Orobus sylvaticus vicinæ foliis C. B.
 Aristolochia rotunda. Laurus vulgaris.
 Lagopus maximus Ger.
 Chrysanthemum Bellidis folio hort. Pat.
 Digitalis lutea flo. minore intus ferrugineo.
 Hemionitis multifida copiosissimè.
 Colus Jovis: Horminum luteum.
 Cytisus hirsutus J. B. Hic in magnum fruticem ado-
 lescit, estque in Sicilia & regno Neapolitano frequen-
 tissima. Ferula.
 Genista non trifolia foliis hirsutis. An Genista tinctoria Hispanica Clus?

Casta-

Castanearum sylvæ.

Vicia flo. luteo sylvestris *J. B.*

Aster montanus luteus salicis glabro folio *C. B.*]

Millefolium odoratum: nobile *Tragi.*

Hesperis Italica. Hesperidi Alpinae affinis surrecta & magna.

Lotus corniculata siliquis singularibus vel binis tenuibus *J. B.*

Pancratium marinum *Ger.* in litoribus arenosis.

A. Peplis *Ad.* quæ in Angliæ litoribus invenitur. *ibid.*

Juncus cyperoides maritimus *Ad. Lob.* *ibid.*

Parvum Limonium Narbonense oleasfolium *Lob.*

*In foro olitorio venales fructus prostant
hic & Florentia.*

Melongena five Mala insana.

Limonia: fructus parvus Juglandi dum adhuc in herba-
ceo involucro latitat par. *Limoncelles* ibi & Romæ
(ubi etiam vulgares sunt) dicuntur. Nucleis carent.

Cucumis flexuosus anguinus *Lob.* Neapoli hujus generis
striati habentur, & Citrulli vocitantur.

Cucurbita anguina *Lob.* Longa est, tenuis & incurva, ex
ea Neapoli juscula conficiunt.

In reditu à Neapoli ad portum Liburnum.

Rosmarinum vulgare, variis in locis.

Q. Juniperus major Dioscoridis *Cins.* aliis Oxycedrus seu
Cedrus Lycia, in montosis frutetis & sylvis mari vici-
nis ubique feré.

Siliqua arbor. Circa Sperlongam.

Barba Jovis. In rupibus & clivis maritimis variis in locis.

Rubia maritima *C. B.* In arenosis propè castellum Astura
tribus ab Antio milliaribus copiose.

Thlaspi capsulis sublongis incanum, *J. B.* *ibidem.* In agris
inter Romam & Tusculum abundé.

Cichori-

- Cichorium verrucarium sive Zacyntha Ger. Ad Tiberidis
fluvii ripas, necnon in Etruria circa portum S. Ste-
phani non longè ab Orbetello multum.
- Lotus siliquosa lutea Monspelienfis *J. B.* Non longè à
specula seu castello ad Tybridis ostia sito.
- Aristolochia clematidis. *ibid.*
- Chamelæa secunda *Clus.* in rupibus propè turrim *Casti-
glione* in Etruria.
- Terebinthus *ibid.* *Paliurus. ibid.*
- Thlaspi biscutatum foliis Coronopo non longè dissimili-
bus *ibid.* q.
- Ambrosia maritima *C. B.* *ibid.*
- Cirsii quædam species quæ jam defloruerat. propè portum
S. Stephani. q.
- Chamaerhiphes *ibid.* & alibi etiam in clivis Peninsula
propè Orbetellum.
- A. Erica abietiformis. Erica Coris folio secundæ *Clusii*
species secunda, iisdem in locis.
- Draba quædam siliquosa foliis longis angustis incanis.
ibid. invenimus & Florentiæ. q.
- Sideritis pratenfis lutea *Lugd.*
- Linam sylv. folio angustissimo.
- Eryngium luteum Narbonense. Ad litora maris mediter-
ranei ubique ferè.
- Philyrreha angustifolia.
- Philyrreha 2. serrata *Clusii Ger.* an potiùs Philyrrea 1. ejul-
dem. Folia habet serrata brevia, acuta, saturè viri-
dia, brevibus pediculis nixa, ex adverso bina.
- Coronilla. In rupibus maritimis prope turrim *Castiglione*
in Etruria.

Liburni præter sæpiùs memoratas.

- Lotus Libyca Dalechampii.
- Trifolium album rectum hirsutum valdè *J. B.*
- Cichorium verrucarium sive Zacyntha, in arvis u-
bique.
- Blattaria flore luteo.
- Melissa sylv. hirsutior minus odorata, An Melissophylli
sylv.

sylv. genus *Matth.* Folia hujus hirsutiora sunt obtusioraque quam *Melissæ vulgaris* & odore caret. Ad sepes abunde.

Convolvulus minimus spicæfolius *Lob.*

Rapistrum monospermon. *Ammi vulgare.*

Lingua passerina *Tragi.*

Erica arborescens *Monspel.* floribus luteolis vel herbaceis minimis *§. B.*

Sideritis pratensis lutea *Lugd.*

Spina solstitialis *§. B.*

Aster foliis circa florem spinosis luteus.

Inter Liburnum & Pisas.

Aristolochia clematidis copiose.

Aster conyzoides *Gesneri*, quantum conjicio: Eadem sc. planta quam in *Germania* ad ripas *Rheni* copiosam invenimus.

A. Asparagus palustris.

Gramen supinum aculeatum *§. B.*

Leucoium bulbosum majus polyanthemum *Ger.* in palustribus propè *Pisas.*

Circa Florentiam, in canali cujusdam torrentis.

Elyngium luteum *Narbonense.*

Acarna flo. purpureo rubente patulo *C. B.*

Echium majus & *asperus* flore albo *C. B.*

Spina solstitialis. *Atractylis.*

Conyza odorata major *Monspeliaca.* *Galega.*

Scrophularia Ruta canina dicta.

Trifolium album rectum hirsutum valde, *§. B.*

Aster luteus foliolis ad florem rigidis *C. B.*

Salix viminibus rubris.

Juncus paniculis globosis: acutus *marit. capit. rotundis.*

Ageratum, sive Eupatorium *Mesues.*

Stoechas citrina angustifolia.

Nigella arvensis Cornuta *C. B.*

Sederi-

Sideritis vulgaris Ger.
Satureia hortensis, seu *durior*.
Lingua Passerina, Tragi.
Bellis cærulea caule folioso C.B. i.e. *Globularia Monspeli*.
Melilotus major candida Trag.
Chrysanthemum Bellidis folio.
Medica orbiculata ʒ. B.
Solanum hortense fructu flavo. *Melissa vulgaris*.
Chondrilla viminea viscosa. *Chamæsyce*.
Stoebe argentea Ger. *Ischæmon vulgare* Ger.
Gramen digitatum hirsutum ʒ. B.
Gramen paniculatum elegans Ger.
Bupthalmum vulgare Ger.

Alibi circa urbem.

Botrys copiosissimé.
Caucalis echinophora, spinis echinorum rubris.
Psyllium vulgare.
Cichorium verrucarium sive *Zacyntha*.
Jacea Oleæ folio, sive *Xeranthemum* ʒ. B.
Gnaphalii duæ species.
Tragos Matthioli à mari tam procul.
Gramen parvum echinatum ʒ. B.
Gramen amoris alterum, paniculis strigosioribus magisque
 sparsis.
Iris Florentina, in maris urbis copiosissimé.
 A. *Menthæ spicatæ* species foliis longioribus hirsutis cir-
 ca margines rariùs denticulatis prope fluvium Arnun
 supra urbem.
In collibus seu montibus vicinis.
Arbutus. *Laurus vulgaris*. *Lotus arbor*.
Cyclamen, autumnale *Hederæ folio*.
Philyrrea acuto serrato folio, an prima *Clus*?
Erica arborescens ramulis per intervalla ternis. ʒ. B.
Thymbra S. Juliani.
Cistus mas quatuor folio oblongo albedo ʒ. B.
Lychnis minima rigida Cherleri ʒ. B. Tenuem habet
 caulem, rotundum geniculatum, in plures ramos divi-
 sum,

sum. Folia Caryophylli graminea, ad singula genicula bina: Ramulos alternos: Flores brevissimis insident pediculis: Calyx floris seu vasculum seminale longum strictissimum: Semina longa nigra: Florem non vidimus.

Pyracantha; in sylvis juxta Arnem copiose.

Aristolochia Saracenica *ibid.*

Colutea vesicaria.

Rhamnus primus *Clus.*

Aster luteus folio Salicis.

Digitalis lutea flore minore.

Itinere à Florentia ad Romam.

Abinthium Romanum in collibus argillosis in agro Senensi, prout rectè observavit Cæsalpinus.

Abrotanum foemina sive Chamæcyparissus. juxta vias ab oppido S. Cyriaci incipiendo ad territorium usque Ecclesiasticum copiose.

Cinara sylvestris spinosior.

A. Colchicum. in pratis ubique.

Veronica spicata.

Aster luteus Linariæ folio, Tripolii flore.

Inter Volsinios & Viterbum.

Mespilus vulgaris. in sepibus.

Cornus mas. Cerrus, quercus species.

Satureia durior *f. B.*

Melissa hirsutior. Ad vias ubique.

Lepidium Aeginetæ sive Plumbago. Circa Volsinios & Romam vulgatissimum.

Conyza minor vera.

Vilnaga, Gingidium Anguillaræ. in agris Etruriæ copiosissime.

Acarna flo. purpureo-rubente patulo C. B. inter S. Cyriaci oppidum & Radicofani.

Helleborus niger hortensis flo. viridi : in vepretis montosis passim.

Cyclamen autumnale hederæ folio, in sylvis montosis ubique.

In sylvis montosis propè Viterbum.

Thlaspi umbellatum Creticum dictum.

Orobis sylvaticus Viciæ foliis C. B.

Carduus sphærocephalus latifolius vulgaris C. B.

Lyfimachia galericulata Lamii facie, Scutellaria.

Viola matronalis. Hesperis Italica dicta.

Casia poetarum Lob. Mespilus vulgaris.

Sorbus Sativa.

Linaria major purpurea nobis Hungarica dici solita.

Blattaria lutea.

Calamintha montana præstantior Lob.

Cytisus Hispanicus primus Clusii folio virescente J. B.

Cerrus minore glande.

Acer majus foliis rotundioribus & minùs laciniatis.

Polygonum vel Linifolia per terram sparsa flore Scorpioides J. B. in pascuis sterilioribus & ad agrorum margines.

Plumbago Plinii. Secus vias propè Romam copiosè.

Supra Romam in clivis sylvestris propè Tybridis ripas.

Arbor Judæ copiosè. Staphylodendron.

Lentiscus. Ilex arborea J. B.

Paliurus in sepibus abundè.

Lotus arbor. Laurus vulgaris C. B.

Laurus Tinus cæruleâ baccâ Lob.

Alkekengi. in fossis circa urbem.

Cyclamen autumnale. in sylvestris collibus nullibi non.

Smilax aspera.

Asparagus sylv. petræus five Corrua. per totam Italiam vulgat.

Styrax

Styrax arbor. Circa Tusculum in sepibus copiosissime.
Ballæ marin. in litoribus maris Mediterranei passim.

*Itinere à Roma ad Venetias usque intempesta
 hyeme suscepto nihil notatu dignum inve-
 nimus, præter Asterem quendam aut Cony-
 zam jam tum florentem, flo. luteo Calthæ
 persimilem.*

*Itinere à Venetiis ad Tridentum indeque
 ad Curiam Rhetorum, Tigu-
 rum & Genevam.*

Leucoium bulbosum minus triphyllon *f. B.* inter Bassa-
 num & Pontem Sigismundi, ad latera montium & in
 umbrosis.

Leucoium bulbosum 1. Tab. toto hoc itinere in Alpium
 convallibus frequentissimum.

Pulmonaria maculosa. inter Bolzanum & *Maran.*

Erica Coris folio flosculis purpureis cum staminibus nigris.
 in rupibus Alpium: inter Bassanum & Bolzanum, &c.
 ubique, florens Martii 17.

Mezereon Germanicum prope Solurn pagum. 15. m. p.
 Tridento distantem versus Bolzanum: in rupibus jam
 tum florens.

Sedum ferratum. in rupibus passim.

Fumaria bulbosa radice cava, in Alpium convallibus ad
 sepes ubique.

Pentaphyllum parvum hirsutum *f. B.* Floret Martio in
 saxosis & rupibus.

Sanicula Alpina guttata; in Alpibus Helveticis frequens
 occurrit.

Sedum Alpium gramineo folio lacteo flore *C. B.* Den-
 so cespite terram operit. Folia habet graminea, an-
 gusta, acuta, glauca, non pilosa, caryophyllorum
 quorundam foliis similia sed breviora; caules breves
 sunt

*Androsace
 lactea L.*

sunt vix duos digitos transverlos alti, rubentes villosi, brevibus & rubentibus foliis vestiti. Flores albi & quinque foliolis rotundiusculis tenellis compositi, cum staminibus in medio luteis.

Buxus, juxta lacum Lemanum copiosissimé.

Circa Genevam ubi aliquandiu substitimus.

Colutea scorpioides. in clivis sylvosis ad Rhodanum fl.

A. Melissophyllon Fuchsi flore albo & flo. vario ibidem & in colle *La Bastie* dicto.

Thlaspi oleraceum *Tab.* ibid. in vineis. B. p. foliis Perfoliatæ f. B.

Campanula persicifolia *Ger.* ibid.

A. Hieracium seu Pulmonaria Gallorum folio maculoso.

Chamædrys foliis laciniatis, *Lob.* Botrys verticillata f. B.

A. Herba Gerardi five Podagraria.

Mezereon Germanicum.

Pulmonaria maculosa. Pulm. Italarum ad Buglossum accedens f. B.

A. Christophoriana. A. Eryngium campestre.

A. Herba Paris : Solanum tetraphyllum.

A. Sigillum Solomonis. Polygonatum vulgare.

A. Lilium convallium. A. Chamæpitys.

Uva ursi & Radix Idæa putata f. B.

A. Aria Theophrasti. Alni effigie lanato folio major C. B.

Rapunculus spicatus sive comolus albus f. B. Omnes in colle *La Bastie*.

A. Rhamnus 2. *Clus.* in arenosis ad flu. Rhodanum, &c.

Thlaspi minus quibusdam, aliis Alysson minus f. B. in glareosis propè urbem frequens.

Consolida media Genevensis f. B. Ad vias & margines agrorum. Hæc mihi non videtur differre à Consolida media cærulea Alpina C. B.

Sinapi Genevense sylvestre f. B.

Pentaphyllum parvum hirsutum f. B.

Saponaria minor quibusdam f. B. Ocymoides repens polygonifolium *Ad. Lob.* in colle *La Bastie*.

Tanace-

- Tanacetum album *J. B.* in *Clusio* & ad Rhodanum.
 Typha minor *J. B.* in Saliceto ad ripas flu. Arve, non
 longe à ponte, & alibi ad eundem fluvium.
 Lilium flo. nutante ferrugineo majus & minus *J. B.* in
 colle *La Bastie*. Unifolium *ibid.*
 Galega nemorensis verna *J. B.* i. e. Orobus Pannoni-
 cus 1. *Clus.* *ibid.*
 A. Alnus nigra baccifera *ibid.*
 Hepatica nobilis *ibid.*
 Chamædrys falsa maxima, an Teucrium 1. five majus
 Pannonicum *Clusio J. B.* *ibidem.*
 Gramen locustis rubris *J. B.* *ibidem.*
 A. Ornithopodio affinis, vel potius Soleæ aut Ferro equi-
 no herba *J. B.* Ad agrorum margines frequens. Ea-
 dem hæc est quam in Cat. plantarum Cantabrigiensium
 Polygon. Cortusi falsò nominavimus.
 Trifolium purpureum majus folio & spica longiore. In
La Bastie & ad Rhodani ripas.
 Trifolium pratense album à Fuchfio depictum five mas
J. B. in pratis & ad semitas circa urbem.
 Astragalus major Fuchfio *J. B.* in colle *La Bastie* co-
 piolè. Orobus Pannonicus 2. *Clus.*
 Tithymalus cyparissias *J. B.* in agris ad aggeres ubique
 & in glareosis circa propugnacula.
 A. Tithymalus platyphyllos Fuchfii *J. B.* In aggeribus
 sepium prope S. Gervasium trans Rhodanum.
 Tithymalus non acris flo. rubro *J. B.* in *La Bastie*
 monte.
 Pysyllium majus supinum, *J. B.* in arenosis propè fluvium
 Arve copiolè. Perenne est hoc Pysyllium. N. B.
 Horminum luteum glutinosum C. B. Galeopsis species lu-
 tea viscida odorata nemorensis *J. B.* i. e. Colus Jovis :
 in colle *La Bastie*.
 Lysimachia filiquosa speciosa angustifolia *J. B.* i. e. Cha-
 mænerion Gesneri, in arenosis ad fl. Arvam.
 Scrophularia Ruta canina dicta C. B. *ibid* copiolè.
 A. Chamædrys vulgaris.
 A. Artemisia tenuifolia five leptophyllos, aliis Abrota-
 num sylv. *J. B.*
 Phyteuma Monspelienfium *J. B.*

Periclymenum rectum fructu rubro & nigro *J. B.* in se-
pibus passim. Quod fructu est nigro hic non habetur.
Betonica coronaria sive Caryophyllus sylv. vulgarissimus
J. B. in pratis.

Trifolium albo-incarnatum spicatum sive Lagopus maxi-
mus *J. B.* Propè urbis propugnacula versùs Rhoda-
num.

Gallitrichum sylv. vulgò, sive Sclaræa flo. cæruleo pur-
pureo ve magno *J. B.*

Orchis galea & alis ferè cinereis *J. B.* Descriptionem
vide in Hist. nost.

A. Orchis myodes. eadem quæ habetur in Anglia in
sylvosis aggeribus non procul à Rhodani ripis ex ad-
verso *La Bastie*, & alibi copiosè.

A. Orchis fuciflora galea & alis herbidis. *ibid.*

A. Orchis anthropomorphos flo. ferrugineo. Hujus de-
scriptionem vide in Hist. nost.

Asine muscosa quibusdam *J. B.* V. descript.

Ageratum purpureum Dalechampii *J. B.* in petris ad ra-
dices montis *Saleve*.

A. Crista galli utraque mas & femina *J. B.* In pratis
juxta fluv. *Arve*. Distinctionis notæ omnes habentur
in *J. Bauh. hist.*

In Monte-Saleve propè Genevam.

Sanicula Alpina guttata *J. B.* in summitate montis propè
fontes.

A. Saxifraga aurea *ibid.*

A. Gnaphalium montanum album & purpureum, in pas-
cuis in cacumine montis copiosè.

Gentiana vulgaris major Hellebori albi folio *J. B.* *ibidem*
copiosissime.

Valeriana Alpina folio integro. an Alp. prima *C. B.* ?

Gentianula quæ Hippion *J. B.* In pascuis in summitate
montis ubique.

Cacalia quibusdam *J. B.* in sylvosis in summitate montis
abundè.

Polygonatum angustifolium. *ibid.*

Polygo-

Polygonatum latifolium minus flore majore *J. B.* in saxosis ad latera montis.

Hesperis Alpina sive muralis minor repens *J. B.* Juxta fontes propè montis cacumina.

A. Ribes Alpinus dulcis J. B. in sylvosis prope summum fastigium. *Laburnum* sive *Anagyris*, in ascensu.

Polygonum Cortusi J. B. variis in locis tum in ascensu tum in summitate montis. Folia in hoc non rarò quinq; interdum sex pinnularum conjugationibus constant.

Chamæcerasus Gesneri vel *Chamæpericlymenum* quoddam *Alpinum J. B.* i. e. *Xylosteum Allobrogicum.* in sylvosis ad latera montis.

Doronicum vulgare J. B. D. radice *Scorpii C. B.* at radix nihil habet scorpio simile.

Coralloides altera sive septifolia *J. B.* in sylvosis.

Ulmaria major. ib. *Barba capri J. B.*

A. Lilium convallium.

Digitalis lutea flore minore.

A. Christophoriana. *Aconitum racemosum Actæa* quibusdam *J. B.*

Lilium flo. nutante ferrugineo majus *J. B.*

A. Polygonatum vulgare. *A. Phyllitis.*

A. Barbarea muralis J. B. *A. Aria Theophrasti.*

A. Polemonium petraeum Gesn.

A. Melissophyllum Fuch.

Colutea Scorpioides. *Thlaspi oleraceum Tab.*

A. Pimpinella saxifraga major. Eadem hæc est cum illa quæ in nonnullis Angliæ sylvis copiosè crescit.

A. Fraxinus bubula i. e. *Sorbus aucuparia J. B.*

A. Alchimilla vulgaris. in pascuis in suprema montis parte copiosè.

A. Aquilegia vulgaris. *A. Asperula odorata.*

A. Agrifolium. *A. Viola tricolor.*

A. Pyrola vulgaris. Hæc, quamvis in Anglia crescunt & spontaneæ sint, ideò memini, ut inde elucescat veritas dicti illius *Lobelian* quod in Catalogo plantarum Cantabrigiensium, citavimus, nimirum. Quæ in jugis montium calidarum regionum proveniunt eadem in opacis, sylvis, sylvosis & dumetis regionum Septentrionalium plerunque exeunt.

Pyrola folio serrato *J. B.* fol. mucronato serrato *C. B.*
cum priore.

A. Filix ramosa minor *J. B.* Hæc est *Dryopteris Tragi.*
Libanotis Theophrasti *J. B.* in ascensu montis inter saxa.
Siler montanum.

A. Carum. in pratis, etiam propè urbem copiosè.

Lactuca sylvatica purpurea *J. B.* in sylvosis.

Cyclamen.

Filix saxatilis non ramosa minima. in saxorum & rupium
fissuris.

Betonica coronaria sive *Caryophyllus gramineus pusillus*
J. B.

Aconitum lycoctonum luteum *C. B.*

Vicia maxima dumetorum *J. B.*

Phyllon thelygonon Dalechampsii *J. B.*

Hesperis Alpina minor, flo. albo, siliquis longis. Radix
ei simplex fibrosa alba. Folia juxta terram plura *Belli-*
dis majoris aut *Hyoseridis* malculæ nonnihil similia sed
breviora, per oras rarioribus incisuris dentata, extre-
mitatibus subrotundis, atrovirentia, rarioribus pilis &
brevioribus, iisdem tamen rigidioribus, aspera, eodem
ferè modo quò *Buglossæ* luteæ. E foliorum medio
emergunt caules rotundi, rubentes rarioribus pilis do-
nati foliis vacui præterquam ad florum pediculos. Flo-
res in summitate caulium quinque vel sex, vel etiam
plures paucioresve, albi, quadrifolii è calyce longius-
culo quadrifolio exeunt. Sequuntur siliquæ duos vel
tres digitos longæ compressæ. In summitate montis
sub initium Maii florere incipit. Notandum autem
est, quòd circa medium caulis emergit pediculus seu
ramulus sustinens flores duos aut tres. Accedit non-
nihil ad *Hesperin Alpinam* *J. B.*

Colus Jovis. *A. Peucedani* facie pusilla planta *Lob.*

Sedum serratum. *A. Vaccinia nigra.*

Epimelis. *Cotoneaster Gesneri* *J. B.*

Diospyros *J. B.* in sylvosis ad latera montis.

Gramini Luzulæ affine flo. albo *J. B.* *ibid.*

Rosa rubello flore parvo simplici non spinosa *J. B.*

ibid.

Radix

Radix Idæa putata & Uva ursi *J. B.* in suprema parte montis.

Rubus Alpinus humilis *J. B.* Flores albi sunt exigui, quinquefolii, foliolis non expansis sed erectis, & numeroſa ſtamina obvallantibus.

Phalangium pulchrius non ramosum *J. B.* propè dirutam arcem.

Gramen montanum cyperoide perexiguum ſeminibus bullatis.

A. *Gramen ſeminibus aſperis pulicibus ſimilibus.* in pratis vicinis Salevæ. *Flea-grass.*

A. *Orchis bifolia alba calcare oblongo,* *C. B.*

A. *Caucalis tenuifolia floſculis albis.* in arvis.

Rubia cærulea erectior elatiôrve *J. B.* inter ſegetes propè dirutam arcem.

Thymelæa incana Genevenſis. Ad pedalem & ſesquipedalem altitudinem aſſurgit hic frutex; in plures ramos diviſus. Cortex ei cinereus: lignum ſupra modum fragile: Folia Mezerei Germanici, minora tamen, acuminata, glauca, utrinque hirsuta. Flores in ſummitatibus ramulorum conferti quatuor vel quinque, vel etiam plures ſimul, pediculis nullis, nullo calice. Flos ipſe è tubo longiuſculo in 4 foliola albida acuminata expanditur, intus continens ſtaminula crocea. Flori ſuccedit bacca, quam maturam non vidi. Ex ipſis ſaxorum rimis emergit, ſoretque Maii menſis initio.

Thlaſpi Alpinum minus capitulo rotundo *C. B.* Radix huic ſatis craſſa pro plantulæ modulo. Folia exigua, intenſè viridia, pediculis longis, ſuperiùs hiſpida, aſperave ut *Paronychiæ vulgaris* aut *Alſines myoſotis* magno flore, (cujus etiam foliis ſimilia ſunt, ſed minora) neque crenata, neque laciniata ut plurimum. Caulis palmaris interdum & altior, rotundus, viridis, foliis crebris ornatus, alternatim poſitis & non binis ex adverſo, baſi ſua caulem ferè amplectentibus, ut in *Acetoſa vulgari*. Suprema pars caulis in aliquot ramulos ſpargitur, quibus inſident flores denſi velut in umbella, albi, quadrifolii, pro plantulæ ratione grandiores, cum ſtaminulis in medio luteis. Primo aſpectu

Asper-

Myagrum saxatile L.

Aspergula flosculos credidi. Succedunt vascula semina rotunda: Maii 17. S. V. florentem inveni in Monte Saleve.

Nasturtium Alpinum folio alato. An Nasturtium Alpinum tenuissimè divisum *J. B.* Descriptionem v. in *Hist. nost.* p. 826.

A. Hypericum elegantissimum non ramosum folio lato *J. B.*

Melampyrum multis sive Triticum vaccinium *J. B.* inter segetes variis in locis propè urbem.

Orchis magna latis foliis, galèa fusca vel nigricante *J. B.* Ad latus sylvestris cuiusdam collis monti Salevæ vicini.

A. Allium ursinum. *ibid.*

A. Satyrium abortivum sive Nidus avis *ibid.* & alibi etiam ad lepes & in dumetis circa Genèvam.

A. Helianthemum Alpinum folio Pilosellæ minoris Fuchsi *J. B.* Ad radices montis.

Helleborine ex albido sublatea *J. B.* In sylvis quibusdam juxta montem.

Thlaspi umbellatum arvense amarum *J. B.* in arvis montosis.

Astragalus Monspeliano candidior & Onobrychis quibusdam *J. B.* In saxosis ad pedem montis & in ipsius vertice copiose.

A. Helleborine flo. albo *J. B.* in sylvestris propè montis fastigium.

Astrantia nigra. in pratis montosis.

Cicutaria latifolia hirsuta *J. B.* Ad rivulos, in iisdem montosis pratis.

Pentaphylloides erectum *J. B.* in monte Saleve propè arcem jam dirutam.

A. Chamænerium vulgare: in montis summitate.

Dentaria pentaphyllos. *ibid.*

Alibi in pratis, arvis, pascuis, collibus & dumetis.

Lotus filiquosa lutea Narbonensis *J. B.* in pratis non longè à fluvio Arve, copiosè.

A. Cha-

- A. Chamæmelum vulgare amarum *J. B.* inter segetes.
 Chamæbalanus leguminosa sive Terræ glandes. In vineis & segetibus extra portam S. Gervasii, trans Rhodanum.
 Lathyrus flo. coccineo. inter segetes propè urbem.
 A. Melampyrum cristatum. ad ulteriorem Rhodani ripam paulò infra urbem.
 A. Alphonelus bulbosus Dodon. sive Ornithogalum spicatum flore virenti *J. B.* inter segetes non longè ab urbe, versus *Salève*.
 Allium umbelliferum pratense *J. B.*
 Rapistrum monospermon: in fossarum quarundam aggeribus.
 Campanula rotundifolia minima *J. B.* in glareosis ad fl. *Arve*.
 Medica major erectior floribus purpurascentibus *J. B.* variis in locis.
 Rosa sylvestris rubella parvo frutice *J. B.* in collibus & dumetis circa Genevam copiosissimè.
 A. Rubia erecta quadrifolia *J. B.* in dumetis trans Rhodanum copiose.
 Melilotus quinta Tragi *J. B.* Ad agrorum margines.
 Gramen cum panicula molli rubente *J. B.* sive Gr. panicula graminea crispâ. inter segetes: crescit & in muris ipsius urbis.
 Tamarix Germanica sive minor fruticosa *J. B.* in alveo flumine *Arvæ*.
 Hyacinthus maximus botryoides coma cærulea *J. B.* inter segetes passim.
 A. Rapunculus vulgaris campanulatus *J. B.* Ad agrorum margines & in collibus. Maii mensis medio florere incipit.
 A. Thlaspi angustifolium Fuchsi, Nasturtium sylv. *J. B.* Juxta S. Gervasium etiam in muris urbis.
 Sedum parvum folio circinato flo. albo *J. B.* in muris ibid.
 Tragorchis minor flore fuliginoso *J. B.* Descriptionem vide in *Hist. nost.*

*In montis Jura ascensu ad verticem altissimum
Thuri dictum & in ipso vertice.*

Tussilago Alpina minor folio rotundo J. B. in summitate.

Helleborus albus vulgaris : in suprema montis parte per totum ipsius tractum copiosissimè.

Soldanella Alpina quibusdam J. B. ibid.

Scabiosa Alpina foliis Centaurii majoris C. B. in ascensu paulò infra verticem.

Ranunculus albus simplici flore J. B. in sylvis prope suprema montis juga.

Ranunculus montanus albus hirsutus J. B. ibid.

Thalictrum majus, folliculis angulosis, caule lævi J. B. ibid.

A. Oxalis folio rotundiore repens J. B. ibid.

Oxalis maxima sylvatica J. B. ibid.

Lonchitis altera cum folio denticulato, sive *Lonchitis altera Matthioli* J. B. in rupibus, in summo montis jugo.

Sedum seu Sempervivum majus. ibid.

A. Sedum tridactylites Alpinum. ibid.

Chamaedrys Alpina flo. Fragariae albo J. B. in iisdem locis.

An Auricula muris pulchro flore, folio, tenuissimo J. B.

Flos hujus minor esse videtur quàm *Bauhinianæ*.

Quin & foliola in extremo acutiora sunt, & non fissa sed integra. Apiculi insuper in floris medietullio capitulis pallide purpureis coronantur, quod ille non meminit. Accedit hæc plantula ad nostram *Saxifragam palustrem Anglicam*.

Antithora flore luteo Aconiti J. B.

Linaria purpurea parva J. B. in ascensu montis non longè à vertice. perelegans plantula.

Dentaria quinquefolia J. B. in sylvis ad latera montis.

Coralloides altera sive septifolia J. B. Cum priore.

Cacalia quibusdam J. B. ibid.

Plantago angustifolia Alpina J. B. in suprema parte.

Pentaphyllum five potius *Heptaphyllum* argenteum flo. muscolo *J. B.* in ascensu copiosè.

Phyllon thelygonon Dalechampii *J. B.*

Sigillum Solomonis angustifolium.

Echium Alpinum luteum *C. B.* i. e. *Alopecuros* Alpinus quibusdam, *Echium montanum* Dalechampii *J. B.*

Libanotis Theophrasti *J. B.* *Lib. latifolia* altera five vulgarior *C. B.* *Sanicula Alpina* guttata.

Helianthemum Alpinum folio Pilosellæ minoris Fuchsi *J. B.*

A. Bulbocodium vulgatius *J. B.* in ipso montis cacumine jam florens sine Maii.

Crocus vernus latifolius flo. purpureo minore *J. B.* *ibid.* & quidem tunc in flore.

Helleborus niger Saniculæ folio major *C. B.*

A. Carum.

Helianthemum tenuifolium glabrum flo. luteo. *J. B.* Ad radices montis.

A. Rapunculus flore globoso cæruleo *J. B.* *ibidem*, & in pascuis. *A. Pes cati.*

A. Ribes Alpinus dulcis *J. B.*

Lactuca sylvatica purpurea *J. B.* in sylvis prope juga montis.

Valeriana Alpina. v. in monte Salevæ.

Cyanus major. in ascensu versus supremam partem.

Polygonatum latifolium majus flore minore *J. B.*

Digitalis lutea magno flore *C. B.*

Thora folio Cyclamini *J. B.* in summitate montis copiosè. *Diospyros J. B.*

Veronica saxatilis parva cauliculis nudis; *Teucrium minimum* *Clus. hist.* Descriptionem v. *Hist. nost.* p. 846.

Nerium Alpinum quibusdam aliis *Ledum* glabrum *J. B.* in altissimis jugis saxosis.

Chamæspilus J. B. *ibid.*

Acini pulchra species *J. B.* in ascensu montis copiosè.

Veronica saxatilis J. B. Quam invenimus eatenus differre videtur à *Bauhiniana*, quòd flores dilutè purpurei sint, saturationibus lineis purpureis intus striati.

Chamæ-

- Chamadryi vulgari falsæ aliquatenus affinis, & Clinopodium Alpinum Ponzæ *f. B.* in altissimis montis rupibus.
- Gentiana Alpina magno flore *f. B.* in summis jugis.
- Bistorta minima *f. B.* Bist. Alpina media *C. B.* Specifice differre videtur à Bist. nostra Anglicana minore, quæ omnibus partibus minor est.
- Siler montanum, in rupibus copiosissimè.
- A. Orchis palmata flore viridi *C. B.* in montosis pascuis.
- Orchis rotunda Dalechampii *f. B.* Bulbi hujus speciei exigui sunt, oblongi. Folia longa, angusta, carnosa, subglauca, tres vel quatuor in caule, ad radicem nulla. Spica florum brevis densa congesta. Labella flosculorum saturationibus punctis purpureis notantur.
- A. Lunaria botrytis *f. B.* in pascuis montosis copiosissimè.
- A. Ranunculus flore globoso quibusdam Trollius flos *f. B.*
- Pilosella sive Pulmonaria lutea angustiore folio *f. B.* in rupium fissuris in suprema montis parte.
- Nasturtium Alpinum tenuissimè divisum *f. B.* Hoc specie differre videtur à Nasturtio nostro superius descripto.
- Alter purpureus montanus *f. B.*
- Viola Martia lutea *f. B.* in summitatibus montis.
- Sideritis Valerandi Dourez brevi spicâ *f. B.* Sideritis montana *Lob.* in ascensu, non longe à fastigio.
- Geranium phæo sive pullo flore Clusii *f. B.* Color floris in hac dilutior esse videtur quàm Geranii phæi flore reflexo *f. B.* & purpureus potius quàm fuscus. Foliis autem in floribus oræ laciniatæ non sunt sed potius crispæ aut sinuosæ. Tota insuper planta hirsutior apparet, ut ostendit etiam figura Clusii. Utcunque tamen accidentaliter potius ratione loci quàm specifice differre videtur. In sylvestris summis jugis.
- Daucus Creticus semine hirsuto *f. B.*
- Apium montanum nigrum *f. B.* Ad montis radices, invenimus & alibi pluribus Germaniæ in locis.

In eodem monte ascendendo, juxta oppidulum Fay & sequendo tractum montis indè usque ad altissimum dorsum seu verticem, La Dole dictum.

Sonchus cæruleus latifolius *℞. B.* in sylvis.

Tussilago Alpina folio longo *℞. B.* in duobus altissimis verticibus, *La Dole*, & *Thuri*.

Rapunculi genus folio serrato rotundiore *℞. B.* Tum descriptio tum figura *J. Bauhini* satis benè conveniunt plantæ nostræ. Folia nullis pediculis nituntur (intellico ea quæ in caulibus existant) latitudine verò unci-
am unam æquant, interdum etiam superant. Flores campaniformes pulchrè cærulei sunt, non tamen exeunt singulares è foliorum sinibus, quemadmodum eos re-
præsentat figura *Bauhini*: sed tres, quatuorve simul in uno ramulo seu pediculo communi.

Palmata minor odoratissima purpurea sive nigra *℞. B.* in pascuis montosis *Juræ* & *Saleve* copiosissimè.

Pentaphyllum Alpinum splendens aureo flore *℞. B.* In nostra florum unguis croceo saturo tinguntur. Obser-
vavimus florentem Junio.

Gnaphalium Alpinum pulchrum *℞. B.* in vertice *Dole* copiosè.

Asarum: in sylvis per quas ascenditur ab Abbazia de *Beaumont* ad *Dole*, non longè ab Abbazia copiosè.

Helleborine quædam, an flore atrorubente? An *Elleborine* sive *Damasonium* montanum quorundam flore violaceo angustifolium *℞. B.*? Flos in hac specie minor, est magis tamen expansus quàm in aliis plerisque, quin etiam labellum brevibus multò latiùsque pro ratione floris quàm in prædictis: totus autem flos minor, colore purpureo obscuro, qua in re præcipuè differre videtur ab *Helleborine Dodonæi* seu vulgari latifolia, qua etiam omnibus partibus minor. Spica prælonga, ut in illa, numerosis flosculis constat, cum aliarum quas invenimus 3. specierum perbrevis sit. Tardiùs etiam floret unà cum *Helleborine*. *Dod.*

Sedum

Sedum Alpinum pusillum hirsutum floribus carneis velut in umbellam dispositis. Chamæiasme. Radix huic exigua, nigricante cortice tecta, in superficie terra in multa capita se spargit, ut hujus generis reliquæ: quorum singula denso cæspite foliorum constat. Folia autem perexigua, oblonga, angusta, acuta, neque serrata neque dentata, crenatave: admodum villosa præcipuè circa margines; Paronychiæ vulgaris foliis figurâ suâ nonnihil similia. inter quæ exurgunt caules duarum triumve unciarum rotundi rubentes, villosi rigidi, foliis nudi, gestantes in summitate flosculos velut in umbella dispositos eodem fere modo quo Paralyfis montana. Singuli flosculi pedicellis brevibus insistant e calyculis exiguis turgidulis in quinque partes divisas exeuntes. Sunt illi revera unifolii, in quinque tamen partes seu folia expansa ab ipso statim centro adeò divisi ut quinquefolii videantur; quemadmodum in Paralyfi etiam fit. Singula autem segmenta (seu folia mavis dicere) in extremo rotunda sunt & non divisa, ut in Paralyfi. Color carneus, circa centrum tamen saturatius rubent. Stamina nulla neque stylus in floribus quos collegimus. Umbellæ exortum circumstant foliola ut plurimum quinque, ut in quibusdam aliis umbelliferis fit, & in Tithymalo helioscopio. Vascula seminalia reliquis hujus generis similia,

Hieracium montanum glabrum caule cubitali, flore singulari magno. Hujus descriptionem vide *Hist. nist.* P. 244.

Miscellanea circa Genevæ.

Pilosellæ majoris sive Pulmonariæ luteæ laciniatæ species minor *J. B.* E rupium fissuris in monte *Salève*.

Chondrilla folio non dissecto caule nudo *J. B.* ibidem.

Orchis strateumatica minor *J. B.* in monte *Salève*.

Valdè similis est Orchidi galeâ & alis ferè cinereis superius descriptæ: in eo differt, quòd alæ interioris purpureis lineis sunt striatæ, quòd labellum latius, ejusque superiores lacinie breviores, inferiores aureæ non

non breviores duntaxat, sed multis etiam numeris latiores, adeoque corpus humanum vix referunt omnino. Adde quod tardiùs floret, circa finem sc. Maii.

Pseudo-asphodelus quibusdam *J. B.* in paludosis quibusdam locis ad radices montis *Saleve*.

A. Orchis parva autumnalis lutea J. B. ibid.

Damafonium purpureum dilutum sive *Helleborine* 4. *Clusii J. B.* Ad latera montis *Saleve*, in dumetis præsertim copiosè.

Gramen agrorum venti spicâ Lob. Inter segetes circa *Lancy* non procul à *Geneva*.

A. Damasonii species quibusdam sive *Calceolus Mariæ J. B.* in sylvosis in ascensu montis *Saleve*.

Phalangium quibusdam parvo flore ramosius *J. B.* in colle *la Bastie* propè *Rhodanum*, & in omnibus montibus circa *Genevam* copiosè.

Allium sphærocephalum purpurascens.

Carduus Cirsium dictus folio laciniato nigrius J. B. in monte *Saleve*. Hujus descriptioni apud *Bauhinum* adde: Flores purpurei Jacez nigræ è capitulis squamosis. Squamæ longiusculæ molliores, sursum spectantes, non ad capitulum appressi sed extantes. Pediculi florum prælongi sunt, tomentosi, spinis destituti.

Campanula repens flore minore cæruleo *J. B.* in monte *Saleve* necnon in agris versus *Fay* copiosè. Per similis est hæc planta *Trachelio* majori, in nonnullis tamen differt. viz. 1. Quòd ejus caules rotundi sint & ferè glabri, *Trachelii* verò majoris angulosi & hirsuti sive pilosi. 2. Quòd in hoc flores versus unam duntaxat partem vergant, plerunque, & spica prælonga sit, cum in *Trachelio* quaquaversum diffundantur & spica multò sit brevior. 3. Quòd in *Trachelio* flores pluribus & longioribus pilis intus sint præditi quàm in hoc; quòdque *Trach.* in uno & communi pediculo 2 aut 3 flores plerunque appensos habeat, cum *Rap.* ut plurimum unum duntaxat. 4. Quòd in *Rap.* flores deorsum nudent, in *Trach.* erectiores sint, & in *Rapunculo* folia è quorum sinibus flores exeunt sunt minora. 5. *Rap.* mirificè per radicem serpit, *Trachelium* non item.

U

Denique

Denique Trachelium robustior est planta, & procerior plerunque quàm Rapunculus, ejusque folia profundius serrata sunt, & longioribus pediculis insident.

Heliotropium majus: Ad ripas fl. *Arve*.

A. Stachys Fuchsii. Ad vias.

Cynoglossum minus *J. B.* Extra muros juxta templum S. Gervasii in via publica & propugnaculi fossis.

Lathyrus siliquâ hirsutâ *J. B.* inter segetes prope urbem versus fl. *Arve*.

Atractylis flo. luteo vulgaris. Ad vias juxta urbem.

Libanotis altera quorundam, aliis dicta Cervaria nigra *J. B.* In collibus circa Genevam copiosè. Hæc est quam aliter Saxifragam Venetorum & Daucum selinoidem Cordi appellare solemus.

Anonis lutea non spinosa, Dalechambio, Natrix *J. B.* Juxta fl. *Arve* in glareosis alvei abundè.

Betonica coronaria squamosa sylvestris *J. B.* in pascuis & ad vias passim.

A. Carduus eriocephalos seu Corona fratrum. in monte Jura.

Orobis sive Ervum multis *J. B.* inter segetes non longe à *Jay*, per quas Genevam iter est.

Sedum echinatum vel stellatum flore albo *J. B.* in aggeribus sepium muscosis versus *Jay*.

Lathyrus anguloso semine *J. B.* Hujus secundæ species seruntur in agris circa Genevam, alia flore albo, alia flore diluto cæruleo saturationibus lineis purpureis carneisve striato. Cæterum hæ species à spontanea illa flore coccineo manifestè distinguuntur, non floris duntaxat magnitudine & colore, sed etiam siliquarum forma, nam in dorso (si ita loqui liceat) aut superiore siliquarum parte duæ membranæ [seu alas seu pinnas seu fimbrias mavis dicere] per totam longitudinem siliquæ decurrunt adeoque canaliculum seu fossulam efficiunt; in illa non item. Tum figura tum descriptio J. Bauhini huic plantæ adamussim quadrant.

Cicutaria aquatica hirsuta *J. B.* Non minus frequens in Jura quàm in *Salève*.

Cicer sylvestre herbariorum *J. B.* Glycyrrhizæ sylvestri persimile est. Radix videtur esse vivax, caules plures humi

humī procumbentes, rotundi, striati, brevi lanugine subhirsuti, crebris geniculis intercepti, ramosi. Folia Viciæ vulgaris aut Securidacæ per paria 12 aut etiam plura mediæ costæ adnectuntur cum impari in extremo, subglauca nervosa. E foliorum alis in summitatibus ramulorum emergunt spicæ florum longiores quàm in Glycyrrhiza sylvestri, aliàs eis perquàm similes tum universæ spicæ, tum singulorum flosculorum figura & colore. Succedunt vascula seminalia conferta velut uvarum acini in racemo, villosa, triangula, prætumida, vesicæ inflatæ aut Ciceris sativæ siliquis similia. in duos lobos secundum longitudinem divisa; adeò ut eam cordis formam quæ in chartis lusoriis pingitur aliquatenus expriment. Semina Glaucis vulgaris seminibus similes sed multis numeris minora.

Conyza media *Monspeliensis*, quibusdam *Asteris Attici* genus folio glabro rigido *J. B.* Ad sepes passim.

Pilosella minori flore hirsutior & elatior non repens *J. B.* in monte *Jura*.

Astragalus quidam montanus vel *Onobrychis* aliis *J. B.* Descriptio satis benè convenit nostræ plantæ, non autem figura : nostra caules habet rubentes, folia in acutum desinentia.

Caryophyllus sylv. humilis flore unico *C. B.* Florem habet purpureum quæ in summo monte crescit, odorum, folia glauca. Eandem esse puto quæ circa *Monspelim* squalidis & saxosis collibus passim provenit. Utramque plantam invenimus in altissimo vertice *Thuri* fine Junii.

Caryophyllus sylvestris flore tenuissime dissecto. An *Caryophyllus* sylv. alter flore laciniato odoratissimo *C. B.* Descriptio *J. Bauhini* non bene quadrat : Nostra enim planta caules habet tenues : folia ad genicula perangusta, graminea, prælonga : Quin & foliola ad basia calycis longiuscula sunt.

Virga aurea angustifolia serrata sive *Solidago Saracénica* *J. B.* in monte *Thuri*.

Lunaria major siliqua longiore *J. B.* ibidem, & in *Saleva*.

Hieracium montanum latifolium *Genevense* folio *Conyzzæ* majoris *Monspessulanæ* *J. B.* Ad latera montis *Thuri*.

Caryophyllus montanus tenuifolius lini flore. Radix ei lignosa vivax: Cauliculi plurimi ut in *Caryophyllis*, lignosi cortice cinereo tecti (vetustiores intelligo) geniculis crebris intercepti. Ad singula genicula folia ex adverso bina Tunicae minimae vel Spergulae purpureae, angusta graminea. Cauliculi ramosi inferius glabri, superius hirsuti flores gestant in summitatibus longis pediculis hirsutis insidentes, magnos, albos, quinquefolios, intus striatos, Lini floribus omninò similes, folia quippe habentes subrotunda & non fissa in extremo, quemadmodum reliqua hujus generis *Caryophylli*, non tamen deciduos ut in Lini speciebus, stamina continentes plurima sublutea vel ex albo ad herbaceum colorem tendentia. Vasculum seminale longiusculum crassum. In monte Thuri mensis Junii fine floret.

Alfina nemorosa montana, an maxima? montana hederacea maxima *Col.* Descriptionem vide *Hist. nost.* p. 1029.

Valeriana Alpina foliis in caulibus integris radice repente inodora. Descriptionem vide *Hist. nost.* p. 329.

Valeriana Alpina *J. B.* quæ *Valeriana Trachelii* folio rectè dicitur Horto Patavino. Descriptionem v. *Hist. nost.* p. 390.

Rapunculus angustifolius floribus purpureis amplis, *Rapunculi* genus folio serrato rotundiore *J. B.* Radix alba fibrosa dura. Caulis cubitalis angulosus angulis hirsutis præcipuè inferiore sui parte. Folia oblonga, angusta, circa margines dentata, sine pediculis nullo ordine cauli adnexa, inferiora hirsutiora, superiora magis glabra. Summus caulis è foliorum sinibus ramulos fundit, in quibus flores nunc singuli nunc bini aut terni, ampli campaniformes, longis pediculis nixi, in 5 segmenta profundiora divisi, pallidè purpurei, saturatoribus lineis striati, è calyce in 5 longissima foliola abeunte, quæ ad basin suam duabus tribulve hinc inde denticellis donantur. An *Rapunculus angustifolius* nemorosus magno flore major *C. B.*? In monte Saleve sub finem Junii.

Herba Doria. In ascensu *Saleve* propè Abbatiam Carthusianorum duabus à Geneva leucis.

Scabiosa latifolia rubro flore *J. B.* E radice lignosa, obliqua repente fibrosa caules erigit cubitales & altiores, rotundos hirsutos; inanes, propè terram punctulis seu tuberculis [fieri potest in quibusdam plantis ut hæc punctula desint] ex rubro nigricantibus notatos; è singulis tuberculis singuli emergunt pili. Folia ad radicem pauca, in caule per intervalla ex adverso binæ ferè amplectentia, Morsus diaboli similia, non laciniosa sed per margines duntaxat serrata, viridia, supina parte glabra, pronâ ad costam & nervos nonnihil pilosa. E foliorum alis emergunt itidem ramuli per paria ex adverso. In summitatibus caulis & ramulorum insident flores vulgaris Scabiosæ similes, ad purpuram vergentes aut ruborem. Cum in aprico crescit media foliorum costa interdum rubet aut purpurascit.

Ranunculus montanus hirsutus flore luteo. Hujus caules erecti sunt concavi admodum hirsuti, uti & folia.

Vicia sylvatica maxima Piso sylvestri similis *J. B.* Caules quadrati sunt & infirmi. Folia mediæ costæ annexa plurima, plerunque non directè ex adverso sita.

A. Caryophyllata aquatica flore rubro striato *J. B.* In monte Jura circa *La Dole*.

Pentaphyllum erectum flore albo. E fissuris saxorum emergit in ascensu montis *Saleve*, juxta portam max. Carthus. cœnobii quæ ad Gratianopolin ducit & alibi. Descriptionem vide *Hist. nost.* p. 614.

Ranunculus tenuifolius montanus luteus *J. B.* in montis Juræ præalta parte *Thuri*.

Pseudostachys Alpina *C. B.* ibid. Nostra flores habet sordidè purpureos, admodum villosos. Odor non ingratus, aliter satis bene respondet descriptioni Bauhini.

Bellis Alpina major rigido folio *C. B.* in summitate montis Juræ in pascuis copiosissimè: vidimus cum duobus floribus in uno & eodem caule, sed hoc rarum & accidentale.

Salix pumila Alpina latifolia, folio utrinque glabro, superne autem splendente. In summis jugis montis Juræ. *V. Hist. nost.* p. 1422.

*Sedum minimum montanum flore purpurascente parvo
semine stellato. Descriptionem v. Hist. nost. p. 692.*

Planta in Gallo-provincia observata.

Circa oppidum S. Chamas.

*Seseli Æthiopicum frutex. in rupibus vicinis copiosè.
Alypum montis Ceti, ibidem, & pluribus aliis in locis
montium saxosorum.
Coris Monspeffulana purpurea J. B. ibidem.
Ruta sylvestris major. ib.
Polygala Valentina 3. Clus. ib. & circa Massiliam etiam
& Tolonam copiosè.
Phalangium Cretæ Salonensis Lob. In campo lapideo
ubique.*

Circa Massiliam.

*Valeriana rubra Dod. copiosè.
Carduus galactites J. B.
Helianthemum folio Thymi incano J. B.
Tragacantha Massiliens. J. B. in rupibus maritimis co-
piosè.
* Coronopus minimus q. ibid.
* Tithymalus myrtifolius minor ibid.
Stoechadi citrinæ angustifoliæ affinis capitulis longioribus
J. B. ibid. & propè Tolonam copiosè.*

Propè Olbiam sive Olloles & Tolonam.

*Acanthus sativus.
Fumaria minor seu tenuifolia surrecta J. B.
Acacia trifolia Ger.
Althæa Olbiæ Gallo-provinciæ Lob.
Arisarum latifolium.*

Convul-

Convolvulus argenteus Althææ folio.
 Teucrium multis *J. B.*
 Chrysocome capitulis conglobatis *Ger.*
 Myrtus minor vulgaris *Lob.* Circa oppidulum *Bauffet*
 copiosé.

In monte S. Balme.

Abrotanum quoddam fœmina suave-olens.
 Sedum tridactylites Alpinum.
 Thlaspi quoddam fruticosum angustifolium, cujus florem
 non vidi.
 Scorpius five Genista spinosa : in collibus Gallo-provin-
 ciæ frequens.
 Stoechas Arabica subinde etiam occurrit.
 Vermicularis frutex, in insula Rhodani propè Arelaten
Camarg dicta copiosissimé.

*Itinere à Lugduno ad Gratianopolin indèque
 ad max. Carthusianorum cœnobium.*

Linariæ aliquatenus similis folio Bellidis *J. B.* In arvis
 quibusdam requietis sex septemve leucis Lugduno di-
 stantibus versus Gratianopolin.
 Catanance Dalechampii folio Cyani flore Coronopi *J. B.*
 In lateribus montium dimidia circiter leuca Gratiano-
 poli distantium via *à la grand Chartreuse.*
 Melampyro affinis Parietaria cœrulea quorundam *J. B.*
 ibid. in sylvosis.

In montibus Cœnobium ambientibus.

Sambucus racemosa, }
 } in sylvosis.

Circæa minima *Col.*

A. Trachelium majus Belgarum.

A. Radix Rhodia, copiosissime.

U 4

Genti-

- Gentianella Alpina* verna magno flore.
- Pulsatilla alba* *J. B.*
- Solidago Saracenica.*
- Periclymenum rectum* fructu nigro *Park.*
- Xylosteum Allobrogicum* i. e. *Periclymenum rectum* fructu rubro *Ger.*
- Chamæmepilus Gesneri.*
- Imperatoria vulgaris*: in summis rupibus.
- Sonchus coeruleus latifolius* *J. B.*
- Nerium Alpinum* quibusdam, aliis *Ledum glabrum* *J. B.*
- Auriculæ Ursi* quædam species.
- Allium Alpinum latifolium* seu *Victorialis* *Ger.*
- Trifolium Alpinum argenteum* *Park.*
- Helleborus niger* *Saniculæ* folio minimus.
- Pedicularis* sive *Crista galli montana*, floribus pallidis in spicam. Descriptionem *v. Hist. nost. p. 770.*
- Betonica* sive *Pseudostachys* quædam Alpina. Radice nititur oblique acta, multis fibris prædita. Folia longis pediculis hirsutis insident, hirsuta & ipsa, rugosa, Urticæ similia, circa margines serrata aut dentata, denticulis majoribus. Caules eriguntur pedales, hirsuti, medullâ facti, striati, & quodammodo quadrati, plerumque duobus, interdum uno duntaxat foliorum pari vestiti: folia cauli adnascencia iis quæ ad radicem similia, sed minora & brevioribus pediculis, (quod in hoc genus plantis solenne est) sulcata. In summis caulis spicæ breves compactæ Betonicæ æmulæ. Flosculi galeati lutei, è calycibus in 5 spinulas molliores terminatis exeunt. Julii 17. jam pænè defloruerat.
- Asteri montano* purpureo similis *J. B.* *Aster Alpinus* flore purpurascente. Descriptionem *v. Hist. nost. p. 268.*
- Parmica* folio alato seu *Corymbifera Millefolii umbellâ*, folio alato & laciniato *Hist. nost. p. 345.* ubi & descriptionem vide. *Parmica Alpina* *Matricariæ* foliis *Trifolij*.
- Bellis coerulea* caule nudo *C. B.*
- Pentaphyllum Alpinum argenteum* flore albo *C. B. V.* descriptionem *Hist. nost. p. 614.* Plantam hanc à *Trifolio argenteo Alpino* *Pona* minimè diversam esse suspicor.

A. Muscus Alpinus flore insigni, dilutè rubente *J. B.*
Cerinthe quorundam major versicolor *J. B.*
Alfine minima Alpina flore albo majore.
Hypericum Nummulariæ folio *C. B.*

Itinere à Gratianopoli ad Aurantiam.

Echinopus minor *J. B.* Per totam Galliam Narbonensem copiosissimè : nec minùs copiose
Jacea cum spinosis capitulis purpurea tenuifolia *J. B.*
Thymum vulgare rigidius folio cinereo, passim & copiosè.
Pulegium cervinum. Ad Rhodanum fluvium circa pontem S. Spiritûs dictum.
Lavendula major sive vulgaris *Park.* Ubique non minùs frequens quàm Thymum prædictum.
Dentellaria Rondeletii.
Acanthium Illyricum.
Chondrilla viscosa caule *κνυμίσκος Col.*
Echii sive Anchusæ quædam species flore carneò, an Lycopsis.

Itinere ab Aurantia ad Avenionem.

Foenum Burgundiacum. Circa Avenionem in agris feritur. Paliurus.
Cistus Ladanifera Monspeliaca.
Cistus foemina, folio Salviæ.
Malus granata, per totam Galliam Narbonensem frequentissima : nec minùs
Catanance Dalechampii folio Cyani, flore Coronopi.
Helianthemum tenuifolium glabrum flore luteo *J. B.*
Helianth. flore albo, folio angusto hirsuto *J. B.*
Foeniculum tortuosum *J. B.*
Millefolium odoratum.
Millefolium tomentosum luteum *J. B.* quod non adeò frequens circa Monspelim.
Stoechas citrina tenuifolia Narbonensis *J. B.*
Capparis,

Capparis. Ilex coccifer.

Genista Hispanica. Botrys vulgaris.

Cucumis Asininus.

Aspalathus 2 Monspeliensis J. B. aliæque multæ circa
Monspelim etiam passim provenientes.

Circa Nemausum præter prædictas.

Thlaspi biscutatum asperum hieracifolium & majus C. B.

Psyllium semper virens.

Camphorata Monspeliensium.

Trifolium bituminosum. Ruta sylvestris major.

Peganium Narbonensium seu Ruta sylv. minima.

Tithymalus ferratus. Lotus arbor.

Convolvulus spicæfolius.

Plumbago Plinii seu Dentellaria Rondeletii.

Scabiosa montana calidarum regionum Lob.

Tithymalus characias Amygdaloides.

Clematis seu Flammula repens C. B.

Phyteuma Monspeliensium.

Sideritis verticillis spinosis.

Alkekengi, Solanum halicacabum vulgare.

Clematis Daphnoides major.

A. Lepidium vulgare.

Chondrilla viscosa caule *κνινισφόρος* Col.

Abrotanum foemina foliis Ericæ i. e. Unguentaria Lute-
tianorum.

*Plantas circa Monspelim à nobis observatas, vide
in Catal. General. & in Botan. Monspel.*

Planta

PLANTÆ rariores Collectæ.

I.

E Catalogo Sicularum rariorum Pauli Bocconi Epist. 21. adjectis synonymis.

A Brothanum odoratum humile *Dod. Park.* humile
Ger. mas angustifolium minus C.B. cum pul-
chris corymbis *J. B.*

Abfinthium maritimum Lavendulæ folio
Park. C. B. marit. latifolium sive Matthioli J. B.
Artemisia marina Ger. Vide Catalogum *Antonii Do-*
nati.

Abfinthium montanum Abrotani foeminæ flore *Col. Phy-*
tobas. montanum Chamæmeli flore magno C. B.

Acarna Theophrasti Anguillaræ *Lob. ico.* major, caule
non folioso C. B. *Park.* Polyacanthus Casabonæ,
Acarnæ similis *J. B.*

Acanthus aculeatus C. B. sylvestris *Park.* Carduus A-
canthus sive Branca ursina spinosa *J. B.*

Acetosa tuberosa radice C. B. Oxalis tuberosa radice
J. B. Park. Acet. Ragusiana *Jac. Zanoni* nobis vi-
detur.

Achillea sideritis ad caulem baccifera, autori nondum
examinata.

Alcea folio rotundo laciniato C. B. Malva montana
sive Alcea rotundifolia laciniata *Col. peregrina Clus.*

Althæa frutescens folio acuto, parvo flore C. B. Al-
thææ species, quibusdam arborea altera, vel Bryoniae
folio *J. B.* Hæc non est Althæa Olbiæ i. e. Althæa
frutex

frutex 1. *Clus.* quamvis mala figura apud Lobelium, Clusium & C. Bauhinum deceptit.

Althæa Theophrasti flore luteo C. B. Theophr. flo. luteo, quibusdam *Abutilon* J. B. *Althæa* lutea Ger. lutea, seu *Abutilon* Avicennæ putatum Park.

Alfine Scorpioides glabra maritima saxatilis, Anthyllidis foliis subrotundis, radice lignosa N. d. ex.

Alfine maritima flore rubente C. B. maritima Neapolitana Col. Park.

Alfines facie nova planta Col. *Cynocrambe* Dioscoridis C. B. legitima Dioscoridis Park. *Alfine* foetida Fabio Columnæ Dioscoridea J. B. Cat. gen.

Ammi alterum semine Apii C. B. *Creticum* Park. Ger. Cret. aromaticum Lob. odore Origani J. B. Cat. Cret.

Ammi parvum foliis Foeniculi C. B. semine tenuissimo & odoratissimo J. B. perpusillum Ger.

Anchusa echiioides lutea *Cerinthes* flore montana Col. *Anchusa* lutea minor C. B. J. B. Ger. *Symphytum* angustifolium Apulum Park.

Anonis altera hircina lutea, non spinosa erecta Fabæ foliis N. d. ex.

altera Sicula, Rosæ caninæ foliis rotundis, procumbens non spinosa, folio brevi viscoso N. d. ex.

lutea fruticosa erecta, crispa, non spinosa, folio brevi viscoso N. d. ex.

Arundo sativa seu *Donax* Dioscoridis C. B. Cypria Ger. maxima & hortensis J. B. *Harundo* *Donax* Park. Seritur frequens in Italia.

Arum Ægyptiacum Ger. max. Ægyptiacum, quod vulgò *Colocasía* C. B. Ar. Ægypt. longa radice, vulgò *Colocasía* dicta Park. *Colocasía* *Clus.* J. B. Panormitanis *Pampina di Paradiso*. Reperitur etiam in Creta, observante Bellonio; in Syria, referente Rauwolfio; quin & in Italia ipsa, agro Salernitano. V. Columnæ Hist. rariorum.

Aster cernuus Col. cernuus Columnæ Park. Atticus foliis circa florem mollibus C. B. V. Hist. gen.

Buglossum maritimum Siculum, *Cerinthæ* foliis bullatis; sive *Borago* verrucosa minor Munting.

Cacalia

- Cacalia incano folio Ger. folio rotundo incano Park. foliis crassis hirsutis C. B. Cacalia quibusdam J. B. v. Cat. gen.*
- Carduus Eryngioides capite spinoso Alpin. v. Cat. Cret.*
- Carduus minimus Alpin. An Carduus parvus J. B. ? quem in Sicilia invenimus. V. Catal. general.*
- Caryophyllus holosteus tomentosus latifolius C. B. holosteus tomentosus J. B. Park.*
- Caryophyllus arborescens Creticus C. B. Betonica coronaria arborea Cretica J. B. v. Cat. Cret.*
- Campanula exotica Tob. Aldin.*
- Caucalis Syriaca cum maximo semine J. B. Gingidium latifolium Ger. latifolium Syriacum Park. foliis Pastinacæ latifoliæ C. B. Pidouchio di porco Siculis. V. Cat. Oriental.*
- Centaureum magnum Dod. Ger. majus vulgare Park. majus Juglandis folio J. B. majus, folio in lacinias plures diviso C. B.*
- Cerithe folio non maculato viridi C. B. minor flore luteo & rubro Park. Cer. quintum genus Clus.*
- Chamæleo albus Apulus purpureo flore gummifer Col. albus verus acaulis Park. Carlina acaulis gummifera C. B. v. Cat. gen.*
- Chamædaphnoides Cretica i. e. humilis Laureola Alpin. exot. v. Cat. Cret.*
- Chamædryas spinosa C. B. J. B. spinosa Cretica Park.*
- Chamæpitys 3. Matth. incana exiguo folio C. B. odoratior Park. 3. Dodonæi Ger.*
- Chamæmoly, an Moly Dioscoridis Col. Moly humile folio gramineo C. B. v. Cat. gen.*
- Cistus Thymifolius saxatilis Italicus N. d. ex.*
- Clematis Daphnoides latifolia corniculis ad Scorpioidem filiquosam accedentibus N. d. ex. D. Buonfanti.*
- Clematis altera pusilla recta N. d. ex. D. Buonfanti.*
- Clinopodium Creticum Alpin. exot. v. Cat. Cret.*
- Colutea Scorpioides odorata Alp. exot. Cretica.*
- Convolvulus rectus odoratus Pona Dorycnium Creticum Alpini Park. Imperati J. B. Cneoron album folio Oleæ argenteo molli C. B.*

Cotula seu Parthenium marinum minimum *Ad. Lob. Cha²*
 mæmelum marinum *J. B.* Matricaria maritima *C. B.*
 Parthenium maritimum *Park.*

Cotyledon seu Umbilicus Veneris caule prolifero Messa-
 nensis *N. d. ex.*

Cynoglossum Creticum argenteo angusto folio *C. B.* Cre-
 ticum angustifolium *Park.*

Cynoglossum Creticum 1. *Clus.*

Daucus montanus Apii folio *C. B. prod. Pedi de Niggin*
 Panormitanis,

Draba umbellata foliosa floribus rubentibus, seu Helsperis
 umbellata Bellidis aut Turritidis foliis montana *N. d.*
ex. In montibus Hyblæis.

Echium luteum minimum *C. B.* Echioides lutea minima
Park. lutea minima Apula campestris *Col.*

Echium nigrum flore eleganti *Alp. exot.* Creticum ni-
 grum *Park. v. Cat. Cret.*

Echium Creticum *Apin. exot.* Creticum album [potius
 luteum] *Park. v. Cat. Cret.*

Eruca hirsuta Lunariz Monspeliensium foliis, siliquis uno
 versu dispositis. *N. d. ex.*

Eruca Iberidis folio integro, repens, siliquis angustis, flore
 luteo. *N. d. ex.*

Eruca glabra Bellidis majoris folio. *N. d. ex.*

Eryngium batrachioides radice tuberosa *N. d. ex.*

Eryngium spurium primum *Dod.* latifolium planum *C. B.*
 planum latifolium capitulo rotundo parvo *J. B.* Pan-
 nonicum sive montanum *Park.*

Eupatorium odoratum *C. B.* alterum odoratum & aro-
 maticum *Col.* Agrimonia odorata *Park. Cam. v. Cat.*
gen.

Ferula folio glauco, semine lato oblongo, quibusdam
 Thapsia ferulacea *J. B.* Rosmarinum Ferulaceum fer-
 tile Dioscoridis *Ad. Lob.*

Ferulago tenuiore folio *C. B.* Ferulago seu Ferula minor
Park.

Festuca dumetorum *πολυέστες* recta *N. d. ex.*

Geranium malacoides minus C. B. quod 1. in Prodromo.
v. *Cat. gen.*

*Gramen asperum altissimum caule fungoso pleno, juba
Avenacea, an Ampelodesmos Plinii? Dis Arabum
Anguillaræ & D. Bonfanti descript. Panormitanis
Buse.*

Helichryson Orientale C. B. *Heliochryson Orientale*,
sive *Amarantus luteus* Park. *parad.* *Stoechas citrina*
floris & magnitudine & colore speciosa J. B. v. *Cat.*
Orient.

Helichryson foliis Abrotani C. B. quorundam foliis A-
brotani J. B. *Helichryson* sive *Coma aurea* Ger.

Heliotropium minus tricoccum alterum foliis angustis
N. d. ex.

Heliotropium supinum Clusii & Lobelii Ger. minus su-
pinum C. B. Park. minus quorundam sive *supinum*
J. B.

Hesperis montana Turritidis aut *Bellidis folio*, flore ru-
bello, caulè folioso. v. *Draba*, &c. N. d. ex.

Hieracium Apulum suave-rubente flore Col. *Dentis leo-
nis folio*, flore suave-rubente C. B. item *Hieracium in-
tybaceum floribus ex purpura rubentibus ejusdem i. e.*
intybaceum 10. Clus. *intybaceum flore carneo* Park. v.
Hist. nost. p. 231. v. *Cat. gen.*

Horminum Creticum Alpin. exot. v. *Cat. Cret.*

Hyoscyamus aureus Alpin. exot. *Creticus luteus minor*
C. B. 4. seu *albus Creticus* Clus. *albus Creticus* Ger.
emac. At Paul. Boccone has duas species distinguit,
& utramque Siciliæ indigenam facit. v. *Cat. Cret.*

Hyslopus angustifolia spicata C. B. Park. *tenuifolia* Ger.
angustifolia, *spicato flore* Clus.

Jacea squamata Cretica, quibusdam *Scabiosa Cretica*
J. B. *Cretica* Park. *laciniata squamata* C. B. v. *Cat.*
Cret.

Jacea montana candidissima *Stœbes foliis* C. B. *incana*,
laciniata, *capitulis Cirsii*, flore uno aut altero J. B.

Jacea

Jacea Cyanoides maritima Sicula, supina, alato caule, capite spinoso, flore rubello *N. d. ex.* An *Cyanus Creticus* spinosus nonnullis, aut *Cyanus marinus*, in fine descriptionis *Jaceæ* 4. *C. B. prod?*

Jacea lævis maxima *Centaurioides* *Apula* *Col. v. Cat. gen.*

Jacea laciniato *Sonchi* folio, seu *Jacea latifolia* purpurea capitulo spinoso *C. B. 4. in Prod.* fortè *Jacea latifolia* spinosis pulchris capitulis, flore purpureo *Chabræi*. An *Jacea marina* *Bætica* *Park?*

Jacobæa rotundifolia incana *C. B. prod. Park.*

Thlaspi luteo flore incanum montanum *Col.* *Thlaspi saxatile* *Serpylli* folio incanum luteum minus. *v. Cat. gen.*

Iris latifolia Belgica, odore *Sambuci*, obsoleta *Swert.* An *Iris latifolia* Belgica versicolor, odore *Sambuci* *C. B?* *latifolia* major, cui oræ ad flavum obsoletum accedunt.

Iris tuberosa obscurè viridi colore *Swert.*

Kali floridum repens *Aizoides* *Neapolitanum* *Col.* *Kali Crassulæ minoris* folio *C. B. K. floridum* repens *Neapolitanum* *Columnæ* *Park. v. Cat. gen.*

Kali minimum semine splendente alterum.

Lamium peregrinum seu *Scutellaria* folio crassiore. An *Lamium Astragaloides* *Cornuti?*

Leucoium maritimum crucigerum *Cam.*

Leucoium maritimum crucigerum *Siculum*, radice grumosa.

Leucoium coeruleum marinum *Park. Alpin. exot.* *Creticum* minimum folio subrotundo *C. B.*

Linaria tetraphylla minima lutea *Col. quadrifolia* lutea *C. B. v. Cat. gen.*

Marrubium nigrum villosum, flore purpureo, foliis & facie *Lamii* maximi, aut *Galeopsos* legitimæ *Clus. N. d. ex.*

Molucca spinosa *Dod. Ger. emac.* asperior foetida *J. B.* *Melissa* *Molucca* asperior sive *Syriaca* asperior *Park.* *Mel. Moluccana* foetida *C. B.*

Moly

Moly flore albo, lineis viridis coloris *Swert.* exoticum
floribus albo-viridibus *C. B.*

Moly minimum albo flore *Swert.* *Ger.* angustifolium flo-
ribus majoribus *C. B.* minus *Clus.* minus flo. orbicu-
lato majore *J. B.* *Dioscorideum* minus *Park.*

Napus sylvestris *Cretica* in *Prod.* descripta *C. B.* *Park.*
v. Cat. gen.

Narcissus juncis foliis albus *Autumnalis*, medio obso-
letus *Swert.* *juncif.* *Autumnalis* albus *C. B.*

Ornithogalum Arabicum *Park.* *Clus.* majus *Arabicum*
Ger. emac. umbellatum maximum *C. B.* *Lilium A-*
lexandrinum, seu *Ornithogalum magnum* *Syriacum*
J. B.

Origanum præaltum *Syracusanum*, radice lignosa, Eu-
phrasia latifolia Italica foliis : an *Creticum* *Gesn. hort.*
Cam. Cæsalp ? v. Cat. Orient.

Pastinaca echinophora *Apula* *Col.* sylv. angustifolia, fru-
ctu echinato *C. B.* *v. Cat. gen.*

Parietaria *Ocimi* folio *Tragi.* minor *Ocimi* fol. *C. B.*

Papyrus *Syriaca* vel *Siciliana* *C. B.* *Nilotica* *Ad. Pap-*
pedii *Siculis* ex *Hybla.* Vide quæ de hac planta ha-
bet *D. Boccone* hoc in loco.

Perficaria angustifolia geniculis maximè nodosis.

Pæonia mas *Matth. Park.* *Ger.* mas præcior *J. B.* fo-
lio nigricante splendido, quæ mas *C. B.*

Pimpinella spinosa *Park.* *Clus.* *Poterio* affinis, folio *Pimp.*
spinosa *C. B.* *Poterium* quibusd. sive *Pimp. spinosa* *J. B.*
Poterium *Lobellii* sive *Pimp. spinosa* *Camerarii* *Ger.*
v. Cat. Cret.

Pistlochchia altera *Clus.* *Cretica* *C. B.* *Cretica* semper vi-
rens *Park.* *Aristolochia* *Pistlochchia* altera *J. B.* *C. Cret.*

Plantago bulbosa montana laciniata *Apula* *Col.* *Apula*
bulbosa *Park.* pilosa bulbosa *C. B.* In incultis *Apulia*,
præsertim *Cirinola*, copiosa. *v. Cat. gen.*

Polium montanum repens *C. B.* montanum minimum *Tab.*
Ger. mont. supinum minimum *Park.* 8. *Clus.*

Ranunculus alter saxatilis montanus *Asphodeli* radice *Col.*
Park. lanuginosus, *Apii* folio, *Asphodeli* radice *C. B.*

Rhamnus foliis oblongis ferratis C. B. Bavaricus Park.
Bavaricus Dalechampii J. B.

Satureia fruticosa, foliis acutis sulcatis, forte Thymbra
Cretica Alp. exot.

Satureia pumila folio obtuso N. d. ex.

Scilla vulgaris radice rubra C. B. rubra magna vulgaris
J. B. rubra, five Pancratium verum Park. Pancrati-
um Clusii Ger.

Scilla radice alba C. B. magna alba J. B. alba Park. Hi-
spanica Clus. Hispanica vulgaris Ger. emac. Cat.
Hisp.

Scabiosa fruticosa folio non dissecto peregrina J. B. stel-
lata folio non dissecto C. B. arborea Cretica Ponæ
Park. arborea Alp. exot. peregrina Ger. v. Cat. Cret.

Scabiosa farmentosa procumbens montana crispa, radice
lignosa perenni, flore parvo cæruleo. N. d. ex.

Sedum majus legitimum Clus. Park. majus arborescens
floribus candidis C. B. majus arborescens J. B. Ger.
emac.

Sideritis Salviæ folio Donati. Sid. Heraclea Dioscoridis,
five Sid. marina Salvifolia nostras Donati Park. vide
Cat. Venet.

Sideritis montana parva, flore nigro-purpureo, medio cro-
ceo Col. montana parvo variæque flore C. B. montana
Apula versicolor Park. v. Cat. gen.

Smilax aspera, minis spinosa, fructu nigro J. B. C. B.
aspera fructu nigro Clus. Park. aspera Lusitanica
Ger.

Spartum minimum montanum triphyllum Col. triphyllon
C. B. Chamæspartum montanum triphyllon Park.
Genista radiata seu stellaris J. B. v. Cat. gen.

Spina solstitialis mitior Apula Col.

Sonchus dendroides Dalechampii Lugd. J. B.

Solanum somniferum Antiquorum Alp. exot. somniferum
Antiquorum verum Park.

Stoebe Plantaginis folio Alp. n. exot.

Stachys spuria Flandrorum Lob. minor Italica C. B. Di-
oscoridis Park.

Silyrhynchium Theophrasti *Col.* minus angustifolium *C.B.*
v. *Cat. Gen.*

Thapsia vulgaris Carotæ effigie *Ad. Lob.* vulgaris *Ger.*
Carotæ folio *C. B. Park.* Carotæ facie *J. B.* An
Thap. Gesneri seu Turbith Garganicum?

Thlaspi semper virens *Cam.* montanum semper virens
C. B. Park. *Thlaspi* semper virentis species candida
J. B.

Tithymalus seu *Esula* exigua obtusis foliis *C.B. J.B. Park.*
In agris etiam Patavinis & Monspeliensibus.

Tithymalus lunato flore *Col.* sylvaticus lunato flore *C. B.*
Tragopogon alter, gramineo folio, suave-rubente flore
Col. *Apulum* suave-rubens *Park.* gramineis foliis hirsutus *C. B.*

Verbascum humile *Creticum* laciniatum *C. P.* *Brassica*
foliis *Col.*

Verbena nodiflora *J. B. C. B.* repens nodiflora *Park.*
Item Neapoli ad *C. Bauhinum* misit Imperatus, vide
Cat. gen.

Volubilis marina folio cordato *Munting.*

II.

E Catalogo Helveticarum Wagneri: Harum maxima pars in Catalogo nostro generali habetur, cum è C. Bauhini Prodromo excerptæ sint.

A *Cetosa* rotundifolia Alpina *C. B. Park.* v. *Cat. gen.*

Alsine Alpina glabra *C. B. prod. Park.* v. *Cat. gen.*

Alsine Alpina junceo folio *C. B. prod. Park. Cat. gen.*

Anemone Alpina alba major *C. B. prod.* Hanc in *C. B.*

Prodromo non invenimus, ut neque sequentem,

alba minor *Ejusdem.*

Aquilegia montana magno flore C. B. *prod.* C. G.

Aquilegia montana, parvo *Thalictri* folio C. B. *ʒ. B.*
v. *Cat. gen.*

Astragalus Alpinus Helveticus C. B. *Alpinus Ger.* *Astragaloides Helvetica* *Park.* v. *Cat. Hisp. & Cat. gen.*

Bellis Alpina latissimo *Plantaginis* folio non descripta.

Bellis Alpina minor Gemmenfis. In *Vallesia* supra *Gemme* C. B.

Borrago montana floribus flavis *Gesn.*

Bursa pastoris Alpina hirsuta C. B. quæ 3. in *Prod. Park.*
In *Alpibus Helvetiorum* (inquit) ut Monte fracto &
Spligel, reperitur. v. *Cat. gen.*

Campanula Serpyllifolia *Park.* C. B. *ʒ. B.* In *Alpibus*
Rhæticiis ʒ. B. In monte *Baldo* C. B. v. *descr. Baldi.*

Caryophyllus Alpinus holosteus hirsutus Gemmenfis C. B.
C. *Bauhinus Caryophyllum holosteum Alpinum latifolium* in *Valesianorum Alpibus*, loco *Gemme* dicto reperiri scribit. v. *Cat. gen.*

Centaurium folio in laciniis plures diviso C. B. reliqua
synon. v. in *Cat. Sic.* *Bocconi.*

Chamædrys Alpina minima hirsuta C. B. *prod.* An *Teucrium*
minimum Clus. hist? v. *Cat. gen.*

Chamædrys spuria minor angustifolia C. B. *ʒ. B. Park.*
v. *eundem.*

Chamæorchis Alpina folio gramineo C. B. *prod.* *Alpina*
flore viridi *Park.* In monte *Helvetiorum Gothardo*
copiosè & acervatim *Junio* florens reperitur. v. *Cat. gen.*

Cicer montanum ἀκων C. B. Park.

Cicer montanum lanuginosum erectum C. B. *Park.* In
Valesia ad *thermas Lucenses Julio* florens. v. *Cat. gen.*

Clematis Alpina Geranifolia C. B. *cruciata Alpina Park.*
In monte *Baldo*: inque *Austriæ montibus.*

Conyza cœrulea Alpina major C. B. *Park.* In monte
S. Bernhardi v. *Cat. gen.*

Conyza cœrulea Alpina minor C. B. *Park.* In monte
Gothardo. v. *Cat. gen.*

Cotyledon minor foliis subrotundis ferratis C. B. *ʒ. B.*
alter minor folio subrotundo *Park.* v. *Cat. gen.*

Crocus

Crocus Alpinus Autumnalis C. B. *montanus Autumnalis* *J. B. Park. Ger. montanus* 1. *Clus.* Flores habet modò puniceos, modò cœruleos, modò candidos. v. *Cat. gen.*

Daucus montanus Apii folio, flore luteo C. B. *prod.* In *Calenberg* & prope *Baden Austriae.* v. *Cat. gen.*

Doronicum Helveticum humile crassis foliis C. B. *Park.* In *Valesianorum jugis Jul. mense. auff der Gemme.*

Dracunculus Alpinus folio Scabiosæ C. B. quid ? In *pinace J. B.* non invenitur. In *Helvetiorum pratis Alpinis* prope *Fabarias* & in *Gothardo* provenit. v. *Cat. gen.*

Euphrasia lutea Alsinifolia radice squamata C. B. *lutea minor radice squamata Park.* *Anonymos radice Dentariæ Col.* v. *Cat. gen.*

Filipendula montana flore Pediculariæ C. B. *montana major albida Park. montana Ger.* *Pedicularis bulbosa J. B. Alektorolophos Alpinus major* 1. *Clus.* An *Herba foliis Asplenio similis Gesn. desc. mont. fr ?* v. *Cat. gen.*

Fragaria fructu albo C. B.

Fragaria fructu luteo C. B.

Gentiana major purpurea C. B. *magna flore purpureo & albo J. B. maj. flore purpureo Park. v. Cat. gen.*

Gentiana major flore punctato C. B. *ma. flore pallido, punctis distincto Clus. ma. flore pallido punctato Park. v. eundem.*

Gnaphalium Alpinum minus C. B. *Gnaphalio Alpino affine, Leontopodium parvum Lobelii J. B. Leontopodium parvum Ger. minus Park. C. G.*

Hedera terrestris montana C. B. *Cam.*

Helleborine Alpina Saniculæ facie C. B. quid ?

Hesperis montana pallida odoratissima C. B. *colore ineleganti J. B. montana & 1. Clus. Pannonica Park. parad. Viola matronalis flore obsoleto Ger. C. G.*

Hieracium montanum foliis dentatis, flore magno *C. B. prod. Park.* In monte Gothardo & circa theſſas Fabarias *C. G.*

Hieracium montanum lanuginosum, laciniatum parvo flore *C. B. prod. Park.* Apud Monſpelienſes in Horto Dei dicto.

Hieracium montanum rapifolium *C. B. prod. Park.* In monte *Wafferfal.* *C. G.*

Hieracium pumilum ſaxatile alterum præmorſa radice *C. B. prod.* Dentis leonis ſpecies eſt. *C. G.*

Hieracium montanum hirsutum ramosum parvis floribus *C. B. pin.* nec plura de eo habet.

Hieracium Alpinum non laciniatum flore fuſco *C. B.* quod vel ipſo *C. B.* fatente ab *Hieracio hortenſi* floribus atro-purpureſcentibus culturâ ſolùm diſſerre videtur. In montibus Rhæticis.

Jacea foliis pictis. Varietas eſt non ſpecies diſtincta.

Jacobæa Alpina laciniata flore Buphrthalmi *C. B. latifolia Ger. latifolia* Pannonica prima *Park.* Pannonica latifolia *J. B.* In Auſtriâcis Stiriaciſque Alpibus *Cluſ. C. G.*

Jacobæa Alpina foliis rotundis ſerratis *C. B. latifolia* Pannonica altera *Park.* *Conyza Alpina Geſn. J. B.* •

Lichen maculatus montanus non deſcr.

Meum Alpinum umbella purpureſcente *C. B. Alpinum Germanicum,* illis *Muttellina* dictum *Park. Muttellina J. B.* In monte Rhætio propè Burmium *C. G.*

Muſcus quidam gramineus, foliolis minimis oblongis acutis, egregie virentibus, & in orbem ſerè diſpoſitis conſtans. q.

Muſcus Alpinus capitulis verrucosis rubentibus : *non deſcr.*

Nasurtium Alpinum capsula *Nasurtii* vulgaris *J. B. Alp. capsulis Nasurtii hortensis C. B. Park.* In Rhætia monte *Nombre. J. B. C. G.*

Nasurtium

Nasturtium Alpinum minus *Resedæ foliis* C. B. *Cardamine Alpina minor Resedæ foliis* Park. In Rhætorum Alpibus Julio. Inque Helvetiorum. C. G.

Nasturtium Alpinum Bellidis folio majus C. B. Park. Circa Fabarias thermas ad aquæ defluxum. C. G.

Nasturtium Alpinum capitulis rotundis majus, auctoris nomine non adjecto.

Pedicularis Alpina Filicis folio major & minor C. B. *major Alpina* Park. *major Dalechampii* J. B. v. *Cat. gen.*

Perfoliata Alpina angustifolia major C. B. *prod. major seu folio anguloso* Park. In Pyrenæis non longè Narbonâ. C. B. *Cat. Hisp.*

Perfoliata Alpina angustifolia media C. B. E monte Gothardo habuit. C. G.

Perfoliata Alpina angustifolia minor C. B. Park. Ex Sumano monte & Valesianorum Alpibus.

Perfoliata Alpina latifolia minor C. B. *prod. Park.*

Præonia Alpina: non adjectis notis characteristicis nec Auctoris nomine.

Pulsatilla flore acaulo minore non descripta.

Pulsatilla lutea, speciem non determinat. Tres autem à Botanicis commemorantur, omnesque in Alpibus occurrunt.

Quinquefolio similis Enneaphyllos hirsuta C. B. *Enneaphyllon* Park. C. G.

Ranunculus Alpinus minimus flore albo.

Ranunculus Alpinus erectus flore albo. Uterque sine Autore.

Rubia quadrifolia rotundifolia lævis Park. J. B. C. B. *quadrifolia vel rotundifolia lævis* C. B. *pin.* In monte Gothardo & ad Eremitanos. C. G.

Sanicula Alpina rotundifolia major flore puniceo.

Saxifraga major umbella purpurascens.

Scabiola pratensis, floribus exiguis, ἀγυαῖ N. D.

Sedum Alpinum luteum floribus punctatis,

Sedum Alpinum foliolis crenatis asperis *C. B.* In ascensu montis *S. Bernhardi* majoris & *Gothardo*. *C. G.*

Sedum Alpinum hispidum ferè spinosum flore pallido *J. B.* In monte *Calcaris* & in *Gothardo*.

Sedum saxatile atro-rubentibus floribus *C. B. Park. C. G.*

Sedum saxatile variegato flore *C. B.* Inter *Vallesiam* & *Augustam* vallem in monte *Stetsburgh* dicto copiosè *C. B.* Flore est tetrapetalo. *C. G.*

Sedum Alpinum album foliolis compactis.

Sedum Alpinum dactylites flore luteo.

Sedum montanum latifolium flore purpureo *J. B.* majus montanum, foliis non dentatis, floribus rubentibus *C. B.* majus angustifolium *Park. Ger.*

Sinapi sylvestre floribus aureis plenis : Ad *Arburgum*.

Tanacetum Alpinum *C. B.* *Millefolio* affinis planta, quibusdam *Iva moschata* *J. B.* *Iva arthritica* moschata *Rhætica Gesn. hort.* In altissimis *Helvetiorum*, & *Rhætorum* montibus.

Teucrium Alpinum inodorum, magno flore.

Thlaspi Alpinum repens *C. B. Park.* Ad *Thermas Fabarias* *Helvetiorum*. *C. G.*

Tormentilla Alpina vulgaris major *C. B.* *Alpina* major *Park.*

Trachelium *Tragopogi* folio montanum *F. Columnz J. B. Park.* *Alpina* *Tragopogi* folio *C. B. C. G.*

Trifolium saxatile hirsutissimum *C. B. prod. Park. C. G.*

Trifolium Alpinum *Rhæticum* *Astragaloides* *J. B.* angustifolium *Alpinum* *Park. Ger. emac.* *Alpinum* flore magno radice dulci *C. B.* *Glycyrrhiza* *Astragaloides* quibusdam dicta. *C. G. Descr. Baldi Pona.*

Triorchis lutea altera *J. B.*

Tussilago Alpina rotundifolia glabra *C. B.* *Alpina* glabro folio *Park.*

Veronica Alpina *Bellidis* folio hirsuta *C. B.* *Alpina* *Bellidis* folio *Park. C. G.*

Viola Alpina purpurea exiguis foliis *C. B.* montana purpurea solidiore folio *J. B.* montana 2. *Clus. C. G.*

Viola montana lutea grandiflora C. B. Viola flammea lutea maxima Park. C. G.

Virga aurea montana serrata magno flore C. B. quam (inquit) Plantaginis Alpinæ nomine in summitate montis Calcaris circa tuguriola collectam habemus.

III.

E Catalogo Plantarum spontanearum agri Romani Jacobi Rogeri Romani.

A *Grimonia odorata Cam. Park. v. Cat. Sic.*
Aster luteus radice odora C. B. Asteris altera species Apula, an Baccharis Col. v. Cat. gen.
Aster luteus Oculus Christi dictus. v. Cat. gen.
Acarna Theophrasti sive Acorna Plinii Col.
Auricula muris Cam. i. e. Loto affinis filiquis circinatis C. B. v. Cat. gen.

Consolida major radice tuberosa Lob. Ad sepes humidas & umbrosas. v. Cat. gen.

Cyclaminus foliis hederaceis. In sylva Farnesiana dicta di Madama copiosè. v. Cat. gen.

Chamædrys unicaulis spicata C. B. Trixago Apula unicaulis Col. Crista galli flore vario ex albo & purpureo.

Carduus vinearum repens folio Sonchi C. B. Ceanothos Theophrasti Lob. & Col. Ad ripas Tybridis.

Cnicus sylvestris Clus. i. e. coeruleus. In pratis Farnesianis.

Echium floribus magnis purpureis. Lycopsis Anglica Lob. In campis & in Amphitheatro copiosè. Qu. An & quomodo hoc differat à Lycopsi Dioscoridis quibuldam J. B. h. e. Echio latissimo folio Lycopsis dicto, flore dilutè purpurascençe Hort. Leyd. Herman?

Euphra-

Euphrasia major sylvestris purpurea latifolia Col. Italica latifolia altera C. B. purpurea latifolia Park. In collibus & pratis copiose.

Euphrasia minima verna Col. linifolia. Prope locum dictum Sepultura Neronis, mense Aprili copiose.

Eruca sylvestris flore albo. In vineis & ad vias. Quam plantam intelligat nescio.

Erica flore albo : intelligit puto Ericam maximam albam C. B. cujus synonyma dedimus in Cat. gen. In collibus Farnesianis & Pineti.

Gramen agrorum altissimum cum paniculis obscure ruffis. In collibus & pratis.

Gramen agrorum altissimum paniculatum flosculis luteis. In eisdem locis. Quas graminis species intelligit nescio.

Gramen cruciatum Alpini Egypt. Dactylon Ægyptiacum C. B.

Geranium Coriandri folio Col. Apulum odorum Park. Coriandri folio odorum C. B. In marginibus pratorum ultra pontem Mollem dictum.

Gingidium Matthioli foliis Chærephylli C. B. Park. In agrorum marginibus. Quænam planta sit hoc Matthioli Gingidium nobis nondum constat.

Hyacinthus arborum Ornithogaloides Col. Ornithogalum Neapolitanum Ger. J. B. Park. exoticum magno flore minori innato C. B. In collibus & campis mense Aprili.

Kali floridum repens aizoides Neapolitanum Col. In ora maritima ad Ostiam. v. Cat. Sic.

Orchis Ornithophora. In collibus. q.

Orchis flore Simiam referens C. B. zoophora cercopithecum exprimens oreades Col.

Orchis flore insectum quoddam inter muscam & vespa referens. in collibus. q.

Orchis Delphinum referens latifolia palustris. in pratis aquosis copiosissime. q.

Orchis

- Orchis Delphinum* referens angustifolia. in collibus. q.
Orchis montana Italica, flore purpureo, lingua oblonga
C. B. *macrophylla Col.* In collibus Pineti & Farnesianis.
Orchis pyramidalis odorata. In Amphitheatro Titi, & collibus ficcis. q.
Plantago pilosa hyberna ad viarum margines.
Ranunculus montanus Rutæ foliis, *Asphodeli radice.* In collium Farnesianorum summa parte, locis sylvestris.
Scorpioides altera leguminosa Ornithopodii filiquis. In collibus ficcis. q.
Serophularia radice fibrosa. In locis umbrosis S. Pauli Basilicæ vicinis. q.
Securidaca major, Hedylarum. In agrorum marginibus. v. *Cat. gen.*
Saxifragia Thymi foliis. In collibus ficcis & supra muros antiquos. q.
Silyrhynchium Theophrasti Col. minus angustifolium C. B. Per viarum margines herbidos Cirinolæ.
Silyrhynchium alterum latifolium Col. minus latifolium C. B. Via qua ad Acquamenam vineam itur.
Silyrhynchium Aspensium angustifolium Col. minus angustifolium, flore majore variegato C. B. In Castro *Aspera*, olim Casperies, in Sabinis.
Tithymalus paralius angustifolius. In collibus arenosis Pineti. q.
Thapsia Romana. In ruinis veterum ædificiorum. q.
Tordylium seu *Seseli Creticum*, majusne an minus non dicit. In agris.
Trifolium odoratum Park. Ger. *Lotus hortensis* odora C. B. sativa odorata annua J. B. Ad fossas aquosas.
Trifolium capitulo rotundo rubro cum unguiculis. In summitate montis Marii. q.

Umbilicus Veneris seu *Cotyledon stellata* C. B. *Sempervivum tertium* Col. In marginibus umbrosis viæ quæ à Basilica S. Pauli ad templum S. Sebastiani ducit.

IV.

E Tractatu Simplicium in Insula litorea Venetiana, Lito di Venetia dicta, nascentium, Antonii Donati.

A *Nagallis aquatica* altera, fortè *Anagallis aquatica* foliis *Pulegii Serpyllive* C. B. Sium non odoratum alterum, & *Anagallis aquatica* *Trag.*

Alcea peregrina solisequa. *Vesicaria* sive *Veneta* *Park.* *peregrina* *Ger.* *vesicaria* C. B. solisequa multis *Veneta* *J. B.* *Malva horaria* *Dod.*

Alcyonium alterum *Dioscoridis* spongiosum. *Favum marinum* quorundam.

Anthyllis maritima *Chamaelyca* similis C. B. v. *Cat. gen.*

Alfine maritima *Neapolitana* Col. v. *Cat. Sic.*

Ambrosia marina nostra *peregrina* v. *Cat. gen.*

Clematis maritima repens C. B. *Park.*

Daucus seu *Pastinaca* sylv. *daucoides* *Apula* Col. *tenuifolia* sylv. *umbella* majore C. B. sylv. *Apula* *Columnæ* *Park.*

Esula rara nostra, floribus purpurascens. *Esula* rara in *Lio* Venetorum insula *Lob.* *Veneta maritima* *Ger.* *Tithymalus maritimus* *Venetus* *Park.* *maritimus purpurascens* floribus C. B. Hanc *Paulus Hermannus* *Apocyni* speciem facit; & revera *Esulæ* sive *Tithymali* species non est, ut patet tum ex icone, tum ex descriptione *Donati.*

Erica

Erica major floribus purpurantibus seu 3. *Clus. v. Cat. gen.*

Elæagnos Theophrasti Matth. Olea sylvestris folio molli incano C. B. *Bohemica Matth.* *Ziziphus Cappadocica Plinii Bellon.*

Erica Chironia Thymi folio nostra baccata *Donati.*

Gramen echinatum tribuloides Col. spica subrotunda echinata seu Gr. echinato capitulo C. B. perpusillum capitulo rotundo spinoso Cherleri J. B. echinato capitulo *Park. echinatum 4. Ger. emac.*

Kali floridum repens Neapolitanum Col. v. Cat. Sic.

Lychnis calceato caule. q.

Lyfimachia foetida Plinii. q.

Lenticula marina, Sargazo. v. Cat. gen.

Lotus sativa seu *Trifolium odoratum alterum Dod. v. Cat. Rom.*

Muscus marinus verus 2. Dioscoridis.

Muscus terrestris denticulatus v. Cat. gen.

Myrsinites Tithymalus alter Lob. sive Turbith Alexandrinum. i. e. Tithymalus characias 5. sive angustifolius C. B. quem 4. seu rubenti Germanico eundem putamus. v. Cat. gen.

Orchis myodes lutea Narbonensium. v. Cat. gen.

Psyllium marinum Penæ. Ramos habet longos, folia etiam valdè longa & crebra. q.

Pseudoschoenanthum Graminis genus.

Patientia vulgò, *Hippolapathum sativum Ger. latifolium C. B. majus sive Rhabarbarum monachorum J. B. Lappathum sativum sive Patientia. Park.*

Populus perexiguus noster. q.

Pycnocomos Cretæ Salonensis Lob. i. e. Acarna humilis caule folioso C. B. Acarna Valerandi altera.

Spartum

Spartum herba Plinii *Clus.* Gramen sparteum Plinii, sive sportularum ficuum *J. B.* sparteum primum, paniculâ comosâ *C. B.* Spartum Plinii, seu Juncus Hispanicus *Park* male, non enim Junci species est.

Scordium lanuginosum *C. B.* Creticum lanuginosum *Cam.* non est, inquit, sicut Trixago palustris *Lob.*

Sideritis Heraclea latifolia *Diosc.* Sideritis marina Salvisolia nostra.

Scabiosa major Hispanica *Ger. Park.* major cum pulchro semine *J. B.* stellata, folio laciniato major *C. B.*

Tragon Dioscoridis quorundam, Drypis Theophrasti *Guilland.* Kali spinoso affinis *C. B.* Longioribus & latioribus est foliis (inquit *C. B.*) quam Kali spinosum; nonnulli tamen, utramque plantam eandem faciunt & fortè non ità male. v. *C. B. pin.* de hac planta.

V.

Ex Enchiridio Botanico Parisiensi J. B. Cornuti.

MEum spurium. intelligit MEum alterum Italicum *Ger. J. B. v. Cat. gen.*

Tragopogon minus. q.

Stoebe capitata. q. *Acarnæ* varietas. q.

Pulsatilla flore violaceo. An Pulsatilla vulgaris, i. e. folio crassiore, & majore flore *C. B. ? v. synon. in Cat. gen.*

Linaria purpurea, ob nomen Autoris non adscriptum quam speciem intelligat nescimus.

Scabiosa minima glabra. An Scabiosa montana omnium minima *Ad ?*

Polygonatum tertium *Clus.* Polygonatum latifolium Hellebori albi foliis *C. B.* maximo folio *Park.* amplitudinis foliorum Hellebori albi *J. B.*

Geranium

Geranium batrachoides minus: q. Annon varietas sit
Geranii batrachoidis Gratia Dei Germanorum dicti
Lob. C.B.

Cicutaria maxima. An *Cicutaria latifolia* tertia *C. B.*?
maxima Brancionis *Lob.*? quæ an differat à *Seseli* *Peloponnesi* *Marth.* seu *Cicuta latifolia* foetidissima, dubitamus.

Millefolium tuberosum, quod tertio à fatu anno in hortis nostris degenerat.

Lychnis repens. q. *Draba arvensis.* q.

Asclepias non scriptum foliis nigris in summo hispidis. In *Valeriani montis* vertice.

Ononis minor non spinosa lutea. q.

Linosyris purpureo-coerulea. *Linaria coerulea repens* *C. B.* reliqua synon. v. in *Cat. gen.*

Angelica pratensis minima. q.

Cepæa omnium ferè autorum.

Geranium facie *Pedis columbini.*

Trifolium maculatum flore luteo. An *Trifolium*?

Euphrasia minor. *Scorzonera pratensis.* q.

Oenanthe aquatica repens. q.

Chamælinum serotinum floribus albis. An *Linum pratense* flosculis exiguis *C. B.*? *Linum sylv.* pusillum candidantibus floribus *Cam.*? An *Linum sylvestre minus* *C. B.*? *sylv. 8. Clus. hist.*

Saponaria altera pulvere nigro floris infesta. In vineis pagi dicti *Jury* juxta *Sequanam.*

Colchicum Amarantino flore. q.

Ornithopodium verum. quid?

Myriophyllum Equisetifolium. *Millefolium aquaticum* *Equisetifolium* caule nudo *C. B.* *Equisetifolium* palustre *Lob.* Sunt, inquit *C. B.* qui cum priore [*Viola aquatica*] idem velint. At illud folio latiore, hoc verò angustiore multò est. Fortè tamen *Cornutus equisetifolium fluviatile*, quod apud nos frequentissimum est, intelligit.

Alphodelus Hyacinthinus forte *Galen.* q.

Moly Serpentinum *Lob.* *Moly angustifolium* foliis reflexis *C. B.* An *Scorodoprassum* alterum bulbofo & convoluto capite *Park.*? *Ophioscorodon* *Ger.* *Allii* genus

genus Ophioscorodon dictum quibusdam *3. B.* Allium lativum alterum, sive Allioprasum caulis summo circumvoluto *C. B. ?*

Doronici varietas. *q.*

Thlaspi umbellatum floribus albis *q.*

Marrubium album villosum *C. B. prod.* In agris Lutetianis collegit *C. Bauhinus.*

VI.

*E Descriptione Montis Baldi prope Veronam
Joannis Pona Pharmacopæi Veronensis.*

PAliurus, in planitie prope Veronam : synon. vide in *Cat. gen.*

Zizipha sylvestris. *Cat. gen.*

Egilops sive *Cerrus* mas majori glande *Park.* *Quercus* 4 genus *Dalechampii* *Lugd.* *Quercus* calice echinato, glande majore *C. B.* *Cerrus* *Egilops*, *Aspris* *Theophrasti* putata *3. B.* *Cerris* majore glande *Ger.*

Sideritis arvensis latifolia glabra *C. B. 2. Matth.*

Onosma *Matth. C. B. Park. & aliorum.* *Anchusa* quoddam genus. In planitie saxosa inculta.

Blattaria flore coeruleo elegantissimo.

Pulsatilla vulgaris v. *Cat. gen.*

Cotinus *Plinii.* Synonyma quære in *Cat. gen.*

Abrotanum mas commune. v. *Cat. gen.* In pago Buxolato.

In alia planitie inculta trans Athesim

Linum perpusillum floribus luteis. An *Linum* *sylv.* minus luteum annuum folio latiore & angust. *Mor ?*

Cicer *sylv.* latifolium triphyllum *C. B. sylv.* latifolium *Ger. sylv.* triphyllum *Park.* *Anonis* latifolium, *Cicer* *sylv.* trifolium dicta, nobis.

Ultra Clausam arcem in via ad Germaniam.

Alcea Veneta.

Terebinthus vulgaris Cat. gen.

Machaleb Gesneri. Cat. gen.

Lycium Italicum Matth. J. B. Park. facie Pruni; sylvest.
seu Italicum C. B.

Lotus arbor Cat. gen.

In Pago Caprino.

Hermodactylus sive Colchicum non venenatum Offic.

Lob. ico. Colchicum radice siccata alba C. B.

Siliqua sylvestris Clus. & aliorum i. e. Arbor Judæ.
v. Cat. gen.

Caucalis Matth. lato Apii folio C. B. flore rubro folio la-
tioire Lob. Cæterum qualisnam planta sit Cauca-
lis Matth. non consentiunt inter se Botanici.

Acer Monspeulanum. Cat. gen.

Orob. Venetus Clus. Ger. emac. sylvaticus Venerus
Park. latifolius parvo flore purpureo C. B. Galegæ
nemorensi vernæ similis multiflora, flore purpureo vel
albo J. B.

Cytisus Hispanicus alter Clus. Hisp. secundus Clusii
J. B. Park. foliis angustis incanis quasi complicatis
C. B. Pseudo-cytisus i. Ger.

Hyssopus Officinarum vel potius Thymbræ species. q.

Polygala major Massiliotica i. e. Colutea caule Genistæ
tungoso J. B. Cat. gen.

In loco Coronæ dicto.

Fumaria tertia Matth. Split dicta J. B. lutea Ger. C. B.
lutea montana Park. Corydalis.

Scorzonera Hispanica v. Cat. gen.

Carduus sphærocephalus v. *Cat. gen.*

Saxifragia Bavarica *Jungermanni*. & *Park.*

Hyslopia montana *Park.* *angustifolia montana aspera* C. B.

Hyslopum montanum, *Cilicium quibuldam* *J. B.*

Saxifragia hircina elegantissima *Jungermanni*.

Epimedium *Dod. Lob. v. Cat. gen.*

Sedum magnum pallido flore. q.

Galeopsis aquatica verticillatis floribus; forte intelligit

Stachyn palustrem foetidam C. B. quam *Jo. Bauhinus*

Galeopsin angustifoliam foetidam vocat, quæ ubique occurrit.

Campanula elzophyllos *Jungermanni*.

Trachelium majus petræum *J. B. Ger. emac. petræum*

majus globosum *Park.* *Campanula Alpina Sphærocephalos* C. B.

In vallibus Basiana & Jemen.

Caltha Alpina *Gesn.* quibuldam *Plantago Alpina*: *Donnici species* est. v. *Cat. gen.*

Panax Heracleum Recentiorum v. *Cat. gen.*

Myrrhis altera parva *Lob. Ger. minor* C. B. *altera minor* *Park.*

In valle frigida.

Carduus Chondrilloides Dalechampii *Lugd.* vertice corticoso C. B.

Helleborus albus floribus atro-rubescens albus præcox

Ger. albus præcox atro-rubente flore *Park.*

Betonica Alpina flore albo.

Ad locum Saxa vallis frigida dictum.

Scabiosa omnium minima *Ger. montana omnium minima*

Lob. J. B. montana minor capitulis squamosis C. B.

Centaureum majus alterum *Clus. v. Cat. Hisp.*

Carduus

Carduus aræophyllos Dalechampii *Lugd.* tomentosus capitulis minime aculeatis *C. B.*

Viola Martia surrectis cauliculis *Lob.* tricolor erecta, an Jovis flos *Theophr.* 6. hist. 6? *C. B.* affurgens tricolor *Ger.* *Jacea tricolor* surrectis caulibus, quibusdam arborea dicta *J. B.* Qu. annon huic eadem sit *Viola Martia* arborescens purpurea *C. B.*? *v. Cat. gen.*

Napellus verus coeruleus *Ad.* i. e. *Aconitum coeruleum* five *Napellus* i. *C. B.* *v. Cat. gen.*

Napellus vulgaris seu *Lycostonum sativum* *tricarpon.*

Hypoglossum multorum *v. Cat. gen.*

Lunaria Magorum Arabum *Lob.* *C. Bauhinus* quid sit.

Oxalis montana scutiformis & saxatilis.

Galeopsis Cortusi : *Scrophularia* congener est.

Galega montana Dalechampii : *Orobi sylvatici* species est. *v. Cat. gen.*

Chondrilla coerulea flore pulcherrimo, seu *Sonchus lævior* coeruleo flore *Clus.* *v. Cat. gen.*

Linum sylvestre Pannonicum *Clus.* seu *Linum cistoides.* *v. Cat. gen.*

Clematis cruciata Alpina *Ponæ Park.* *Ger. emac.* *Alpina Geraniifolia* *C. B.* *v. Cat. gen.*

Nardus Celtica, frequentissima. *v. Cat. gen.*

Trachelium minus spicatum Ponæ. *Rapunculus spicatus* *Alpinus C. B.* q. v. iconem apud *Ponam.* In editione *Clusiana* *Trachelium petræum* minus vocat.

Veronica petræa semper virens : i. e. *Chamædrys Alpina* saxatilis *C. B.* *v. Cat. gen.*

Veronica Alpina minima serpyllifolia. An 3. fruticans *Clus?* *v. Cat. gen.*

Saxifraga alba petræa Ponæ. i. e. *Sedum tridactylites* *Alpinum majus album* *C. B.* An *Tridactylites* *Alpinus J. B.*?

Pyrola altera Pannonica *Clus.* *v. Cat. gen.*

Pyrola 4. Pannonica *Clus.* rotundifolia minor *C. B.* *v. Cat. gen.*

Cacalia prima Pannonica *Clus.* *v. eundem Catalogum.*

In vertice Montis.

Orchis ornithophora candida Gemmæ *J. B. Lob. Ger.*
papilionem referens angustifolia alba *C. B.*

In Valle Vaccaria.

Coriandrum sylvestre Myconi *Lugd. sylv. foetidissimum*
Park. C. B. sylv. alterum J. B.
Liliasphodelus albo flore.
Pæonia vulgaris fæmina *C. B.*
Galeopsis maxima Pannonica *Clus. v. Cat. gen.*
Ferulago, nonnullis Thapsia *Matth. Thapsiam Matth.*
C. Bauhinus Thapsiam Carotæ folio vocat. q.

In monte majore.

Nerium albis & rubris floribus è saxis nudis prope aquam
crumpens. v. Synon. in Cat. gen.
Trifolium angustifolium Alpinum *Ponæ. Alpinum magno*
flore C. B. Alpinum Rhaticum Astragaloides J. B.
radice est in Baldo subacri, alibi dulci.
Pinus tabulus Plinii : Mugo, Pinastris genus sterile. Pi-
nus sylv. montana altera C. B. v. Cat. gen.
Anagyris minor : non foetens minor C. B. Laburnum
minus Park.
Ranunculus Alpinus Coriandri folio, i. e. Ran. præcox
1. Rutæ folio *Clus. v. Cat. gen.*
Caryophyllatæ Alpinae minimæ prima species *Ponæ Ital.*
Alpina minor C. B. Park. Alp. minima Ger. emac.
Caryophyllata Alpina minor altera *Park. Alpina Apii*
folio C. B.
Clinopodium Alpinum *Ponæ v. Cat. gen.*
Geranium Alpinum longius radicatum *Ponæ. argenteum*
montis Baldi J. B. argenteum Alpinum C. B. Ger.
In rupibus Orientem aspicientibus.

In Valle Ossium.

Anemone tuberosa radice Lob. Ger. v. Cat. gen.
Sedum Alpinum 6. Clus. i. e. *Phyllon thelygonon* Dale-
 champ. v. Cat. gen.
Chamaerhododendros Alpigena Ger. Lob. v. Cat. gen.
Syringa flore albo. v. Cat. gen.

In Pratis ugar' Ἰεροχὼ dictis.

Phlomos lychnitis altera Syriaca Lob. *Verbascum*
acuto *Salvia folio* C. B. *folio Salvia tenuifoliae*
Lugd.
Caltha Alpina Gesn. v. Cat. gen. Reperitur etiam in
 valle Basiana v. supra.
Ornithogalum spicatum luteo pallescente flore.
Clinopodium Austriacum Clus. montanum C. B. v. Cat.
 gen.
Jacea montana Narbonensium Lob. J. B. Park. montana
 Ger. montana incana odora C. B.
Chondrilla coerulea pulcherrima.
Juncaria Salmanticensis v. Cat. gen.
Doronicum 5. *Pannonicum* Clus. v. eundem.
Hieracium 5. *Pannonicum* Clus. v. eundem.
Myrrhis altera parva Lob. prius, in Valle Basiana.
Panax Heracleum : item in eadem valle.
Anagyris minor, prius, in monte majori.
Pæonia fæmina frequentissima. Hæc etiam prius habetur
 in valle Vaccaria.
Genista Ilvensis Lugd. i. e. *Spartum triphyllon* C. B.
 v. Cat. gen.

A pratis ad culmen Malsesini.

Libanotis cachryophoros fruticans, & sterilis synonym. v. in
 Cat. gen.

Anonymos Balsami Alpini folio.

Seseli Massiliense: i. e. Fœniculum tortuosum. *Cat. gen.*

Circa locum Os Navenæ dictum & ad latus montis.

Seseli Massiliense genuinum, Veterum fortè. Meum Italicum *Lob. v. Cat. g. n.*

Trifolium argentatum Alpinum v. *Cat. gen.*

Filix saxatilis crispa, fortè Pteridion fœmina *Cordi.* Alpina crispa *C. B.*

Absinthium montanum odoratissimum.

Absinthium 3. Alpinum umbelliferum *Ponæ Ital.* Alp. umbellif. tenuifolium & minus *C. B.*

Panax Asclepium an Dalechampii? i. e. Asclepium umbellâ luteâ *C. B.?*

In planitie ad latus montis in Sylva excisa.

Muttellina *Gesn. & Cam. f. B.* Meum Alpinum umbella purpurascente *C. B.* Alpinum Germanicum Muttellina dictum *Park.*

Viola surrectis cauliculis in Valle Attilone. prius ad saxa vallis frigidæ.

Anemone trifolia *Dod. Ger.* trifolia flore albo *f. B. sylv. trifolia Dodonæi Park.*

Baccharis Dioscoridis Matthiolo. q.

Aster montanus duplex prægrandi Helenii flore *Lob. montanus luteo magno flore C. B.*

Aizoon serratum 1. & 2. *Cordi i. e.* Cotyledon media foliis oblongis serratis *C. B. v. Cat. gen.*

Crocus vernus 1. *Clus.* vernus minor albicans *C. B.* vernus latifolius albo versicolore flore 1. *Clusii f. B.*

Cicutaria foetidissima *Lob. in cavitatibus Novæis. v. Cat. gen.*

Allium anguinum. Est Allium montanum latifolium maculatum *C. B. v. Cat. gen.*

In

In valle Lofanna.

Aconitum aliud Dalechampii est Acon. unifolium luteum bulbosum C. B.

Chamæcistus 4. myrtifolius Clus. v. Cat. gen.

Doronicum vulgare; item Pannonicum 1. Clus. item Pannon. 3. Clus. v. Cat. gen.

Tussilago altera Alpina Clus. item altera montana Lob. v. eundem Catalogum.

Sedum petraeum Bupleuri folio, aut potius Bupleurum petraeum gramineo folio Pona. Bupl. Alpinum angustifolium C. B. Park. Perfoliata species.

VII.

Plantæ variores Hispanica & Lusitanica è C. Clusii historia & aliis collectæ.

A Brotanum femina foliis Rorismarini majus C. B. Park. femina 4. Clus.

Abrotanum femina foliis Rorismarini minus C. B. Park. fem. 5. Clus.

Abrotanum femina viridis C. B. femina viridis minor Park. fem. 6. Clus.

Nascuntur omnes Salmanticensi agro, montibus Segobiaz vicinis, quos el puerto de Guadarama vocant.

Acetosa Hispanica major Cam.

Alfene corniculata Clusio 7. B. Ger. Park. Lychnis segetum minor C. B. Inter segetes Salmanticensi agro frequens.

Alfene Bætica Clus. Park. Symphyti petraei capitulis C. B. Circa Xeres de la Frontera, aliisque Bætica locis.

Alysson verticillatum foliis profundè incisis *C. B.* *Alyssum Galeni Ger.* *Alysson Galeni Clusio Park.* In cœmiterio ad *Elda* pagum, Valentino regno, nec alibi invenit *Clusius*.

Anemone hortensis latifolia 1. simplici flore *Clus.* *Cyclamini* seu *Malvæ* folio, lutea *C. B.* *latifolia Clusii Ger.* *latifolia flore flavo* 1. *Clusii J. B.* *Lusitanica* seu *hortensis latifolia flore simplici luteo Park. parad.* *Lapidosis* quibusdam *Lusitanicæ* collibus juxta *Tagum*, atque etiam inter vepres eruebat *Clusius*.

Anonis Hispanica frutescens, folio *Crithmi Chrysanthemi Schol. Bot. Tournef.*

Anonis Hispanica frutescens folio Ciceris sylvestris triphylli Schol. Bot.

Aracus sub terra filiquifera *Lusitanica Park.* Semen è *Lisbona* à *Gul. Boelio* ad *Parkinsonum* missum est.

Araco *ἄρακος*, sive *Araco* similis planta ex *Hispania* missa *Bod. à Stapel.* in *Theophr. hist. lib. 1. cap. 11.*

Aristolochia longa altera *Clus.* longa *Hispanica Park. C. B.* Inter vites Regno Valentino in *Hispania* frequentissima.

Aristolochia rotunda altera *Park.* rotunda altera *Clusii J. B.* rotunda flore ex albo purpurascens *C. B.* Hanc nonnisi in campestribus & inter segetes sponte nascentem vidit *Clusius*.

Aristolochia clematidis Bætica Clus. Park. *clematidis* non vulgaris *J. B.* *clem. serpens C. B.* Circa *Hispalin* itinere *Ulyssipponensi*, plurimisque aliis *Bæticiæ* locis, in dumetis, vepribus & vetustis quibusdam oleis.

B. Ascyron magno flore *C. B. prod.* In *Pyrenæis. Burser. v. Cat. Orient.*

Aspalathus alter secundus *Clusii Park.* *Genista-spartium spinosum majus* 2. flore pallido *C. B.* In *Castella* veteri tantum invenit *Clusius*.

Aspalathus alter tertius hirsutus *Park.* *Abrotani* facie incana *J. B.* *Genista-spartium spinosum majus tertium hirsutum C. B.* In *Cantabris*, tertio à *Victoria* urbe milliari, ad radices *Pyrenæorum*.

Aspara-

Asparagus sylvestris aculeatus Ger. aculeatus tribus vel quatuor spinis ad eundem exortum *C. B.* petræus seu *Corruda aculeata* Park. Ad Tagum in Lusitania; atque etiam in Bætica, solo petrolo, in collibus & sepibus.

Astragalus Bæticus Clusii Park. Lusitanicus Clusii Ger. Bæticus lanuginosus, radice amplissima *C. B.* In Collibus quibusdam supra Ulyssipponem quos Tagus aluit inter vepres: item locis sylvestris non procul Hispali.

Astragalus tertius Clus. An *Astragalus Monspeliano* candidior & *Onobrychis* aliis *J. B.*? In vinetorum & arborum marginibus per Lusitaniam & Hispaniam.

Astragalus Hispanicus filiqua epiglottidi simili, flore purpureo major Hort. Lugd. Bat. Schol. Bot. Hanc plantam in Historia pro Glauce Hispanica Clusii habui, quo nomine ad me missa fuit.

Astragalus Hispanicus filiqua epiglottidi simili, flore albo minor Hort. Lugd. Bat. Schol. Botan. Hanc Glauca Catalonicæ non descriptæ titulo Historiæ inserui.

Astragalus Alpinus 2. Clus. i.e. *Astragalus Alpinus* Helveticus *C. B.* v. *Cat. gen.* In Alpibus Cantabricis invenitur.

Auricula urfi Myconi pilosa cœrulea *J. B.* urfi, flore cœruleo, foliis Boraginis Park. Sanicula Alpina foliis Boraginis villosa *C. B.* In Pyrenæis reperitur.

Bellis minor alba ramosa Park. E lusitania.

Bellis spinosa flore globofo *C. B.* prod. In Granadæ montibus.

Brassica campestris purpureo flore Clus. campestris perfoliata flore purpureo *C. B.* Perfoliata filiquosa purpurea Clusii *J. B.* filiq. flore purpureo Park. Murciano regno ad Eliocrotam urbem, vulgò *Lorca*, in arvis & ad vias.

Brunella Bætica annua, foliis laciniatis Moris. prælud.

Buglos-

- Buglossum folio Boraginis Hispanicum *J.B.* Borago semper vires *Park. Ger.* Buglossum latifolium semper vires *C. B.* An Borago Echioides *Alpin. exot.*
 Buglossum Lusitanicum, bullatis foliis *Morif.* est Borago muralis variegata flore odorato Cretica *Zanoni.*
 Buglossæ affinis semine cotylode seu umbilicato, Linum umbilicatum Lusitanicum dictum.
 Bugula odorata Lusitanica *Cornut.*
 Bupleurum Hispanicum frutescens angustifolium *Tournefortii Schol. Bot.*

- Carlina Hispanica acaulos flore majore purpureo *Tournef.*
 Carduus sphærocephalus annuus Bæticus minor *Morif.*
 Caryophyllus holosteus Alpinus angustifolius purpurascens *C. B. prod.* Ex Pyrenæis Hispanicis. *Burser.*
 Caryoph. holosteus tomentosus angustifolius *C. B. prod.* in Granada ad radicem montis. *Albinus.*
 Caryophyllus saxatilis ericæfolius ramosus repens *C. B. prod.* Ex Pyrenæis. *Burserus.*
 Cattaria tenuifolia Hispanica *Clus.* Mentha cattaria minor *C. B.* Nepeta minor *Park.* item Nepeta media *ejusdem.*
 Caucahis major *Clusio J. B. Ger. emac.* maxima *Park.* maxima Sphondylii aculeato semine *C. B.* Ab hac, ipso fatente *Clusio*, non multum differt Caucahis Hispanica *ejusdem.*
 Caucahis Lusitanica *Alpin. exot.*
 Centaurium majus alterum *Clus.* *Ger.* majus alterum, sive Lusitanicum *Park.* majus alterum folio integro *J. B.* majus folio non dissecto *C. B.* Supra Ulyssipponem lapidosi juxta Tagum collibus.
 Cerinthe minor flore albo *Park.* Gulielmus Boelius ex Hispania attulit.
 Chamædrys Hispanica foliis tenuissime divisis *C. B. prod. Albinus.*
 Chamæmelum leucanthemum Hispanicum magno flore *C. B. prod.* à Gillenio missum.
 Chamæmelum luteum Hispanicum *C. B. prod.* ab eodem missum.

Chamæ-

Chamæmelum leucanthemum incanum Hispanicum minus C. B. prod. In Regno Granatæ ad agrorum margines. *Albinus.*

Chamæmelum Lusitanicum latifolium seu Coronopi folio Breynii Cent. 1.

Cistus annuus Ger. annuus folio Salicis C. B. Park. annuus 1. Clusii, folio rotundiore J. B. In vinetorum apud Salmanticenses marginibus & Granatensi regno.

Chondrilla prior Diosc. legitima Clus. Park. Chondrilla lutea Ger. foliis Cichoraceis tomentosis C. B. In Salmanticensis agri locis incultis, aliisque multis Hispaniæ *Clus. Q.* quomodo ab hac differat Hieracium tomentosum Hispanicum *C. B. prod.*

Chrysanthemum Valentinum Clusii Park. Ger. Bupththalmum lanuginosum foliis Millefolii J. B. Bupththalmum tenuifolio simile Chrysanthemum Valentinum Clusii J. B. In Valentino regno ad agrorum margines & juxta semitas.

Cistus mas angustifolius C. B. Ger. Park. mas 2. folio longiore J. B. mas 2. Clus.

Cistus mas folio brevior C. B. Park. mas 3. foliis dilutius virentibus J. B. mas 3. Clus. In Lusitania solum supra Ulyssipponem itinere Conimbricensi atque etiam in maritimis.

Cistus mas folio rotundo hirsutissimo C. B. mas 1. seu major, folio rotundiore J. B. mas folio subrotundo Park. mas 4. Clus. In Regno Valentino & Aragonum invenitur.

Cistus mas foliis Chamædryos C. B. mas 5. foliis crispis & quodammodo sinuosis J. B. mas dentatus Ger. mas humilis Park. mas 5. Clus. In Lusitania sola vidit hanc Clusius, & nusquam frequentiore quam apud monasterium *Pera longa, 5. supra Ulyssipponem mill. v. Cat. gen.*

Cistus Ledon foliis Populi nigrae major C. B. Populi nigrae foliis Clusii major J. B. Populnea fronde major Park. Ledon 2. Clusii Ger.

Cistus Ledon folio Populi nigrae minor C. B. Populnea fronde minor Park. Populea fronde Ger. Pop. nigrae foliis Clusii minor J. B. Utrumque in ea montis Mariani

- riani [*Sierra morena*] parte, quæ superanda est iis qui Ulyssippone Hispalin iter faciunt.
- Cistus Ledon hirsutum C. B. Cist. Led. 4. Clusii Ger. 4. Clusii, flore candido *J. B.* hirsutum sive 4. Clusii *Park.* In sola Castella veteri, vicinis pago S. Martini *del Castannal* locis.
- Cistus Ledon angustis foliis C. B. *Park.* Ledon 6. minoribus angustioribusque foliis Clusii *J. B.* Ledon 6. Clusii Ger.
- Cistus Ledon foliis colore cinereo *J. B.* Ledon foliis Rosmarini hispidis C. B. C. Led. 7. Clusii Ger. 7. Clusii sive Rosmarini hispidis foliis *Park.* Valentino regno circa *Xativa*, ut & antecedens.
- Cistus Ledon foliis Rosmarini subtus incanis C. B. C. L. foliis Rosmarini coronarii Clusii, flore luteo *J. B.* C. L. 8. foliis Rosmarini subtus incanis *Park.* In incultis locis citra Tagum supra Ulyssipponem.
- Cistus Ledon foliis Rosmarini sed non incanis C. B. C. L. Rosmarini foliis, subtus non incanis *Park.* C. L. foliis Rosmarini Ger. C. L. 9. Clusio *J. B.*
- Cistus Ledon folio Thymi C. B. *Park.* C. L. Thymi foliis Clusii *J. B.* C. L. 10. Clusii Ger. *emac.* Hæc duo in extrema Bæticæ parte quæ Castellam novam spectat.
- Cistus fœmina folio Sampfuchi *Park.* folio Sampfuchi incano C. B. folio Sampfuchi Clusii, cui macula in flore *J. B.* Cistus folio Sampfuchi Ger. *emac.* Circa *Caraiceio*, & toto Bætico, agro inter Tagum & Anam fluvios copiosè.
- Cistus fœmina folio Thymi *Park.* C. B. foliis Thymi Clusii, sine macula in flore *J. B.* foliis Thymi Ger. In extrema tantùm Bæticæ parte, quæ Castellam & Lusitaniam spectat.
- Cistus fœmina folio Halimi major *Park.* fœmina Portulacæ marinæ folio, latiore, obtuso C. B. folio Halimi Ger. folio Halimi, flore luteo *J. B.* folio Halimi 1. Clus.
- Cistus fœmina folio Halimi minor *Park.* fœmina, Portulacæ marinæ folio angustiore mucronato C. B. folio Halimi longiore incano *J. B.* folio Halimi 2. Clus. folio Lavendulæ Ger. uterque frequens est in Lusitania, arenoso

- arenolo & solo aurâ marinâ afflato, non procul Lî-
bonâ.
- Cistus femina Lavendulæ folio *Park.* folio spicæ *C. B.*
folio Lavendulæ *Clusio*, fortè idem cum Helianthe-
mo recto *J. B.* mas tenuifolius *Ger.* Solo Valentino
Regno, aridis & petrosis locis, quarto à Valentia
mil.
- Clematis Bætica *Clus.* v. *Cat. gen.*
- Clematis Hispanica surrecta altera & humilior flore albi-
cante *Hort. Reg. Par.*
- Cnicus Hispanicus Serratulæ foliis glabris, flore albo cum
staminibus cœruleis *Schol. Bot. Tour.*
- Cnicus alter *Clusii* cœruleo flore perennis v. *Cat. gen.*
Circa Cordubam in segetibus.
- Colchicum Lusitanicum *Clus.* Lusitanicum Fritillari-
cum *Park.* Lusitanicum, purpurei cum albo mixti co-
loris *J. B.*
- Colchicum luteum majus *C. B.* Narcissus Autumnalis
major *Clus.* *Park.* *Ger.* In quibusdam montanis Hi-
spaniæ pratis. Colchico-narcissus *Lob.*
- Colchica luteo similis flore albo *C. B.* Sparganium Place
Clus. Supra Valentiam salebrosis & petrosis locis.
- Colchicum montanum Hispanicum *Clus.* mon. Hispani-
cum minus *Park.* *Ger.* mont. flore purpureo *J. B.* mont.
angustifolium *C. B.* Collibus Salmanticæ vicinis, solo
lapidoso.
- Colchicum pratense Salmanticum *Clus.* *J. B.*
- Colchicum vernum *Clus.* *J. B.* *Ger. emac.* *Park.* vernum
Hispanicum *C. B.*
- Colchicum minimum tenuifolium Gallæcium *Lob. Ad.*
part. 2. *J. B.* pumilum foliis Croci *C. B.*
- Convolvulus minor cœruleus Hispanicus *Park. parad.*
cœruleus minor folio oblongo *Ger. emac.* peregrin-
us cœruleus folio oblongo *J. B.* *C. B.* v. *Cat.*
gen.
- Convolvulus minor rectus Hispanicus villosus *Breyn.*
prod. 2. Campanula Lychnoidea *J. B.* Lychnis lyl-
vestris Campanulæ flore *C. B.*

- Corruda altera Clus.* Asparagus sylvestris aculeatus *Ger.* aculeatus, 3 aut 4 spinis ad eundem exortum *C. B.* petrus seu *Corruda aculeata Park.* Ad Tagum fl. in Lusitania, atque etiam in Bætica, solo petroso in collibus & sepibus.
- Crista galli umbellata C. B. prod.* In Castiliæ agris.
- Crocus vernus angustifolius 1. Clus.* vern. angustif. magno flore *C. B.* vern. ang. floribus coeruleis five violaceis, interdum candidis, *Hispanicus J. B.* vernus *Ger.* Gadibus frequens, atque inter Afindum & Calpen locis salebrosis & apricis.
- Crocus vernus angustifolius secundus Clus.* vernus angustif. gemino bulbo *C. B.* In Bæturæ collibus Lusitaniz finitimis
- Crocus vernus angustifolius 3. Clus.* vernus angustifolius parvo flore *C. B.* vernus minor *Ger.* Gadibus duntaxat, Februario.
- Crocus montanus 1. Clus.* Alpinus Autumnalis *C. B.* montanus Autumnalis *J. B.* *Ger.* *Park.* In nonnullis Lusitaniz rupibus, præsertim maritimis, Novembri.
- Crocum Pyrenæum Autumnale Clus.* *Ap. alt.* montanum *Pyrenæum Autumnale J. B.* *Crocus Autumnalis* flore minore *C. B.* E Pyrenæis montibus.
- Cytisus Hispanicus primus Clusii,* folio virescente *J. B.* *Cytisus minoribus foliis,* ramulis tenellis villosis *C. B.* *Pseudocytisus primus Ger.* *Hispanicus primus Park.*
- Cytisus Hispanicus Clusii secundus J. B.* foliis angustis incanis quasi complicatis *C. B.* *Pseudo-cytisus primus Ger.* Uterque in Salmanticensi agro & alibi in utraque Castella secundum vias publicas.
- Cytisus incanus,* folio medio longiore *C. B.* 3. *Hispanicus cum brevi pediculo J. B.* *Hispanicus incanus five 6. Clusii Park.* semper-virens *Ger.* In Hispania variis in locis, præsertim Bætica & Valentino regno.
- B. Cytisus Hispanicus siliquis Ornithopodii C. B. prod.* *Pseudocytisus Hispanicus C. B. Park.* In Hispania ad agrorum limites frequens est. Cum *Cytiso 1. Clusii* non debet confundi.

Dens leonis *Gadensis* *Park.* minimus *C. B.* *Cichorium*
sylvestre *pumilum* sive *Hedypnois* *Clus. cur. post.* E
Gadibus insula *Boelius* attulit.

B. Echium *Hispanicum* flore calcari donato *C. B. prod.*
Park. In *Granadæ* montibus. *Albinus.*

Elichryson *Clus.* foliis *Abrotani* *J. B. C. B.* *Helichryson*
sive *Coma aurea* *Ger.* Circa *Madritium* itinere *Com-*
plutensi, aliisque *Hispaniæ* locis, in agris.

Erica *Coris* folio maxima purpurascens *Park.* foliis *Cori-*
os quaternis, flore purpurascente *J. B.* maxima purpu-
rascens longioribus foliis *C. B.* major flore purpureo *Ger.*
Eisdem quibus maxima alba seu *Corios* folio 1. *Clus.*
locis (cujus fortasse duntaxat varietas est) oritur.
v. Cat. gen.

Erica major floribus ex herbaceo purpureis *C. B. Park.* *Co-*
ris folio 3. *Clus.* foliis *Corios* quaternis, floribus herba-
ceis, deinde albo purpurantibus *J. B.* Supra *Ulyssip-*
ponem frequens inter superiores.

Erica tenuifolia calyculata *Ger.* *Coris* folio 12. *Clus.*
Scoparia altera *Park.* hirsuta *Anglica* *C. B.* ramulis &
foliis *Corios* ternis, floribus ex rubro purpurascantibus
majoribus *J. B.* Eisdem cum *Erica* baccifera *Lusita-*
nica in locis, arenosis ut plurimum.

Erica erecta baccis candidis *C. B.* baccifera *Lusitanica*
J. B. baccifera fructu albo *Park.* baccifera tenuifolia
Ger. In una *Lusitania* hoc genus observavit *Clusius*,
non procul *Ulyssipponem* inter *Rio frio* & *Aldea Ga-*
lega & etiam supra *Ulyssipponem* loco admodum
arenoso.

Erinacea *Clus.* *Hispanica* *Clusii* *Park.* *Genista* *erinacea*
J. B. spinosa humilis *Ger.* *Genista* *spartium* spinosum
foliis *Lenticula*, floribus ex cæruleo purpurascantibus
C. B. Regno *Valentino* circa *Siete Aguas* oppidu-
lum asperis locis, & secus vias itinere à *Valentia* ad
Madritium copiosè.

Eryngium *maritimum* *Lusitanicum*, amplioribus foliis. *Schol.*
Bot. Tournef.

Eryngi-

Eryngium pumilum *J. B.* *montanum pumilum* *C. B.* *pumilum Hispanicum* *Clus. Park.* *pumilum Clusii* *Ger.* Post messes plerunque invenitur agro Salmanticensi, & nusquam alibi.

Fragaria affinis *sericea incana* *C. B. prod.* In saxosis Granadæ. *Albinus.*

Fritillaria lutea juncifolia *Lusitanica* *Park.* An *Fr. Lusitanica* *Clus. cur. post.*

Fritillaria flore minore *C. B.* item *serotina floribus ex flavo rubentib.* *ejusdem.* *Meleagris* seu *Fritillaria Pyrenæa flore minore* *J. B. v. Hist. nost.*

Fritillaria umbellifera *C. B.* *Hispanica umbellifera* *Park.*

Genista tinctoria *Hispanica* *Clus. v. Car. gen.*

B. Genista *Hispanica* affinis *C. B. prod.* In montibus planè saxosis ad Aquas Blancas. *Albinus.*

Geranii Bætica species *Boelii* *Ger. emac. ap.* *Alceæ vesicariæ* foliis *Park.*

Geranium Hispanicum magna radice, *Cicutæ* folio crassiflore. *Schol. Bot. Tournef.*

Geranium Salmanticense rostratum *Clus. parvum* foliis *Ranunculi* *C. B.* *parvum Salmanticense* *Park.* *Salmanticæ* in vicinis ultra *Thormim* amnem collibus nudis & petrosis.

Gladiolus angusto gramineo folio *C. B. prod.* In *Murana* collegit *Albinus.*

Glaux Catalonica non descripta.

Halimus angustifolius procumbens *C. B. Ger. tenuifolius,* five *Portulaca marina incana minor* *Park.* *Portulaca marina fruticosa,* quæ *Halimus 2. Clusii* *J. B.* In maritimis Regni *Valentini* : inque aggeribus insulæ illius quam duo *Rhodani* cornua faciunt.

Heliotropium supinum *Clusii* & *Lobelii* *Ger. minus supinum* *C. B.* minus quorundam, five *supinum* *J. B.* majus *supinum* *Park.* *Salmanticæ* ad quorundam agrorum margines reperit *Clusius.*

B. Hieracium tomentosum Hispanicum *C. B. prod.* In aridis & saxosis *Aragonix.* *Albinus.*

P. Hierac.

- P. Hieracium medio-nigrum Bæticum Boelii Park.* Duæ hujus species sunt, major & minor.
- B. Horminum minus album Bætonicæ facie C. B. prod.* In montibus Pyrenæis Hispaniam versus, *Burser.*
- Hyacinthus Hispanicus Clus. f. B.* Hyacintho Anglico adeo similis est, ipso Clusio fatente, ut cum *C. Bauhino* sentiam speciem distinctam non esse.
- Hyacinthus obsoleti coloris Hispan. serot. Clus. Hispan. obsoletus Park. obsoletior Hispanicus Anglico similis f. B. obsoleto flore C. B. obsoleto flore Hispanicus major Ger. emac.*
- Hyacinthus Lilifolius stellatus f. B. stellatus foliis & radice Lilii C. B. stellatus latifolius Ger.* In montibus Pyrenæis & Aquitanicis.
- Hyacinthus stellatus æstivus major Park. par. Ger. stell. æstivus f. B. Clus. stell. æst. coeruleo purpurascens maj. C. B.*
- Hyacinthus stell. æst. minor f. B. Ger. Park. parad. Clus. stell. æst. minor flosculis alternatim sitis C. B. Uterque è Lusitania delatus.*
- Hyacinthus minor Hispanicus angustifolius f. B. oblongo coeruleo flore minor C. B. Hisp. minor, Orientalis facie, flore coeruleo, albo & rubente Park. parad. minor Hispanicus Ger. emac.*
- Hypericon Montis Olympi Wheeler. Ascyron magno flore C. B. In Pyrenæis Burserus legit.*
- Hypericum Ericoides minimum foliis cinereis Hispanicum Tournefort. in Pluknetii Phytograph.*
- Hyssopus Hispanica minor Clus. minor seu Hispanica Park. minor angustifolia C. B. parva angustifolia f. B. parva angustis foliis Ger. Ex Hispanico semine nata est.*
- Jacea semper virens Lusitanica Bocconi & Merisani. Hanc olim in hortulo nostro aluimus.*
- Jacea Hispanica, sed potius Cyanus Hispanicus Alpin. exot.*
- Jacea tomentosa capitulo spinoso C. B. prod. in Murena Hispaniæ. Albinus.*
- Jacea capitulis hirsutis Boelii Ger. emac.*

Jacea purpur. *Valentina* muricato capite *Clusii* foliis
Seridis candicantibus purpurea *C. B.* *supina* purpurea
 capitulis spinosis *Park.*

Iris biflora *Lusitanica* flore violaceo, *Clusio* 2. *J. B.* bi-
 flora flore minore, odore *Lilii convallium* *C. B.* *Iris*
 biflora *Ger.* Supra *Tagum* pingui solo in arvis, vel sa-
 lebrofis & lapidosis locis.

Iris humilis latifolia colore violaceo *J. B.* violacea *Ger.*
Chamæiris variegata *C. B.* *Chamæiridis* latifoliae ge-
 nus 1. *Clus.* In saxosis & marinâ aurâ afflatis locis
 supra *Ulyssipponem*.

Iris bulbosa latifolia acaulos odora *C. B.* bulbosa latifo-
 lia flore cœruleo & candido *J. B.* bulbosa latifolia
Ger. emac. bulbosa latifolia 1. *Clusii* *Park. parad.* In
*Lusitaniæ Baticæ*que collium radicibus, non procul ab
Ana flumine sitis, & copiosè circa *Antequeram* &
Cordubam.

Iris bulbosa tota violacea vel cœrulea *J. B.* bulbosa fo-
 liis cepaceis maculatis, flore purpureo inodoro *C. B.* bul-
 bosa purpurea & purpuro-violacea *Park.* bulbosa *Ang-*
lica *Ger.* Hanc *Hispanicæ* aut *Lusitanicæ* originis esse
 conjectatur *Clusius*.

Iris bulbosa angustifolia tricolor, odore *Coriandri* *C. B.*
 bulbosa tertia sive versicolor *Clus.* bulbosa cœruleo &
 albo versicolor *J. B.* bulbosa varia *Ger.* In nonnullis
Castellæ collibus non procul *Pincia*, i. e. *Valladolid.*

Iris bulbosa lutea inodora major *C. B.* 4. sive lutea *Clus.*
 bulbosa lutea *J. B.* Pingui solo & petrosis collibus ad
Tagum sitis, supra *Ulyssipponem*.

Ilatis sylvestris minor *Lusitanica* *Hort. Lugd. B.*

Juncaria Salmanticensis, *Ger. Park. v. Cat. gen.*

Lagopus minor flore ruberrimo *Park.* ex semine *Hisp.*

Lagopus supinus *Park.* Ex *Hispania* attulit *Boelius*.

Lagopus angustifolius *Hispanicus* *Clus.*

Lathyrus Baticus flore luteo *Park.* æstivus flore luteo
Ger. emac. app.

Lathyrus annuus major *Baticus* *Park.*

Lathyrus palustris *Lusitanicus* *Park.* *Lusitanicus* *Boelii*
Ger. emac. app.

Lathy-

- Lathyrus æstivus* flore miniato *Ger. emac. App.* *Bæticus* miniatus *Boelii* seu *Cicercula* flore rubente *Park.*
- Lathyrus annuus* filiquis *Orobi* *Ger. emac.* *Bæticus* elegans, filiquis *Orobi* *Park.*
- Lavendula* folio multifido *J. B. Park.* folio dissecto *C. B.*
- Stoechas* multifida *Ger.* In colle quodam *Malucæ* *Bæticiæ* urbi vicino; item circa *Murciam.*
- Laurus sylvestris* foliis venosis *C. B.* *Tinus* 2. *Clus.* *Laurus* *Tinus* alter vel 2. *Clusii* *Park.* *Tinus* altera *J. B.* In *Monasterio Pera longa* dicto, locis incultis supra *Ulyssipponem* extracto.
- Laurus sylvestris Corni* fæminæ foliis subhirsutis *C. B.* *L. Tinus Lusitanica* coeruleâ baccâ *Park.* *Lauri Tini* *sylvestris* primum genus *J. B.* *Tinus* primus *Clusii.*
- Præruptis & lapidosis locis, & in sepibus circa oppida *Lusitanicæ Montemar bo novo* & *Tomar.*
- Leucoium bulbosum* Autumnale tenuifolium *Clus.* bulb. Autumnale minus tenuifolium *J. B.* bulbosum Autumnale *C. B. Park.* Ad extrema *Lusitanicæ*, quæ *Bæticiæ* contermina est, non procul *Badaioz* ad flumen *Anam* situm.
- Leucoium luteum* magno flore *C. B. prod.* *Hispanicæ* originis est.
- Lilium flavum* angustifolium *C. B.* nutante flore flavo *J. B. mont.* flavo flore, maculis distincto & non distincto *Clus.* *Martagon* luteum punctatum & non punctatum *Park.* montan. flo. flavo punctato & non punctato *Ger. emac.* *Montium Pyrenæorum* incolæ est.
- Linariæ* aureæ affinis *C. B. prod.* In *Aragonicæ* locis desertis. *Albinus.*
- Linaria triphyllos* minor lutea *C. B.* *Valentina* *Park. parad.* *Valentina* *Clusii* *Ger.* trifolia *J. B.* *Hispanica* prima *Clus.* Circa *Valentiam*, in pratis & locis umbrosis, *Martio.* Quæ ad hanc plantam adnotavimus v. *Hist. nost.* p. 753.
- Linaria tenuifolia* æruginei coloris *C. B.* *Hispanica* atropurpurea repens *Park.* *Hispanica* 2. *Clus.* Semine ex *Hispania* misso nata est.

- Linaria foliis angustis ex viridi canescentibus C. B. Hispanica tertia *Clus.* Hisp. 3. Clusii *Park.*
- Linaria Hispanica 4. *Clus.* foliis carnosis cinereis C. B. parva Hispanica altera *Park.* Moravicæ 2. Clusii per-
similis est.
- Linaria Valentina perennis & saxatilis, flo. luteo hirsuta
Schol. Bot. Tournef.
- Linaria pumila Hispanica *Park.* pumila supina lutea C. B.
lutea parva serpens *J. B.* Osyris flava sylvestris *Lob.*
Ger. Salmanticensi agro aridis locis. Eadem vide-
tur species cum illa quæ in monte Lupi & monte Ca-
pouladou copiosè oritur. *Magn.*
- Linum Sylvestre 7. fruticosum *Clus.* fruticosum niveum
C. B. fruticosum semper virens *Park.* In desertis qui-
busdam Hispaniæ locis sole illustratis.
- Linum frutescens subflavum C. B. *prod.* In Granada.
Albin.
- Lotus Hispanica foliis maculatis C. B. In montibus Ca-
stiliæ frequens. *Albinus.*
- Lychnis sylv. viscosa rubra altera C. B. Muscipula vis-
caria seu Lychnidis species *J. B.* Lychnis viscaria
seu Muscipula *Ger.* L. sylv. rubra minor *Park.* In ar-
vis inter segetes plerisque veteris Castellæ in locis.
L. sylv. 3. *Clus.*
- Lycium Hispanicum folio Buxi C. B. *Park.* quorundam
Clus. quorundam, folio Myrti Tarentinæ aut Buxi
J. B. Apud Complutum, aliisque Castellæ veteris lo-
cis, & Baticæ parte Extremadura dicta circa fluentia
& declivibus locis.
- Malva Hispanica flore carneo amplo *Park.*
- Mandragora flore subcœruleo purpurascente C. B. foemi-
na *J. B.* *Ger.* foemineus *Park.* Supra Gades itinere
Hispalensi, non procul à *Xeres de la frontera*, ad
arborum margines quæ secundum flumina sitæ sunt
- Mandragoras mas *J. B.* *Ger.* mas vulgatio *Park.* fructu
rotundo C. B. calidiorum regionum, ut Hispaniæ &
Italiæ incola est. Umbrosis & uliginosis gaudet.

Marrubium Hispanicum odore Stœchados *Lob.* Hisp. frutescens rotundif. tomentosum odore Stœchadis *Breyn. prod. 2.*

Marrubium Hispanicum *Alpin. exot.* Diversum esse videtur à

Marrubio Hispanico candido *Park.* candido folio subrotundo *J. B.* albo latifolio peregrino *C. B.*

Marrub. album rotundifolium Hispanicum maximum *Sch. Bot. Tourn.*

C. Marum *Ger. vulgare Park.* Sampsuchus five Marum Mastichen redolens *C. B.* Clinopodium quibusdam Mastichina Gallorum *J. B.* Tragoriganum *1. Clus.* Multis Hispaniæ in locis, arido & petroso solo.

Matricaria foliis Abrotani *C. B.* Parthenium *σμηθέφυλλον J. B.* Matricaria five Parthenium tenuitolum *Park.* Ex Hispania delata est.

Menthæ Saracenicæ species flore Anthemidis *J. B.* A Pyrenæorum montium incolis, ubi frequens nascitur, appellatur herba del Moro i. e. Maurorum.

Mentastrum tuberosa radice *J. B. Clus.* tuberosa radice Clusii *Ger.* Mentastrum tuberosum Clusii *Park.* Mentha tuberosa radice *C. B.* Semine ex Hispaniis accepto Clusio enata est.

Moly Dioscorideum Hispanicum *Park. parad.*

Moly montanum latifolium purpureum Hispanicum *Park. Clus. cur. post. ad.* latifolium Hispanicum *C. B.*

Moly montanum flavo flore *Ger. mont. latif. flavo flore Clus. mont. latif. luteo flore Park. latif. lut. odore Allii primum C. B. item secundum ejusdem. Botanicorum luteum latif. Allii odore J. B.* E montibus Pyrenæis erutum ferunt.

Myrtus Bætica latifolia domestica *Clus. J. B.* latifolia Bætica *1. vel foliis Laurinis C. B.* Bætica latifolia *Ger. latifolia maxima Park.* In Monasterio quodam Hispali, & in Mauritanorum viridariis Granatæ vidit Clusius.

Myrtus latifolia exotica *Park.* latifolia Bætica *2. vel foliis latis confertim nascentibus C. B.* Myrti Bætice latifoliæ secundum genus *Clus. J. B.* In Complutenfis

arcis horto, inque quibusdam hortis Cordubæ hanc vidit Clusius.

Myrto-cistus Pennæi *Park. Clus. C. B.* Myrtoc. Tho. Pennæi Angli *Ger.* Myrtoc. Pennæi florib. luteis oblongis *J. B.* E Balearium insul. majore, *Majorca* vulgò dicta, eruit Pennæus.

Narcissus totus albus major *C. B.* latifolius simplici flore, prorsus albo *r. Clus.* totus albus *Ger.* cum pluribus floribus, totus albus major *J. B.* Pingui solo in nonnullis Bæticæ & Lusitaniæ locis uliginosis; tum etiam in summa Calpe, Februarii initio.

Narcissus totus albus minor *C. B.* foliis candicantibus, cum pluribus floribus totus albus minor *J. B.* latif. niveus alter *Clus.* Ex Hispania missus est.

Narcissus pallido flore medio-aureus, sive *5. Clus.* pallidus circulo aureo alter *C. B.* Hic etiam ex Hispania missus.

Narcissi pallidi medio-aurei varietas, seu sulphurei coloris minor *Clus. ad. Cur. post.* pallidus medio-aureus *C. B.* sulphureus minor *Park. parad.* E montibus Pyrenæis erutus est.

Narcissus serotinus seu Autumnalis minimus *Clus.* albus Autumnalis minimus *C. B.* Autumnalis minor *Ger.* Ad Anam fluvium in Turdulis copiosè. Octobri.

Narcissus juncifolius præcox *Ger.* juncifolius flore luteo *J. B.* juncif. *2. Clus.* juncif. oblongo calice luteus major *C. B.* In montanis pratis non procul Toletis, & circa *Guadalupe*, Aprili.

Narcissus juncifolius minor *Clus.* juncif. luteus minor *C. B.* juncif. flore luteo *J. B.* juncif. serotinus *Ger.* Uliginosis inter Hispalin & Gades locis, Januario.

Narcissus juncifolius flavus amplo calice *J. B.* juncif. *1. amplo calice Clus.* angustif. flavus magno calice *C. B.* angustif. seu juncif. maximus amplo calice *Park. parad.* juncif. amplo calice *Ger.* E montibus D. Jacobi Gallæciæ vicinis detulit *Nic. le Queit.*

Narcissus montanus juncifolius calice flavo *C. B.* Pseudonarcissus juncif. *1. Clus.* juncifolius montanus minimus *Ger. emac.* Quibusdam Lusitaniæ Bæturixque collibus, Januario.

Nar-

Narcissus montanus alter flore fimbriato *C. B.* *Pseudo-narc. juncif. 2.* flavo flore *Clus.* *montanus juncif. flore fimbriato Ger. emac.*

Narcissus montanus albus minimus C. B. *Pseudo-narc. juncif. 3.* *Clus.* omnium minimus, *montanus albus Ger. emac.* Hujus & superioris radices è Cantabrorum jugis erutæ fuere.

Narcissus angustifolius albus, calice oblongo, floréque reflexo *C. B. juncif. albo flore reflexo Clus. App. alt. auct. juncif. flo. albo reflexo Park. juncifolius reflexus flore albo Ger. emac. Nicol. le Quelt* ex Hispaniis aut Pyrenæis montibus attulit.

Narcissus major totus luteus, calice prælongo *C. B.* *Pseudo-narcissus Hispanicus aureus maximus Park. Pseudo-narcissus Hispanicus Ger. emac. Bulbocodium Hispanicum J. B.*

Narcissus parvus totus luteus C. B. *Pseudo-narcissus minor Hispanicus Clus. Ger. emac. Bulbocodium minus J. B.* In hortis nostris flore pleno invenitur.

Narcissus luteus polyanthos Lusitanicus C. B. Ægyptius J. B. In Lusitania erutus est prope *D' Uve.*

Narcissus juncifolius totus albus C. B. juncif. flore albo alter Clus. App. alt. Auct. E Pyrenæis montibus erutus est.

† *Nasturtium sylvestre Erucæ affine C. B. sylv. Valentinum Clusio J. B. Park. Eruca Nasturtio cognata tenuifolia Ger.*

Nigella latifolia flore majore simplici cæruleo C. B. cujus semen Nigellæ Hispanicæ nomine missum. Nig. Hispanica flo. amplo Ger. emac. Hisp. flore simplici cæruleo.

Ocismastrum Valentinum Clus. synonyma v. in Cat gen. Circa rivos è flumine *Guadaluvia* ductos ad urbem Valentiam copiosè, Aprili.

Onobrychis incana foliis subrotundis C. B. Ex Aragoniæ & Castiliæ saxosis Albinus attulit.

Orchis myodes lutea Lusitanica Breynii.

Orchis myodes fusca Lusitanica Breynii.

Ornithogalum album unifolium Park. Bulbus unifolius *Ger.* Bulbus monophyllos flore albo an Βολβιν Theophrasti *J. B.* Leucoium unico & junceo folio *C. B.* Redemit Clusius à *Nic. le Quelt*, qui in Lusitania erutam asserebat.

Orobanche flore majore è coeruleo purpurascente *C. B.* flo. maj. purpurascente *Park.* In Pyrenæis montibus. *Burser.*

Pæonia flore niveo Clus. folio subtus incano, flore albo, vel pallido *C. B.* fæmina leucanthemos & Ochranthemmos *Park.* fæmina pumila *Ger. descr.* in Navarræ montibus inventa.

Pæonia tenuis laciniata, subtus pubescens flore purpureo *C. B.* Hispanica sive pumila *Cam.* fæmina Hispanica pumila *Park.* Hispanica pumila *Ger. ico.*

Papaver corniculatum phoeniceum hirsutum C. B. item phoeniceum glabrum *ejusdem.* corniculatum rubrum *Park.* cornutum flore rubro *J. B.* corniculatum phoeniceum glabrum *Ger. emac.* Salmanticensi agro secundum vias, & in agrorum marginibus, Junio. Viennensi etiam agro, & per Moraviam & Bohemiam sponte nascitur.

Papaver erraticum Pyrenaicum luteo flore C. B. prod. In Pyrenæis, locis udis. *Burser.*

Parietaria montana Bætica Clus. cur. post. Melampyrum lanuginosum *Park.* lanuginosum Bæticum *C. B.*

B. Perfoliata Alpina angustifolia minima C. B. prod. In summis Pyrenæorum jugis reperitur.

Perfoliata Alpina angustifolia major sive folio anguloso C. B. prod. In Pyrenæis non longè Narbona.

Pastinaca sylvest. Hispanica angustifolia hirsuta, sive *Tragofolini foliis & facie Breyn. prod. 2.*

B. Pimpinella sanguisorba inodora C. B. prod.

Pimpinella Hispanica major altera conglomerato flore Horn. Reg. Par.

Pimpinella sanguisorba rupestris minima, radice magnâ, foliolis Pimpinellæ spinosæ. In *Hispan.* collecta à *D. Tournefort. v. Phyt. Plukenet.*

Pinafter 2. *Hispanicus* seu minor *Hispanicus Clus.* *maritima* major fructifera altera *Park* *marit. major Ger. C. B.* *Murciano & Valentino regno frequens.*

Pinafter 3. *Hispanicus* seu *pumilio Hispanicus Clus.* *Pinus* *maritima minor C. B.* *Pinafter* *maritima minor Ger. emac. tertius Hispanicus humilis J. B.* *Solo Murciano Regno, idque rarissimè conspexit Clusius.*

Polium montanum 2. albo flore *Clus.* *Nonnisi in mediterraneis Hispaniæ observavit Clusius, solo exili & petroso, in collibus crescens. Hoc cum maritimo Monspeliaco erecto idem vult C. Bauhinus.*

Polium montanum luteum C. B. Ger. montanum vulgare Park. montanum 3. flavo flore Clus. *Regno Granatensi & Valentino oritur. Circa Monspelium etiam D. Magnol. invenit.*

Polium maritimum supinum Park. maritimum supinum Venetum C. B. montanum purpureum Ger. mont. 5. purpureo flore Clus. candidum tenellum tomentosum flore purpureo & albo J. B.

Polium 6. albo flore *Clus.* *Sola teneritas stirpis, & floris varietas inter hoc & præcedens discrimen faciunt. Murciano regno tantum inter Loria & Velez el rubio, in acclivitatibus tumulorum arenosorum invenit Clusius.*

Polygala Valentina 1. 2. & 3. *Clus. v. Cat. gen.*

B. *Polygonum minus lentifolium C. B. prod.* *In Hispaniæ montibus prope Escorial. Albinus. Cum Anthyllide Valentina Clusii (inquit) confundi non debet.*

Pseudo-chamæpitys Clus. *Chamæpitys adulterina seu Pseudo-chamæpitys Park. Cham. spuria, multifido folio, Lamii flore C. B. spuria altera Dodonæi Ger. emac. Locis incultis æstate floret.*

Pseudo-dictamnus Hispanicus folio rugosiflore. Tournef. Schol. Bot.

Quercus gallam exiguæ nucis magnitudine ferens *C. B. Robur 3. Clusii J. B.* *In multis Castellæ veteris locis, ubi ramis ejus contortis & exsiccatis tædarum loco rustici utuntur.*

Quercus foliis muricatis non spinosis, glande superiori simili *C. B.* Robur 4. Clusii *J. B.* In Lusitaniæ solitudinibus, itinere Ulyssipponensi non procul *Ebora*; incolis *Carvalla* dicitur.

Quercus foliis muricatis minor *C. B.* Robur 5. Clusii *J. B.* Cum priore,

Quercus pedem vix superans *C. B.* Robur 7. Clusii *J. B.* Inter *Rio frio* & *Aldea galega* solo arenoso non procul Ulyssippone copiose.

Ranunculus grumosa radice 1. *Clus.* Lusitanicus Autumnalis simplex *Park.* Lusitanicus Clusii *Ger.* latifolius bullatus *Asphodeli* radice *C. B.* Circa Ulyssipponem inter oliveta, & plerisque Bæticæ locis frequens.

Ranunculi grumosa radice primi species 2. *Clus.* flore parvo. Figuram ejus tantum habet Clusius, nulla descriptione addita.

Ranunculus montanus folio *Plantaginis C. B.* folio *Plantaginis Ger. Park.* Pyrenæus, foliis sublongis, non laciniatis, albo flore *J. B.* E montibus Pyrenæis erutus est.

Rapistrum maximum rotundifolium monospermon *Hispanicum Park.* max. rotundif. monospermon *Cornut.*

Rapistrum Hispanicum flo. albo multiflorum, siliquâ glabra non articulata *Schol. Bot. Tournef.*

Rhamni primi Clusii species altera *J. B. Park.* alter Clusii flore purpureo *Ger. emac.* alter foliis falsis, flore purpureo *C. B.* Juxta *Horiuelam Orcelin Vett.* & flumen *Seguram Setabin Vett.* Regni *Valentini* extremis limitibus.

Rhamnus niger *Theophrasti Park.* 3. Clusii *Ger.* tertius, flore herbaceo, baccis nigris *C. B.* In incultis *Granatensis* & *Murciani* Regni locis inter alios frutices.

Ros solis Lusitanicus maximus foliis *Asphodeli* minoris *Tournefort.* *Chamæleontoides Grisei. Plukenet. Phytograph.*

Ruta sylvestris flore magno albo *C. B.* *Harmala Ger.* sylvestris *Syriaca*, sive *Harmala Park.* *Ruta*, quæ dici solet *Harmala C. B.* In *Castella nova* circa *Madridium* & *Guadalaiaira*, collibus & læto solo plurima. v. *Cat. Stirp. Oriental.* *Melanthii* species habetur à *D. Breynio.*

Salix

Salix Alpina Pyrenaica C. B. *prod.* In summitatibus Pyren.

Sanamunda 2. *Clus.* *Thymelæa* foliis Kali lanuginosis sal-
fis C. B. In Bæticæ maritimis inter *Calpen* & *Estepona*,
petroso & salebroso loco, inque montibus Granatæ
proximis.

Sanicula Alpina minima pilosa C. B. *prod.* E montibus
Pyrenæis.

Scabiosa major Hispanica *Ger. Park.* major cum pulchro
semine *J. B.* stellata, folio laciniato major C. B.
Juxta vinearum margines & semitas locisque incul-
tis, agro Salmanticensi & per reliquam etiam Hispa-
niam.

Scabiosa cum pulchro semine minor J. B. Hispanica mi-
nor *Park.* stellata, folio laciniato minor five maritima
C. B. Cum priore. Nos in Sicilia observavimus.
v. Cat. gen.

Scilla radice alba C. B. magna alba *J. B.* alba *Park.* Hi-
spanica *Clus.* Hispanica vulgaris *Ger. emac.* Supra
Ulyssipponem, & plerisque aliis Lusitanæ & Hispaniæ
locis copiosè, Aug. & Septembri.

Scorpioides siliquâ cochleatâ & striatâ Olyssipponensis
Hort. Reg. Par.

Scorzonera minima tuberosa radice Hispanica *Park.* An
Hieracium capillaceo folio C. B. *prod?*

Scrophularia Sambuci folio *Park.* *Sideritis Sambuci fo-*
lio Alpin. exot. Ex Hispania transmissa est.

Scrophularia Scorodonæ foliis *Morif.* Lusitanica *Hort.*
Leyd.

Sedum majus arborescens J. B. *Ger. emac.* majus arbo-
rescens flosculis candidis C. B. majus legitimum *Clus.*
Park. In prærupto & scopuloso colle, non procul à
Scyntri arce Regia, quinto ab Ulyssippone milliari.

Selinum peregrinum Cicutæ folio C. B. montanum verius
Park. *Cicutæ foliis*, *Selinum alterum Clusii*, semine
lato *J. B.* In agro Salmanticensi apicis & à Sole il-
lustratis locis.

Serpyllum folio Thymi C. B. Narbonense *Park.* Creti-
cum *Ger. sylvestre*, *Zygis Clusio*, *Thymo vulgari ri-*
gidiori simile J. B. In Castella veteri cum *Thymo*
duriore. Sela-

- Sesamoides parvum Salmanticum Clus.* *Lychnidi viscosæ flore muscolo affinis foliis Lini* *J. B.*
- Sideritis Hispan. longifol. frutescens seu lignosior Schol. Bor.*
- Sideritis hirsuta procumbens C. B. Sideritis Clusio 3. Hispanica hirsuta J. B. Sideritis 1. Herba Judaica Park. Herba Judaica Lobelii Ger. emac. Aridis & petrosis Castellæ veteris locis frequens.*
- Smilax aspera nigro fructu Clus. aspera minus spinosa fructu nigro J. B. C. B. aspera Lusitanica Ger. v. Cat. Sic.*
- Solanum verticillatum J. B. somniferum Park. somniferum verticillatum C. B. In inferiore arce urbis Malagæ loco petroso & inter rudera Februario.*
- Spartum Plinii seu Juncus Hispanicus Park. Spartum Plinii Clusio Ger. Gramen sparteum Plinii seu spartularum ficuum J. B. sparteum 1. seu paniculâ comosâ C. B. In collibus arenosis inter Vaena & Alcala real sed omnium abundantissimè ab initio Granatenfis Regni usque ad Murciam urbem, qui locus Veteribus Spartarius campus.*
- Spartum alterum Plinii Ger. Plinii alterum mollius Park. Gramen sparteum 2. Clusio J. B. sparteum secundum, paniculâ brevi folliculo inclusâ C. B. Murciano regno locis humidioribus.*
- Stachys Lusitanica Lob. Ger. Park. C. B.*
- Stoebe Salmantica 2. Clusii Park. major foliis Erucae mollibus lanuginosis C. B. Jaceæ genus, Stoebe Salmantica, foliis mollibus lanuginosis, caule infirmo J. B. Salmanticensi agro in agrorum & vinetorum marginibus. Alias duas species v. in Cat. nostro generali.*
- Stoechas serrato folio C. B. Ger. Park. crispo folio Clus. serrato & crispo folio J. B. Nonnisi in summa Calpe invenit Clusius Februario florentem.*
- Stoechas latifolia flore albo C. B. In Murena Castiliæ Albinus legit.*
- Telephium 1. Hispanicum Clus. latifolium peregrinum C. B. Crassula major Hispanica Ger. Telephium seu Crassula major Hispanica Park. Anacampteros maxima J. B. In Hispaniæ umbrosis quibusdam locis.*
- Telephium*

Telephium Lusitanicum hæmatodes maximum Schol. Botan. Tournefort.

Teucrium Hispanicum saxatile glabrum Schol. Bot. Tournefort.

Thapsia latifolia Hispanica Park. latifolia Clusii Ger. latif. villosa C. B. 1. Clusii, latifolia, flore luteo, semine lato, similis Sefeli Peloponnensi Lobelii J. B. Collibus petrosis, non procul ab ostio Tagi supra Ulyssipponem, multisque aliis Lusitaniæ Hispaniæque locis editioribus & incultis.

Thapsia Foeniculi folio C. B. Park. tenuifolia Ger. tenuifolia 2. Clusii, flore luteo, foliis tenuioribus Foeniculi poene instar J. B. Cum priore.

Thapsia maxima latissimo folio C. B. max. Hispanica Park. Salmanticensis sive 3. Clusii, magna, flore luteo, semine lato J. B. Agro Salmanticensi oritur, item circa Pinciam [Valladolid] & tota vetere Castella ad Pyrenæos usque montes.

Thapsia foetidissima Park. foliis Libanotidis foetidissima C. B. 4. Clusii, Tuero vocata, foliis glutinosis, radice nigra foris J. B. Eodem Salmanticensi agro & vicinis locis.

Thlaspi fruticosum alterum Lob. J. B. fruticosum folio Thymbræ hirsuto C. B. fruticosum Hispanicum Park. fruticolum minus Ger. 6. Hispanicum albo flore Clus.

Thlaspi incanum marinum Hispanicum, Eruca peregrina Clusii Park. Leucoium incanum filiquis rotundis C. B. cum filiquis rotundis, flore luteo J. B. marinum luteum majus Clusii & Lobelii Ger. Locis incultis & secus vias in Castella, Maio.

Thymum inodorum C. B. prod. In Regno Valentini locis arenosis ad litus Alicantiæ copiosè Albin.

Thymelæa Hispanica latifolia Schol. Bot. Tournefort.

Tithymalus platyphyllos Clus. Ger. latifolius Hispanicus C. B. Park. Uno Valentino regno, inter Biar & Huentiniente via salebrosa, inter medios frutices.

Tragacantha altera, Poterium fortè Clusio J. B. altera seu minor, Poterion fortè Dioscoridis Park. Tragacanthæ affinis lanuginosa, sive Poterion J. B. Trag. Grana-

Granatenfis, foliis incanis deciduis, flore albo *Morif.*
Circa *Guadix* & *la venta el peral* Granatenfi Regno
in collibus arido & inutili solo, nec alibi.

Tragoriganum angustifolium C. B. *Hispanicum* *Park.*
Clusii *Ger.* tenuioribus foliis, flore candido *J.B.* Solo
Valentino Regno observavit *Clusius*.

Tragoriganum Hispanicum tertium *Clus.* *Creticum* C. B.
Park. *Cretense* *Ger.* *Trag.* quibuldam nigrius, folio
duro, flore purpureo *J. B.* Cum priore.

Trifolium corniculatum *Lusitanicum* flore rubro *Park.*
Lusit. bivalve flore rubro *Morif.* *Sinapistrum* *Lusit.*
triphyllum flo. rubro, filiquis corniculatis *Hort. Lugd.*
Bat.

Tulipa pumilio gramineo folio C. B. *pumilio altera* *Lusi-*
tanica *J. B.* *Lusitanica* sive *pumilio versicolor* *Park.*
In monte D' Ove ad maris litora.

Valeriana Alpina minor C. B. *prod.* Ex montibus *Pyre-*
næis. *Burser.*

Verbenaca Lusitanica latifolia procerior *D. Fagon.*

Viola montana pumila *Clus.* mont. *pumila angustifolia*
Park. mont. *pum.* *angustif.* flore niveo odore C. B.
Gulielmus Boelsius in Hispania observavit.

Præter hæc traditas plurimæ aliæ stirpium rariorum
species in Hispania oriuntur, nonnullæ etiam Hispanica-
rum epitheto gaudentes, Italiæ & Galliæ Narbonensi
communes, ut v. g. *Suber*, *Ilex arborea* & *coccigera*,
Olea, *Arbor Judæ*, *Siliqua dulcis*, *Ziziphus alba* & *ru-*
tila, *Phillyrea*, *Alaternus*, *Lentiscus*, *Terebinthus*, *Paliu-*
rus, *Althæa frutex*, *Periclymenum rectum*, *Juniperus ma-*
jor, *Tamariscus*, *Colutæ* & *Thymelææ variæ*, *Thaliætrum*,
Aristolochiæ, &c. Verùm cum hæc in præcedenti Catalogo,
quem Generalem vocamus, comprehendantur, ne earun-
dem repetitione Lectori fastidium crearem, Hispaniæ
duntaxat peculiare, quæque in aliis regionibus nondum,
quod scimus, fuerint observatæ, in hac Sylloge locum
habere permisimus.

*Plantarum Alpinarum Pyrenaicarum rariorum
manipulus ex Horti Regii Parisiensis Cata-
logo D. Tournefortii collectus.*

A Canthium Pyrenaicum angustifolium magno capite.

Acanth. Pyren. latifolium magno capite.

Acarna major Pyrenaica tomentosa, floribus glomeratis
purpurascens.

Aconitum Pyrenaicum luteum, foliorum segmentis sibi *Aconitum*
invicem incumbens: quartum *Matth. Edit. Valgr. pyrenaicum L.*

Acon. salutiferum elatius foliis atro-virentibus, flore ma-
jore, Pyrenaicum.

Ageratum serratum Pyrenaicum hirsutum.

Alchimilla Alpina pubescens minor *Hort. Reg. Par.*

Alnus seu Frangula saxatilis Alpina minima.

Antirrhinum saxatile Pyrenaicum flore majore.

Aster Pyrenaicus præcox flore coeruleo majore.

Atticus Alpinus alter magno flore.

Astragalus Pyrenaicus, flore albo, folio subrotundo.

Alpinus halicacabus incanus, foliis Tragacan-
thæ, flore purpurascens.

Pyrenaicus incanus, foliis Vicix, flore Sul-
phureo.

Bellis Alpina, foliis profundius dissectis.

Alpina foliis laciniatis.

Pyrenaica, latissimo folio, flore maximo.

Coerulea Pyrenaica frutescens minima.

Betonica maxima, Scrophulariæ folio, flore è luteo pal-
lescente.

Brunella Alpina Hyssopifolia mas.

Cacalia Alpina, foliis angulosis & acutioribus subtus to-
mentosis.

Alpina foliis araneosa lanugine obductis.

Pyrenaica Alliariæ foliis.

Campa-

Campanula Alpina sphaerocephalos coerulea magno flore.
Alpina humilis Medii Matth. flore.

Carduus pratensis latifolius Alpinus, Acanthoides, flore minore purpureo.

mollis Alpinus foliis eleganter lacinjatis.

Pyrenaicus elegantissimus, caule crispo.

Carlina acaulos magno flore, radice perenni montis aurei.

Caryophyllata Pyrenaica rotundiore & ampliore folio.

Chamaecerasus Pyrenaica, Oleæ folio, fructu gemino rubro, Grossulariæ simili.

Chamaedrys Alpina hirsuta.

Alpina latifolia elatior splendens.

Pyrenaica repens, flore glomerato albo, foliis rotundioribus.

Spuria latifolia major, non ramosa Pyrenaica.

Cirsium Pyrenaicum latifolium majus.

Cyanus Alpinus capite pennato.

Doronicum Pyrenaicum Persicæ foliis glabrum.

Alpinum foliis subrotundis, araneosa lanugine obsitis.

Alpinum humile maximo flore.

Eryngium Alpinum spinis horridum capite longiore.

Erysimum corniculatum majus perenne Pyrenaicum.

Geranium columbinum perenne Pyrenaicum latifolium magno flore.

Hieracium Pyrenaicum Lamplanæ Dodonæi foliis.

Pyren. Blattariæ folio hirsutius.

Pyren. Blattariæ folio minus hirsutum.

Pyren. folio Cerinthes latifolium.

Pyren. fol. Cerinthes angustifolium.

Pyren. Dentis leonis folio latissimo.

Pyren. longifolium amplexicaule.

Pyren. rotundifolium amplexicaule.

Pyren. Verbasci folio tomentosum.

Alpinum humile Doronici facie.

Holosteum Alpinum latiori folio glabro non crenato.

Alpinus

Alpinum angustiori folio, glabro dentato.

Horminum Pyren. glutinosum Anguriæ folio *D. Fagon.*

Hypericon Alpinum magno flore, nigris punctis insignito.

Onobrychis, seu Hedyfarum clypeatum Alpinum perenne,
siliquâ glabra, flore albo. An Onobrychis clypeata
lævis *C. B. prod?*

Orobis Pyrenaicus latifolius nervosus.

Quinefolium Pyrenaicum, flore albo, folio Tormen-
tillæ sericææ.

Alpinum Fragariæ facie.

Ranunculus Alpinus, foliis Crithimi crassioribus, floribus
albis vel carneis.

Pyrenaicus, foliis sublongis non laciniatis,
flore albo.

Reseda Linariæ folio glauco Pyrenaica.

Salix Alpina Pyrenaica *C. B. prod.* In summit. Pyren.

Scabiosa Pyrenaica cinerea villosa magno flore.

Sedum Alpinum tomentosum minus.

Pyrenaicum ferratum minus, flore guttato.

Pyren. pyramidale latifolium elegantissimum.

Pyren. dasphyllum lignosum & purpurascens fo-
lio deciduo.

Pyrenaicum, pallidè luteum, foliis partim inte-
gris, partim trifoliis.

Alpinum, umbilicato folio, radice repente.

Sideritis humilior Pyrenaica Hyssopifolia procumbens.

Sideritis Alpina, Hyssopifolia ferrata.

Stachys Alpina Betonicæ folio.

Succisa Alpina flore prolifero cœruleo.

Pyrenaica minima, seu humilior.

Tragacantha Alpina semper virens, foliis viridioribus hir-
sutis.

Veronica mas repens Pyrenaica, folio rotundo hirsuto:
& folio longiore glabro.

Viridarium Lusitanicum Grisleii reseētis duntaxat Indicis, Americanis, Hispanicis nostris, inque Europa passim sponte nascentibus.

A Brotanum mas vulgare ; *cujus synonyma vide in Catalogo generali precedente.*
 Abrotanum mas alterum ; fortè Abr. mas cum pulchris corymbis *Ʒ. B.* mas angustifolium incanum *C. B.*

Abrotanum fœmina montanum folio incano, non descriptum.

Abr. fœm. mont. folio viridi, *N. D.*

Absinthium Ponticum verum Dioscoridis. Cùm nomen alicujus nuperi seu recentioris Botanici non adjiciat, ego sanè quam plantam intelligat nescio.

Acanthium verum Dioscoridis. An Acanth. altissimum Lusitanicum *Hort. Reg. Par.* an aliam speciem designet Lectori divinandum relinquo.

Acarna umbellifera flore patulo Lusit. *N. D.*

Acetosa radice Lapathi 1, 2. Lusit. *N. D.*

maxima radice prælonga tuberosa, *N. D.*

angustifolia rad. prælonga tuberosa *N. D.*

laciniata amara supina, *N. D.*

rotundifolia viminea Lusit. *N. D.*

annua minor, *Azedas, N. D.*

minima auriculata, semper virens.

Aconitum flore coeruleo Lusit. *N. D.*

flo. albo Lusit. *N. D.*

Adiantum album pumilum annuum *N. D.*

Ad. nigrum radice prælonga arbores annosas perreptante, *N. D.*

Ægilops longiùs spicata.

Æg. barbata.

Agrimo-

Agrimonia odorata Lufit.

Alaternus arbor fructu rubro, N. D.

Alcea pentaphyllea Lufit.

Alectorolophos flore vario, albo, luteo, N. D.

Aloe. Erva babosa. Synonyma v. in Cat. gen.

Alopecuroides ramosa N. D.

Alfine Erinus Fab. Columnæ dicta ; *Rapunculi species est, cujus Synonyma v. in Cat. gen.*

Alfines facie nova planta Col. i. e. Cynocrambe legitima Dioscoridis, cujus synonyma vide in Cat. gen.

Althæa Olbiæ Galloprovincialis. v. Cat. gen.

Althæa frutex Clusii ; quam plantam intelligat nescio, nam Clusius plures species describit.

Amaranthus major. Bredos vermelhos.

holosericeus purpureus spicatus.

albus, spicâ rubrâ pendulâ.

major atro-purpureus.

tricolor, *Papagayos.*

Has *Amaranti species*, non indigenas, sed aliunde advectas, & in hortis duntaxat cultas suspicor : verum quoniam de eo mihi non planè constat, omittere nolui.

Ammi vulgatius.

Anagallis aquatica altera pusilla N. D.

Anagallis mas altera fl. amplo pulcherrimo N. D.

Anag. fæm. tenuifolia fl. coeruleo amplo elegantissimo,
N. D.

Anag. fæmina tenuissimifolia fl. carneo pulchro N. D.

Anag. fæm. tenuissimifolia pusilla coerulea N. D.

Anag. fæm. latifolia minor N. D.

Anag. fæm. latifolia altera minima N. D.

Anagyris vera Dioscoridis. Anagyris foetida C. B.

altera fortè foetida altera rotundo folio C. B.

Anchusa supina annua flore ferrugineo, N. D.

Anchusa frutescens tenuifolia flore coeruleo vivacissimo.

Saragaza. N. D.

Anethum segetum. Endramo N. D.

Anisum.

Anthyllis leguminosa flore rubro pulchro N. D.

fl. rubro annua N. D.

A a 2

flo.

- flo. albo annua. *N. D.*
 filiquâ veficariâ. *N. D.* An Lotus
 pentaphyllos veficaria *C. B.* ? quæ à Parkinsono Anthyl-
 lis leguminosa veficaria Hispanica rectius infcribitur.
 Anthyl. legum. flore luteo, multis filiquis velut in fasci-
 culum collectis, annua *N. D.*
 Anth. legum. filiquâ falcatâ annua *N. D.*
 Antirrhinum majus femper florens. *N. D.*
 Antirrh. triornithophorum *N. D.*
 Antirrh. medium flore albo.
 Aparine fegetum incurvato feminis pediculo *N. D.*
 feget. femine Coriandri faccharati facie.
 exiliffimis ramusculis major *N. D.*
 exiliff. ramusculis minor *N. D.*
 fegetum minima brumalis.
 Aphaca altera femine albo, nigris maculis ornato *N. D.*
 Apium Macedonicum verum.
 Macedonicum *Lusit. Lusitanorum Saxifragia N. D.*
 Apium montanum *Salsa de Castanheira.*
 Apium Smyrniun Creticum dictum.
 Apium Sii folio annuum *Lusitanicum. N. D.*
 Apocynum Fabii Columnæ.
 marinum *Lusitanicum N. D.*
 Aquilegia montana flore albo. *N. D.*
 Arachidna Theophrasti.
 Arachus clematitis flo. cœruleo.
 clematitis fl. purpureo pulcherrimo.
 palustris filiquâ radiatâ. *N. D.*
 Arachi aliæ sex varietates.
 Aristolochia longa vera.
 clematitis Bætica *Clus.*
 clem. 2. fronde perpetua odora.
 polyrrhizos seu Pistolochia *Plinii.*
 Artemisia tenuifolia marina.
 tenuiffimifolia.
 Arundo Cypria seu Donax.
 Cypria minor.
 Asperula cœrulea supina *N. D.*
 palustris *N. D.*

- Alpalathus Creticus v. *Cat. Cret.*
 Aster flore aureo spinoso.
 odoratus Lusitanicus.
 montanus flo. cœruleo amplo, an Montanus cœruleus magno flore, foliis oblongis *C. B.*
 Astragalus filiqua triangulari *N. D.*
 Artriplex sylvestris, *Fedegosa.* quid.
 halimoides *N. D.*
 botrytis Lusitana *N. D.*
 Atractylis flore albo.
 Baccharis vera forte Dioscoridis. *Montana.*
 Balsamina mas; aliunde in hortos advectum suspicor, non indigenam.
 Bellis Bugulæ folio major *N. D.*
 Bug. folio minor *N. D.*
 minima ramosa annua *N. D.*
 fruticosa major Lusitanica *N. D.*
 frut. maxima Lusit. *N. D.*
 Tanaceti folio minor Lusit. *N. D.*
 Beta alba maxima. *Affelgas.*
 radice rubra esculenta & alba.
 marina semine aculeato. v. *Cat. gen.*
 Betonica angustifolia odorata.
 Blattaria flore luteo odorato Africana.
 flo. violaceo.
 fl. maximo elegans.
 Blitum vulgare esculentum. *Bredos.*
 supinum.
 Bulbonach seu Lunaria Græca annua.
 perenne v. *Cat. gen.*
 Borago semper virens *Lob.*
 Brassicæ multas species enumerat, quas omnes hortenses esse suspicor.
 Brunella vulgari similis spicâ longissimâ Lusitanica.
 Brun. montana conciso folio. *N. D.*
 montana multifido foliis, flo. albo *N. D.*
 Buglossum marinum elegans. *N. D.*
 marinum fl. cœruleo pulcherrimo *N. D.*
 echioides luteum, Hieracio cognatum, latifolium Lusitanicum.

Bulbocastanum tenuiter inciso folio Lusit. N. D.

Bupleurum latifolium N. D.

tenuifolium annuum N. D. forte Auricula le-
poris minima *J. B.*

Cepa maxima.

Calamagrostis striata seu Sparganium.

Campanula minima annua N. D.

Cannabis spuria 1. 2. 3. Lusitan. N. D.

Cardamine bulbosa aquatica Lusit. N. D.

Carduus benedictus. An extra hortos ? q.

Carduus lacteus medius.

lacteus minor.

Sphærocephalus major & minor perennis.

Card. pineus *Lob.* Lusit. *Cardoso.*

Card. Solstitialis flo. luteo minor.

Card. palustris Lusit.

Chondrilloides *Lugd.*

mollis seu Cirsium Lusitanicum N. D. *Viomal.*

costa esculentus melioris notæ. *Cardo.*

Carlina sylvestris reticulato capite elegans N. D.

Hic est proculdubio Carduus parvus *J. B.* cujus sy-
nonyma vide in *Cat. gen.*

Carthamus seu Cnicus.

sylvestris seu Cnicus alter *Clusii.*

Caryophyllata montana elegans Lusit.

Caryophyllus Armerius barbatus latifolius, fl. rubro albo
maculato.

Armerius barbatus tenuifolius sylvestris.

montanus major N. D.

mont. minor elegans. N. D.

mont. capillari folio.

Cattaria radice tuberosa, fl. coeruleo spicato N. D.

rad. Centaurii minoris, fl. purpureo N. D.

Caucalis magno echinato semine N. D.

umbella ampla hispida N. D.

folio Cerefolii segetum. N. D. Has tres plan-

tas ab aliis editas suspicor, quamvis Autor noster pro
non descriptis habet.

Celastrus Lusitanica. *Samoca.*

Centau-

- Centaurium majus alterum Clusii. Rhaponticum Offic.*
Centaurioides Lusitanica N. D.
 lutea, capitulo spinoso annua N. D.
Centaurium minus alterum Lusit. N. D.
 minus spicatum Lusit. N. D.
Cepæa Matth.
Cerinthe major versicolor.
 minor flo. albo, luteo, vario N. D.
Chamædrys multifida spinosa odorata N. D.
Chamæleon albus verus Cardo matacaon.
Chamæmelum palustre trimestre. N. D.
Chelidonium minus alterum Lusitanicum.
Chondrilla pusilla bulbosa atro-purpurea N. D.
 pusilla bulbosa Lobelii. Synonyma vide in
 Cat. gen.
Chrysanthemum litoreum Lob.
 Segetum Bellidis folio N. D.
 Bellidis folio serrato elegans N. D.
 Segetum supinum.
 Valentinum Clusii alterum N. D.
Chrysocome seu Stœchas citrina odoratissima N. D.
Chrysocome seu Stœchas citrina fl. globoso majore N. D.
Chryf. seu Stœchas citrina polyclonos. N. D.
Chryf. seu Stœchas citrina petræa N. D.
Cicer Orobæum Lob.
Cicercula sylvest. semine fusco 1 & 2 N. D.
 sylvestris semine fusco subterraneo N. D.
Cichorium campestre æstivum seu annuum N. D.
Cistus humilis Plantaginis folio. Arcal. admirandæ virtutis
 detergentis & mundificativæ.
Cistus humilis Sampsuchi folio N. D.
Cisti annui 12 species, pleræque non descr.
Cistus Ledon Roris marini folio, fl. albo N. D.
Cochlearia pusilla montana N. D.
Consolida regalis hortensis variorum colorum Lusitan.
 Esporas de Cavalleiro.
Consol. reg. sylvestris flo. cinericeo cœruleo N. D. Hanc
 eandem esse suspicor cum ea cui in Cat. gen. Del-
 phinii flore minore obsoletè cœruleo nomen dedimus.

- Convolvulus *Althææ folio Clus. v. Cat. gen.*
 campestris fl. cœruleo 1. 2. N. D.
 campestr. fl. albo. N. D.
 hortensis folio integro, fl. cœruleo N. D.
 hort. hederaceo folio, flore cœruleo.
 Conyza *viminosa Lusitanica N. D.*
 minor vera Dioscoridis Lob.
 Cortusa *Matthioli. Synonyma v. in Cat. gen.*
 Cotyledon *max. Lusit. N. D.*
 Cucurbitarum *varias species ponit, quas hortenses esse ex-*
 istimo, ideóque omisi.
 Cuminum *sylvestre, Cominhos rusticos.*
 Cynara *sylv. angustifol. Lusit. Echini licet spinosissimi*
 antequam aperiuntur, & crudi & elixi esitantur. Alca-
 chofras brevas. Reliquæ quas adducit species, ut su-
 spicor, hortenses sunt.
 Cynocrambe *vera Dioscoridis.*
 Cynoglossa *altera Lusitanica.*
 Cyperus *rotunda odorata minor Lusit.*
 rad. rotunda inodora Lusit N. D.
 rad. rotunda inodora marina N. D.
 Cytisus *spurius 1. 2. N. D.*
 Daucus *Creticus verus 1. Dioscor. Ditamo.*
 Creticus 2. umbellis per caulem sparsis.
 Digitalis *flo. ferrugineo & luteo.*
 fl. luteo villosa major & minor.
 Doronicum *angusto folio Transtaganum.*
 Dryopteris *2. Lusitanica N. D.*
 Drypis *seu Oncpyxos.*
 Echium *supinum fl. rubro Transtaganum N. D.*
 Creticum fl. purpureo.
 angustifolium.
 pumilum flo. luteo annuum. An Echioides lutea
 minima campestris Col? vid. Cat. gen.
 Echium *seu Lycopsis hispidissima N. D.*
 Elatine *rotundifolia lanuginosa erecta N. D.*
 sagittæfolia minima Lusitanica N. D.
 Erica *unionifera 10. Clus. v. Cat. gen. & Hisp.*

- Ericæfolia* planta supina marina. *Elleborinba.* An *Erica*
maritima Anglica supina *Park* ?
Erinacea altera Lusitana N. D.
Eruca pumila supina brumalis Lusit. N. D.
 Nasturtii folio Lusit. N. D.
 crispo folio Lusit. N. D.
 latifolia Scalbricensis N. D.
 lacustris elegans Lusit. N. D.
Erucago Apula *Col.*
Ervilia seu *Ochros* Dalech. *Dodonæi* Lob. v. *Cat. gen.*
Eryngium pumilum Lusitan. supinum. N. D.
 folio integro Bæticum N. D.
Erysimum 2. *Tab. i. e.* alterum siliquis *Erucae* C. B.
Erysimum flo. albo.
Esula major *Dod. Lugd.* *Turpethum* nigrum *Auctarii* vulgo. mirificè sed non sine noxa purgat.
Esula minor alia polyrrhizos. *Erva de Joanno Piras.* purgat ut superior.
El. minor *Ericetorum* ferè *aphyllos* N. D.
 pumila supina, cauliculis valdè foliosis humi stratis.
 N. D.
Euphrasia pumila verna Lusit. *Efrasia.* N. D.
 lutea odorata montana N. D.
 scoparia fl. luteo. *Matapulgas* N. D.
 aspero valde fragili folio, montana perennis.
 Camedris. N. N.
Faba Græca sylv. 1. & 2. Lusit. N. D.
Ferrum equinum v. *Cat. gen.*
Filix elegans 1. & 2. N. D.
Foeniculum dulce Azoricum, umbellâ amplâ.
 sylvestre supinum.
 aquaticum.
Fœnum Græcum.
Fraxinella flo. purpureo & albo major & minor. v. *Cat. gen.*
Frutex coronarius *Clusii* seu *Syringa* alba. v. *Cat. gen.*
Fumaria major *clématitis.*
 tenuifolia seu *Capnos tenuifolius* Lob. v. *Cat. gen.*

- Gagel ramulis albis majus Lusit. N. D.
 ramulis rubris majus alterum. N. D.
 Galega altè affurgens Lusit. N. D.
 Gallium flo. luteo annuum Lusit. N. D.
 Genista hortenſis major odorata. *Gieſta*.
 fl. albo monospermos.
 ſylveſtris repens amplo flore Lusit. N. D.
 pumila Touronenſis Lusit. N. D.
 ſpinola fl. luteo ſpicato Lusit. N. D.
 Geranium Cicutæ folio montanum trieſtre N. D.
 Cicut. fol. repens Tranſtaganum.
 Malacoides hirsutius N. D.
 Robertianum fol. Geranii columbini N. D.
 Staphidis agriæ fol. longius radicum N. D.
 batrachoides majus flo. albo.
 Gingidium ſeu Viſnaga pumila montana Lusit. N. D.
 Glaux ſemine echinato 1 & 2 Lusit.
 ſupina Luſitanicum N. D.
 ſupinum viminola Lusit. N. D.
 Glycyrrhiza altera vera Dioſcoridis.
 Gnaphalium lanuginosum album paluſtre N. D.
 roſeum Luſitanicum N. D.
 ſupina echinato ſemine N. D.
 Gramen Ægilops longius ſpicatum Lusit. N. D.
 Ægilops prælongis ariſtis vallata. N. D.
 Gr. Alopecuroides paluſtre nodosum ſeu bulbosum N. D.
 Gr. Alopecuroides hirsutum paluſtre Lusit. N. D.
 Gr. Alopecuroid. aquaticum Touronenſe N. D.
 Gr. Alopecuroid. ſegetum elegans N. D.
 Gr. Alopecuroid. campeſtre vernum Lusit. N. D.
 Gr. amabile tremulum majus paniculis elegantiffimis N. D.
 Gr. amabile tremulum minus ſpecioſum.
 Gr. amab. trem. minimum elegans. *Bollebelle*, N. D.
 Gr. Arundinaceum ſtriatum longius radicum N. D.
 Gr. Avenaceum bulbosum Lusit. N. D.
 Gr. Avenaceum pratense Lusit.
 Gr. Avenaceum elegans Salaciense. N. D.
 Gr. Avenaceum capillari tenuiſſ. folio N. D.
 Gr. Avenaceum tremulum montanum elegans N. D.
 Gr. Ave-

- Gr. Avenaceum Alopecuroides N. D.
Gr. Avenaceum Autumnale amplâ paniculâ N. D.
Gr. Bromoides paniculatum molle marinum N. D.
Gr. Bromoid. paniculat. molle, aristis recurvis obfitum,
elegans Lusitanicum N. D.
Gr. canarium spicâ amplâ Lusitanicum N. D.
Gr. canar. pumilum supinum Lusit. N. D.
Gr. cristatum pratense Lusitanicum N. D.
Gr. cuspidatum odoratum pratense N. D.
Gr. cyperoides Vettonicæ caryophyllatæ foliis, triplici &
quadruplici spica N. D.
Gr. cyperoides echinatum.
Gr. cyperoides caudatis spicis.
Gr. cyperoid. caudatis spicis intortis N. D.
Gr. cyperoid. cyperi veri umbellis, venustissimum pusil-
lum annuum autumnale N. D.
Gr. cyperoid. aliud pumilum autumnale elegans N. D.
Gr. cyp. 3. pumil. Autumnale globosis capitulis N. D.
Gr. dactylon, Canarium Lob.
Gr. dactylon Scoparium Lusitan.
Gr. duplici seu medio aperta spica N. D.
Gr. Geranites intractabile N. D.
Gr. hirsutum nemorosum aliud Lusit. N. D.
Gr. holosteum polyspermon Lusit. N. D.
Gr. holosteum Matth. pluribus granis in capitula conge-
stis majus & minus N. D.
Gr. holosteum idem apice ornatum N. D.
Gr. hordeaceum alterum Lusit.
Gr. hordeaceum 3 marinum pulchrum N. D.
Gr. junceum capitatum N. D.
Gr. junceum conatum N. D.
Gr. junceum conatum, apice donatum N. D.
Gr. junceum pluribus capitulis in unum congestis N. D.
Gr. juncoides contractiore panicula N. D.
Gr. juncoides sparsâ paniculâ 1. 2. 3. 4. Lusit. N. D.
Gr. miliaceum segetum Lusit.
Gr. miliaceum æstivum vestibis infestum.
Gr. miliaceum pumilum elegantissimum N. D.
Gr. palustre seu aquaticum paniculosum dulce, fortè Gra-
mini nostro aquatico miliaceo idem.

Gr. pa-

- Gr. paniceum spica parva leniter hirsuta.
 Gr. paniceum plurimis spicis obtusis per culmum sparsis.
 Gr. paniceum pluribus spicis congestâ paniculâ.
 Gr. Phalaris dictum.
 Gr. Phalaris altera Lusit. N. D.
 Gr. Phalaroides 1. 2. 3. bulbosum N. D.
 Gr. Phoenix multiplicibus granis spicata N. D.
 Gr. Phoenix rariore grano longius spicata N. D.
 Gr. Phoenix ramosa maritima N. D.
 Gr. Phoenix alata venustissima N. D.
 Gr. Phoenix pilosâ spicâ N. D.
 Gr. Phoenix calvâ spicâ N. D.
 Gr. Phoenix calva falcata spica minima N. D.
 Gr. plumosum parietinum pulcherrimum N. D.
 Gr. pratense brevi folio, radice nodosa vernum N. D.
 Gr. secalinum bulbosum, spicâ longâ multis longisque
 aristis obsitâ, Lusit. N. D.
 Gr. segetum paniculâ sericeâ contractâ N. D.
 Gr. segetum paniculâ sericeâ sparsâ N. D.
 Gr. Sorghi panicula erectum & alterum.
 Gr. Sparteum 1. paniculâ comosâ.
 Gr. Sparteum 2. paniculâ brevi folliculo inclusâ.
 Gr. argentea caudata spica, sparteum, longius radicum
 Lusit. & Bæticum.
 Gr. sparteum Avenaceâ paniculâ dumetorum N. D.
 Gr. spicatum majus & minus marinum.
 Gr. typhinum longâ caudatâ spicâ N. D.
 Gr. torosum campestre.
 Gr. torosum Lusitanicum.
 Gr. tribuloides majus.
 Gr. tribuloides minus F. Columnæ. v. *Cat. gen.*
 Gr. triviale rudum & murorum miliacea pendula pani-
 cula Lusit. N. D.
 Gr. xerampelinum latifolium minus sparsa panicula.
 Gr. xerampelinum latifolium, brevi paniculâ, longius ra-
 dicatum.
 Gr. xeramp. tenui breviss. folio, panicula contractiore.
 Graminum (inquit) plura alia genera alit ager Ulyssippo-
 nensis.

Gratiola alia Lusitanica, pituitam ac bilem supernè ac infernè vehementer purgans.

Halimus 1. *Clus.* Synonyma v. in *Cat. gen.*

Halimus annuus Lusitanicus.

Hedysarum seu Securigida filiqua falcata. v. *Cat. gen.*
clypeatum Lobelii. v. *Cat. gen.*

Hedysarum seu Securigida peregrina *Clus.* v. *Cat. gen.*

Heliochrysum *Clus.* *Macella fedegosa.*

Heliochrysum aliud.

Heliotropium supinum alterum Lusitanicum N. D.

Heliotropium supinum tertium Baticum N. D.

Heliotropium minimum Lobelii & supinum Clusii distinctas plantas facit, utrumque autem in Lusitania reperiri tradit.

Hemionitis.

Herba Doria.

Herniaria hirsuta segetum annua Lusitanica N. D.

erecta annua Lusit. N. D.

marina Lusit. N. D.

Alfinitis annua N. D.

Alfinitis annua marina N. D.

Alfinitis annua tertia minor N. D.

Hieracium Dentis leonis facie peregrinum.

barbatum medio-nigrum.

lanuginosum fl. albo pallidente N. D.

lanuginosum fl. luteo, item aureo N. D.

hirsutius 1. 2. 3. Lusit.

supinum verrucarium N. D.

verrucarium erectum N. D. Utriusque folia,

inquit, conveniunt acetariis.

Hieracium grave-olens N. D. Non diversum esse existimo ab Hieracio Castorei odore.

Hier. grave-olens suave-rubente flore. A F. Columna descript. nec aliter fere à præcedente differt quàm floris colore.

Hieracium stellato semine annuum, cujus folia idonea acetariis N. D.

Hierac. latifolium radice reptatrice N. D.

fl. luteo, foris purpurascens minus N. D.

Holoste-

Holosteum Salmanticum pusillum annuum N. D.

Hordeum nudum. *Cevada sama.*

Horminum sylv. 1. fl. vario N. D.

sylv. 2. & 3. fl. purpurascens N. D.

sylv. 5. latifolium fl. amplo albo N. D.

sylv. fl. cœruleo exiguo; fortè nostras seu Lavendulæ flore *Clus.*

Horm. luteum seu Colus Jovis. *Gallo crista.*

Hydropiper seu Persicaria pusilla repens N. D.

Hyoscyamus fl. aureo *Alpini.*

Hypocoum Clusii Gesn. Dod. v. *Cat. gen.*

Hypericum latifolium Lusitanicum N. D.

tomentosum 1. 2. palustre N. D.

minus Ericetorum Lusitanicum N. D.

Hyssopus flo. albo & rubro.

Jacea maxima Lusitanica. *Lavapee* N. D.

Helenitis palustris Lusit. N. D.

lanuginosa palustr. fl. purpureo N. D.

latifolia campestris cap. spinoso. *Artfol.*

latif. acaulos, cap. spinis horrido N. D.

tenuifol. cap. spinoso Cetobrigensis N. D.

tenui diviso folio, fl. luteo N. D.

supina hæmorrhoidalis fl. rubro, purpureo, albo & variegato. *Cardinho peraas almorramas.* N. D.

Jacobæa latifolia Bætica.

Jasminum Valentinum seu Catalonicum.

Iberis Hispanica.

Ilex cujus glandibus in Lusitania & Bætica vescuntur,

Esculus verus Antiquorum. *Enzinbeira.* De hujus ar-

boris fructu intelligendus est Plinius ubi scribit, *Quin*

& hodie in Hispaniâ secundis mensis Glans inseritur.

Juncus lævis paniculâ pluribus globulis congestâ, è medio culmo prodeunte.

Juncus exiguus palustris. *Quam Junci speciem intelligat nescio.*

Laburnum majus.

Lachryma Jobi, *Lagrimas de N. Senhora.*

Lactuca sylv. vera Dioscoridis.

sylv.

sylv. major. Saralho, Endivia.

Lagopus vulg. Lusitan. Orelha de lebre.

angustifolius Hispanicus Clus. Trifolium Hispanicum angustifolium, flore dilutè rubente C. B.

Lagopus supinus capite compresso N. D. major flo. rubro.

Lapathum maculatum Lusitanicum. hortense, Patientia dictum. angustifolium palustre.

Lathyrus seu Cataputia minor Officin. Tartagos.

Lathyrus segetum semine nigro, exquisitè rotundo N. D.

fem. nigro exactè rotundo minor. N. D.

seget. minor siliqua articulata. N. D.

palustris Ericetorum N. D.

palustris siliqua aspera Lusit. N. D.

minimus leptomacrolobus Lusit. N. D.

Lavendula serrato folio.

multifida Clusii v. Cat. Hisp.

Laurus fructu majore. Loureiro.

bacca minore.

Tinus 1 & 2 Lusit. Synonyma in Catal. Hispan.

Lens maculata elegans Lac.

palustris quadrifolia C. B. palust. 2. Matth.

Lenticula marina Serapionis Lob. Lugd. Sargazo.

marina serratis foliis Lob. Lugd.

Leucanthemum segetum folio serrato N. D.

Heliochrysi folio N. D.

Leucoium sylv. flore purpureo supra Scalbrin.

sylv. minimum Scalbricense.

Libanotis cachrifera Erva ysqueira.

verior rigidiore folio. Funcho di porco.

latifolia Aquilegiæ folio N. D.

Lilac seu Syringa fl. cœruleo Clus. Cam.

flo. albo pendulo odoratissimo. Azarrira.

Limonium Lychnidis coronariæ folio Lusit. N. D.

minus latifolium N. D.

angustifolium minus 1. & 2. N. D.

ferulaceo folio N. D.

Linaria segetum flo. luteo verna 1. Lusit.

seget. fl. luteo maculato verna 2. Lusit.

seget.

- seget. flo. violaceo verna 3. Lusit.
 seget. fl. purpuro-violaceo verna 4. Lusit.
 cauliculis valdè foliosis pumila, fl. luteo N. D.
 multicaulis pumila vinearum flo. luteo N. D.
 marina fl. pulchro, caule folioso N. D.
 montana fl. luteo perennis N. D.
 lacte turgens palustris flo. coeruleo N. D.
- Linum** sylv. supinum fl. luteo amplo & exiguo N. D.
 sylv. supinum alterum fl. exiguo N. D.
 sylv. umbilicatum fl. albo Lusit.
 sylv. asperius fl. luteo spicato.
 sylv. alperum fl. luteo umbellato.
 sylv. asp. virgatum sparsis ramulis majus.
 sylv. asp. virgatum sparsis ramulis minus.
- Lotus** Celtis arbor.
 Lotus filiquosa palustris.
 filiq. pilosa viminosa Lusitan. N. D.
 filiq. incana marina Lusitan. N. D.
 filiq. fl. rubello *Clusii*.
- Lupinus** syl. maximus, medius, minimus coeruleus.
 syl. fl. rubro obsoleto. N. D.
 syl. fl. cinericeo 1. & 2. N. D.
- Lupulus** spontaneus fl. exiguo racemoso N. D.
- Lychnis** sylv. viscosa fl. albo perennis N. D.
 sylv. viscosa fl. purpureo vivacissimo, N. D.
 sylv. viscosa fl. rubro reflexo N. D.
 sylv. trimestris flo. rubello 1. & 2.
 sylv. marina fl. purpureo pulcherrimo N. D.
 sylv. fl. rubris elegantissimis, per caules sparsis
 N. D.
- Lychnis** syl. stellato flore.
 syl. flo. rubro, folliculis densè stipatis.
 syl. flosculo rubro vix conspicuo.
 palustris folliculo striato 1. & 2. N. D.
 perfoliata, folliculo pentagono N. D.
- Lyfimachia** purpurea altera Lusitan. N. D.
 purpurea minima. *Perfigueira*.
 purpurea minima altera supina:

Malva Bohemica.

hirsuta Cannabina Hispan. N. D.

Crispa.

segetum rotundifol. amplo flore Lusit. N. D.

seget. quod trimestris flo. albo fugoci N. D.

Malos Aurantias, Limonias, Citrias, Assyrias, Punicas
fativas, quia hortenses sunt, omitto.

Malus Punica sylvestris.

Punica Balaustrifera, seu flore pleno.

Malos Armeniacas & Persicas, quoniam & hæc in hortis
tantum cultæ sunt, prætereo.

Mandragora. *Mandragoras.*

Marum *Lobelii* v. *Cat. Hisp.*

Marum montanum alterum.

Medica Dioscoridis.

echinata maxima Lusitanica N. D.

echinata max. lappata altera Lus. N. D.

elegans Catalonica N. D.

clypeata N. D.

doliata N. D.

doliata marina minor N. D.

doliata echinata N. D.

doliata echinata minor N. D.

dol. ech. marina minor altera N. D.

compresso folliculo echinato min. N. D.

comp. follic. echinato min. altera. N. D.

Melanthium Bæt. & Lusit. flore amplo N. D.

Melilotus vulgaris Lusitan. *Trevo de cheiro.*

fl. albo valdè odorata N. D.

odora verna & æstiva.

Massiliensis inodora.

Melilotus inodora 1. & 2. Lusit. N. D.

Mentha aquatica Citria seu odorata.

Mercurialis rotundifolia trimestris mas & fæmina. N. D.

Merc. tenuifolia fruticosa perennis N. D.

Millefolium aquaticum umbellatum.

aquaticum secundum C. B.

Muscipula flo. albo v. *Cat. gen.*

Myagrum monospermon.

Thlaspi facie.

B b

Thlaspi

Thlaspi facie alterum.
 Myrrhis Matth. Cord. Gesn. Dod. Lob.
 Myrtus laurea maxima. *Murta*.
 Tarentina baccis albis & nigris.
 sylv. baccis albis & nigris.

Napus.

Napus alter.

Nardus montana.

Nasturtium.

crispum.

latifolium.

Nerium seu Rhododendron.

Nummularia minima Lusitanica.

Ocimum majus.

minimum caryophyllatum.

Ocimastrum Valentinum *Clus. v. Cat. gen.*

Oenanthe bulbosa max. Apii palustris facie.

Apii hortensis folio.

gramineo folio.

folio Millefolii. *Millefolio*.

Olea fativa fructu majori pallido. *Oliveira*.

Ononis non spinosa fl. rubro spicato perennis *N. D.*

non spin. fl. rub. spicat. major annua. *N. D.*

non spin. fl. rub. spic. minor annua. *N. D.*

non spin. fl. luteo perennis *N. D.*

non spin. fl. lut. odorata annua maj. *N. D.*

non spin. fl. lut. rubescente maj. & min. *N. D.*

Ophioglossum pumilum Autumnale Lusit. *N. D.*

Origanum Heracleoticum. *Ouregaon*.

Ornithopodium elegans Lusitanicum.

Orobanche elegantissima verna flo. luteo.

Osyris seu Scoparia.

Pæonia mas.

femina.

Palma minor seu Scopifera, synon. v. in *Cat. gen.*

Paliurus v. *Cat. gen.*

Panax Heracleum. v. *Cat. gen.*

Panax Pastinacæ folio.

Pari-

Parietaria latifolia trimestris *N. D.*

Passerina linaria spicata Lusitan.

Linariae facie *petraea*.

Pepones, cum *hortenses* sint, *prætereo*.

Perfoliata longifolia. quid.

Periclymenum perfoliatum v. *Cat. gen.*

Petroselinum Macedonicum maximum. *Errataon.*

Phaseolus albus vulgaris, & *aliae Phaseolorum species*,
quas pro *Indicis* & *hortensibus* habeo.

Phillyreae species varia, quæ *Gallia Narbonensi* & *Italiae*
communes sunt.

Phlomos Lychnitis.

Pimpinella Agrimonioides Lusitanica *N. D.*

major *segetum hirsuta*.

minor *Lusitanica*.

min. alt. *rotundo splendente folio* *N. D.*

Pisum angulosum maculatum sine membrana *N. D.*

sylv. rotundum maculatum Lusitan. N. D.

Pisum cordatum *Lob. Freirinhas*.

Plantago hirsuta radice reptante.

angustifolia Alopecuroides caulescens, *N. D.*

angustif. tota tomentosa.

coronopoides Lusit. N. D.

aquatica minor globosa *N. D.*

Polium montanum latifolium erectum *N. D.*

mont. latif. erect. alterum *N. D.*

mont. supinum odoratissimum *N. D.*

mont. tenuifolium erectum *N. D.*

Polygala seu Flos Ambarvalis *Lusitan. N. D.*

Polygala Valentina 1. & 3. *Clus. v. Cat. gen.*

Polygonum montanum niveum *Lob. v. Cat. gen. Erva An-
dorinha* *Lusitanis*.

Polygonon Alsines folio. Sapinbo. N. D. *Insigne medica-
mentum ad calculum & arenas renum & vesicæ.*

Polygonon segetum erectum annuum *Lusit. N. D.*

Potamogeton virens spicatum.

Pseudocapsicum Dodonæi. Americanae originis est.

Pseudodictamnium.

Psyllium vulgare. fynon. v. in Cat. gen.

maius *perenne*.

minus.

Ptarmica Lusitan. fl. coeruleo.

Pulegium palustre à vulgari diversum facit.

Ranunculus palustris repens.

supinus echinatus.

segetum folio tenuiter diviso *N. D.*

Rapistrum monospermon non descriptum facit. Oportet ergo ut differat à monospermo nostro.

Rapistrum polyspermon. *N. D.*

polysp. minus Lusitan. *N. D.*

segetum multifido folio *N. D.*

multifido folio alterum palustre *N. D.*

dissecto folio humi strato *N. D.*

rotundifolium palustre monosp. *N. D.*

pumilum vernum *N. D.*

Reseda minima.

Roboris sex species.

Rosarum quas recenset varias species, quia hortenses sunt, omitto.

Rosa humilis alba rubescens valde præcox.

hum. variegata plenissima.

hum. holosericea flo. simplici.

Rubia repens campestris fl. coeruleo.

marina. v. *Cat. gen.*

spicata altera *Clus.* v. eundem.

Ruta montana. q.

Sanamunda 3. *Clus.* v. *Cat. gen.*

pumila Lusitanica. *N. D.*

Satureia montana, *Thymbra* pumila Topiariis celebris.

Serpaon.

Scabiosa vulgaris Lusitana seu Indica 6. *Clusii* Escabrialia.

Scabiosa Hispanica major & minor *Clus.* v. *Cat. Hispan.*

Scabiosa pratensis 1. & 2. Lusit. *N. D.*

petræa tenuifolia fl. albo. *N. D.*

tenuissimè diviso folio 1. perennis. *N. D.*

tenuiff. diviso folio 2. annua *N. D.*

Scolymus Theophrasti alter annuus spinosissimus *N. D.*

Scorpi-

- Scorpioides altera Lusitanica *N. D.*
 Bupleuri folio 2. & 3. Lusitan. *N. D.*
 leguminosa v. *Cat. gen.*
 leguminosa 2. & 3. Lusitan. *N. D.*
- Scorpius 2. Lusitanicus.
- Scorpiogenista 1. vulgare Lusitanorum diaphoreticum.
 Carqueia. N. D.
- Scorpiogenista 2. Lusitan. *Toujo mollar N. D.*
- Scorzonera vulgaris seu Viperaria. *Escorzoneira.*
 plantagineo folio Lusitanica *N. D.*
 angustifolia *N. D.*
 plantagineo folio, caule folioso Lusit. *N. D.*
 multifido folio *N. D.*
- Scrophularia Sambuci folio, fl. rubro, luteo, vario pulchro *N. D.*
- Scroph. Scordii folio, præstans ad ulcera. *N. D.*
 annua Catalonica Montis Serrati *N. D.*
- Sedum majus arborescens legitimum Dioscoridis. *Ensay-aon. v. Cat. Hisp.*
 minus vermiculatum frutex *N. D.*
 minus bulbosum Lusitanicum Touronense. *N. D.*
- Senecio latifolia Salacica. *N. D.*
 latifolia altera Lusitan. *N. D.*
 lanuginosa Lusitana *N. D.*
 multifida flo. amplo Lusit. *N. D.*
- Sesamoides parvum Salmanticum *Clus. v. C. Hisp.*
 parvum flo. luteo *N. D.*
- Seseli Æthiopicum frutex v. *Cat. gen.*
 Æthiopicum herba.
 Creticum seu Tordylium.
 Creticum palustre Lusitan. *N. D.*
- Sesamum.
- Sideritis montana Lusitana. *N. D.*
- Siliqua arbor.
- Sinapi Bursa pastoris folio *Lob.*
- Sisarum.
- Smilax aspera. Legacano. v. *Cat. gen.*
- Solanum hortenense alterum baccis rubris.
 somniaferum.

- Sonchus* lævis flo. & semine *Lactucæ*.
 asper *Africanus*. *N. D.*
 Hieracites major *marinus elegans* *N. D.*
 Hieracites minor *N. D.*
 aquaticus *Translaganus* *N. D.*
Sorbus fructu magno & minore.
Spartium genista fl. luteo & albo.
Spartium genista *monospermon Arbor*, flore albo, fructu
 dulci eduli.
Spergula rorida *Lusitanica* *N. D.*
 hexadactylites erecta *N. D.*
 coronata *N. D.*
 pumila *Promontorii Barbari* *N. D.*
Spinachia. Cum olus *Hispanicum* nostratibus dicatur,
 fortè sponte hîc oritur.
Stachys *Hispanica* *N. D.*
Staphis agria. *Paparas*.
Stoebe *Salmantica* 1, 2, 3. *Clus.*
Stoechas 1. & 2. *Clus. Rosmaninho*. fl. albo. variat.
Stoechas *Rorismarini* folio.
Statice seu *Caryophyllus montanus* latif. flo. globoso
 major. *Cravo Romano*. *N. D.*
Statice seu *Caryophyllus marinus* fruticans, fl. globoso.
Statice seu *Caryophyllus ericetorum* tenuissimo folio,
 flo. globoso. *N. D.*
Suber latifolium & *angustifolium*. *Sovereiro*.
Stramonii species pro exoticis & hortensibus habeo.
Syringa *Italica* flo. albo.

Terebinthus. v. *Cat. gen.*
Teucrium vulgare. v. *Cat. gen.*
 Baticum *Clusii*. *Matabranca*. v. *Cat. gen.*
Thalictrum magnum fl. luteo odorato *N. D.*
Thapsia latifolia major.
 latifolia media 1.
 latif. media 2. seu *Turbith* album.
 latif. min. radice nodosa *Translagana* *N. D.*
 Carotæ folio *Lob.*
 Foeniculato folio *Lob.*
Thlaspi vulgare segetum.
 clypeatum segetum annuum *N. D.*

clypea=

- clypeatum montanum perenne. N. D.
 umbellatum fl. albo & purpureo Lusitan. Admi-
 randum enema. N. D. *Erva cristaleira* Lusitanis.
Thlaspi montanum spicatum fl. luteo.
 toto anni curriculo florens.
Thymum Creticum seu capitatum.
 marinum graveolens. *Serpaon*.
Tithymalus characias 1. Clusii v. *Cat. gen*.
 characias alter Promont. Barbari.
 charac. 3. nemorensis Prom. Magni.
 characias palustris N. D.
 cyparissias 1. & 2. Lusit. N. D.
 platyphyllos palustris N. D.
 Myrsinites Promont. Magni.
Tithymali Helioscopii tenuifolii 7. species N. D.
Trachelium maximum seu *Viola* Mariana.
 majus Hispanicum flo. purpureo.
Tragopogon capite & fl. magno luteo Lusit. N. D.
 caule admodum folioso N. D.
 fl. luteo majus Villæ Viciosæ N. D.
 fl. violaceo segetum annuum N. D.
 fl. purpureo Villæ viciosæ.
 multifidum F. Columnæ.
Tragoriganum. *Erva ursa*.
Tragum Matthiolo Kali spiroso affinis. At nos pro ea-
 dem planta habemus.
Tribulus aquaticus major & minor *Clus.* vide synonyma
 in *Cat. nostro gen*.
Trifolium Asphaltites alterum.
 odoratum annuum Lusit. N. D.
 falcatum Clusii.
 falcatum lanuginosum alterum Lusit. N. D.
 fragiferum æstivum 1, 2, 3. N. D.
 fragif. æstiv. 4. Promont. Magni N. D.
 fragif. 5. perenne pratense.
 fragif. 6. capitulo pediculi experte N. D.
 æstivum, capit. turbinato pediculo orbo. N. D.
 æstivum, rigido hirsuto capite N. D.
 hirsuto stellato capite, sub terram se condente
 pcrenne Lusitan. N. D. An *Trifolium* pumilum flosc.
 longis albis P, B ? B b 4 Trifo-

- Trifolium æstivum echinato capite pratense.
 æstivum montanum Lupulinum, capite erecto,
 elegans Lusitanicum
 biceps æstivum Lusitanicum N. D.
 siliquosum maximum N. D.
 Trifolium tenuifolium.
 Turrita siliquis longissimis Lusitanica N. D.

 Valeriana Indica Clusii flo. albo & rubro. Suspicio
 hanc hortensem esse; quamvis plantas nonnullas Indiis
 cum Europa communes esse agnoscam.
 Valeriana annua rubra Clus.
 Valerianella capitata Lusitan. N. D.
 umbellata Lusitan.
 Verbascum mas 1. & 2. Lusit. N. D.
 laciniatum vulgare Lusitan.
 Salviæ folio, flo. luteo & rubro Lusit. N. D.
 Verbena surrecta altera Bætica N. D.
 Verbenaca supina Clus.
 Vicia vulgaris alba major & minor.
 siliquâ hirsutâ.
 siliqua aspera 1. & 2.
 Africana.
 Syriaca. Has duas peregrinas esse ab epithetis
 suspicio.
 Viola montana inodora.
 pratensis elegans transtagana N. D.
 tricolor hortensis Lusitan.
 tricolor trimestris variorum colorum elegans N. D.
 tricolor vinearum transtagana N. D.
 palustris.
 Virga aurea Lusitanica N. D.
 Urtica annua longius caudata vulgatissima Lusitan. &
 Africana, nondum descript.

 Zizyphus alba. *Arvore do Paraizo.*
 rutila fructu rotundo.
 rutila fructu Olivari forma Algarb.

*Plantarum bulbosarum tuberosarum & grum-
mosarum Index.*

- A**llium sativum magnum.
montanum atro-purpureo flore.
montanum fl. purpureo globato.
mont. fl. cinericeo.
Geranites elegans N. D.
fl. carneo bulbiferum.
- Allii montani variae aliae species.
- Ampeloprasum bulbosum, multiplicibus tunicis tectum
N. D.
- Ampeloprasum seu Schoenoprasum vulgare.
- Ampeloprasum seu Schoenoprasum palustre Touronense
N. D.
- Anemone latifolia fl. duplo & triduplo. *Bugalo.*
Anem. latifol. flo. luteo pleno.
latif. fl. intus luteo, floris rubro & violaceo.
latif. fl. albo duplici & triplici foliorum serie.
latif. fl. intus albo, extrinsecus rubro & violaceo.
- Arifarum latifolium v. *Cat. gen.*
angustifolium.
angustif. aliud Promontorii Magni N. D.
gramineo folio Promont. Magni N. D.
- Arum Ægyptium seu Colocasia. *Inbame.*
Ægyptium alterum, longa radice.
- Asphodelus major ramosus *Clus.*
ramosus minor Autumnalis N. D.
minor *Clus.*
minor fl. albo holosericeo. *Ouuropefo* N. D.
- Colchicum flo. pleno.
Colch. fl. purpureo tessellato.
Colchicum fl. obscure purpureo.
montanum *Clusii.*
pumilum crocifolium fl. purpureo N. D.
- pum.

pum. crocif. flore albo N. D.

Crocus sativus Autumnalis.

montanus Autumn. fl. purpureo-violaceo.

mont. Autumnal. fl. albo.

ericetorum Autumn. fl. albo & vario.

vernus tenuifol. fl. violaceo maj. & min.

vern. tenuifol. fl. albo minor.

brumalis tenuifolius fl. vario caulesc.

brumal. tenuif. fl. variis minor.

Fritillaria angustifolia fl. luteo variegato.

angustif. fl. luteo variegato polyanthes.

latif. pumila, fl. ex atro-luteo virefcente.

Gladiolus segetum utrinque floridus.

montanus minor fl. purpureo.

mont. fl. luteo saturè purpureo, cujus bulbus
proles emittit è longis filis dependentes. N. D.

Gladiolus Byzantinus.

Hyacinthus botryodes major & minor.

comosus vulgaris.

comosus polyanthes transtaganus.

stellaris unifolius, fl. coerule. & albo.

stell. pratens. fl. coeruleo, cinereo & albo.

stell. prat. spicatus, fl. coerule. pulchro & albo.

æstivus *Clusii* fl. coerule. & albo.

obsoletioris coloris *Clus.*

Autumnalis major & minor, fl. albo.

Orientalis seu Asiaticus & fl. albo.

Orientalis seu Asiaticus & brumalis flo. albo.

Hæ duæ species forte exoticæ sunt & in hortis duntaxat
cultæ.

Iris vulgaris Lusitanica. Lirio Cardeno.

vulg. Lusit. fl. albo & vario N. D.

Florentina fl. violaceo & albo odorato.

Dalmatica.

Susiana major flo. pulcherrimo.

bulbosa latif. i. *Clus.*

bulbosa

bulbosa latif. fl. cœruleo, purpurascente & violaceo.
bulbosa latif. fl. cinericeo & albo.
bulb. angustifolia fl. flavo, medio albo.
bulbosa angustifolia fl. cœruleo variegato & albo:
& aliæ triginta bulbosarum in floris colore differen-
tiæ.

Leucoium bulbosum tenuifolium majus & minus.
bulbosum tenuifol. minus flo. rubello.
bulbosum tenuifolium minus Autumnale.

Lilium album vulgare.
cruentum.

Moly Dioscoridis *Clus.*
aliud priori affine amphicarpon.
humile seu Chamæmoly *Col.*
triangulare.
latifolium Hispanicum.

Narcissus flore pleno 1. *Clus.*
medioluteus Narbonensis.
medioluteus Lusitanus.
totus albus polyanthes Lusitan.
totus albus pluribus calicibus.
marinus Autumnalis, Hemerocallis Valentina.
marinus seu Hemerocallis flore rubello.
juncifolius amplo calice major.
juncifolius major & minor. *Junquillo.*
juncifol. Autumn. fl. albo & luteo.

Orchis anthropophora mas & & fœmina.

Orchidum aliarum elegantissimarum 36. species N. D. quæ
propediem annuente Deo prelo subjicientur.

Ornithogalum Arabicum.

spicatum fl. albo vulgare.
spicatum fl. luteo pallescente & viridi. N. D.
spicatum unifolium & trifolium fl. niveo
odorato.
umbellatum montanum flo. amplo.
umbell. mant. valde proliferum 1. 2.

Oro-

Orobanche elegantissima verna flo. luteo, & aliæ sex Orobanches species.

Porrum sylvestre. *Porros bravos.*

sectile seu Cepa Ascalonica *Matth.*

Pleudo-narcissus Hispanicus major *Clus.*

juncifolius major amplo calice.

juncifolius minor 1. & 2.

juncif. minor æstivus Prom. Magni.

Ranunculus graminifolius radice grumosa villosa.

Ran. latifolius rad. grumosa oblonga major.

Ran. latif. radice grumosa rotunda minor.

latif. radice grumosa villosa 1. 2. 3. 4.

multifidus rad. grumosa villosa 1. 2. 3.

radice grumosa Autumnalis Lusitanicus.

rad. grumosa Autumnalis fl. pleno.

Scilla alba. *Cebolla Albarrana.*

Sisyrhynchium fl. violaceo & purpurascente.

fl. maculato cinericeo & albo.

Tulipa pumila latifolia bicolor odorata.

pumila angustifolia bicolor odorata.

Viridarii hujus Auctor si se Chymiatrum professus non fuisset, stylus tamen ipse tumidus & inflatus Chymicum ingenium prodir, cujusmodi sine mixtura aliqua dementiæ inveniri tarum. Sive quòd *filii artis* quos vocant hujusmodi ingenium ad Chymix praxin attulerint, sive quod Metallorum, Mineralium, aliorumque fossilium & rerum etiam sordidarum quas nonnunquam tractant, fumi & vapores mentem turbent, pervertant, & à sede aliquantulum dimoveant.

In hoc Catalogo Plantas exoticas, peregrinas & in hortis duntaxat cultas cum indigenis & spontaneis miscet, nulla distinctionis nota addita, nulla locorum in quibus indigenas invenerit mentione facta. In Botanicorum scriptis non satis versatus videtur: nec enim credibile est in tota Lusitania, nedum intra trigesimum à Tago hinc inde

inde lapidem tot novas & nondum descriptas stirpium species reperiri. Utcunque tamen laude sua defraudandus non est, si vel dimidia pars earum quas pro nondum editis venditat, ejusmodi revera sit: Hoc etenim dato, magna supellectilis Botanicæ accessione Hortos & specierum multitudine Historias nostras ditavit. Ego certè elegans illud *Antirrhini triornithophori* genus videre aveo, de quo in Epistola dedicatoria scribit, quòd ternæ ejus ex luteo purpurascens Aviculæ, suis pediculis insidentes, & itidem tribus angustis foliis separatæ, caulem versus ab imo quasi mox evoluturæ, suspiciunt [in coelum] nec aliud nisi pipire desideratur, &c. necnon triginta sex illas Orchidum elegantissimarum species, quas se prope diem, annuente Deo editurum promittit; quarum nonnullæ corpuscula Apis, Crabronis, Fuci, Oestri, quin & nonnullorum è vaginipennibus Insectorum tam perfectè referunt, ut nihil nisi motus deesse videatur; tandem & *Sisyrhynchium* illud, cujus purpurei flores, potissimum sub Æquinoctio verno, non priùs sese expandunt, quàm Sol Meridianum adæquet, nec ullum unquam inter innumeros dimidiam horam citiùs referatum, aut dimidiam ferius referandum reperies, mox in ejusdem occasu perpetuum marcescunt.

Quamvis autem Libellus isthic multis defectibus nè dicam vitiis laboret, spero tamen fore ut ingeniosus aliquis eruditus & industrius Botanicus, seu ex Indigenis, sive ex peregrinis, ex ejus lectione tot raras & indicatas stirpes in locis suis natalibus florentes contemplandi, aliàsque multas in regione novarum tam feraci adinveniendi cupidine inflammatus, Lusitaniam totam oberret, & diligenter rimetur, quàsque invenerit species accuratè describat, locis etiam adnotatis seminàque collecta aut radices curiosis extraneis & longinquis impertiat ad hortos suos locupletandos & ornandos; ut nos tandem oculos nostros videndi avidos jucundissimo earundem spectaculo satiemus.

Supple-

Supplementum ad Catalogum præcedentem Stippium quarundam rariorum ab eruditissimo Viro totiusque Historiæ naturalis, sed imprimis Rei Botanicae scientissimo D. Gulielmo Sherard, Collegii S. Joannis apud Oxonienses socio in peregrinationibus suis per Galliam & Italiam observatarum; quæ suis locis insertæ fuissent, ni cùm Catalogum componerem D. Sherard in Hibernia abfuisset, nec supellectilem librariam aut Botanicam penes se haberet.

A Rundo vallatoria minor. *The lesser Reed.* Nulam hujus apud Botanicos mentionem factam invenio: videtur tamen differre à vulgari vallatoria. Ad ripas *Arvæ* fluvii propè Genevam, paulò supra pontem; [*two Bow shot.*]

Caryophyllus A'pinus linifolius radice amplissima Hort. Reg. Par. Saxifraga tertia Paravinorum Hort. Pat. Turre. In arenosis ad fluvium *Arvam*, latere Genevam spectante, supra pontem, eodem proximè loco cum superiore. Hanc plantam in summis verticibus montium maximo Carthusianorum cœnobio imminentium inveni [*J. R.*] aut ei certè simillimam.

Cicer sylvestre latifolium triphyllon C. B. synonyma vide in Cat. gen. Ad latera montis Salevæ propè Genevam, ubi & J. Bauhinus invenit.

Cirsium Polypodii folio, flore sulphureo, polycephalon. An Eryththalas Hist. Lugd? In ascensu ad summitatem montis Juræ Dolaz dictam.

Cirsium elatius polycephalon, foliis imis integris, superioribus brevioribus latis profundè laciniatis. Juxta rivulum in ulteriore latere [à Geneva] montis Juræ decurrentem.

currentem. Hujus folia quæ in caule sunt *Marrubii aquatici foliis magis dissectis* folia figurâ & divisurâ suâ quadantenus referunt.

Cirsium majus caule alato polycephalon, capitulis majoribus Personatæ æmulis, An Cirs. Personatæ capitulis C. B. prod? Ad rivulum prædictum.

Cistus Halimi folio secundus *Clus.* Synonyma vide in *Cat. Hispan.* Itinere inter Neapolin & Romam.

Conyza aquatica Asteris flore aureo C. B. disco amplo protuberante seu globoso. Ad Ararem fluvium propè Cabillonum [*Chaalons*]

Daucus five Cicutaria, foliis tenuiter dissectis, in acutum desinentibus, flosculis in umbella laxa purpurascens. In vertice montis cujusdam Sabaudici propè *Bellerive, le pain de Sucre* quantum memini dicti, decem circiter milliaribus à Geneva remoti.

Dens leonis, foliis longis angustis laciniatis glabris. Ad latera montis Salevæ inter saxa.

Dens leonis, foliis longis hirsutis ad margines rariùs dentatis. In prato quodam propè Avenionem.

Dens leonis, foliis extremo subrotundis, floribus aureis. An Hieracium pumilum quartum Fr. Gregorii *Col?*

Eruca Romana five gentilis *J. B.* In arvis propè Romam.

Fungus pulverulentus *Crepitus lupi* dictus calice stellato.

In montibus *Capouladou*, juxta fluvium: Aliis etiam in locis invenit *D. Tournefort.*

Gramen Alopecuroides, spicâ brevi purpuro-coerulea, ex utriculo prodeunte ad muros Noloscomii magni propè Mediolanum.

Gramen spicatum, spicis longis laxis, pappo sericeo canescentibus. An Gr. Indicum Alopecuroides holosericeum majus spica longa pappescente? *Pluck. Phyt.* In muris cujusdam arcis trans *la Bastie* collem propè Genevam in territorio Ducis Sabaudicæ.

† Gramen tremulum minus, locustis parvis triangulis. In pratis, primò in insula Jerseia inveni, deinde in Regno Gallicæ.

† Hieracium latifolium Pannonicum primum *Clus.* In ascensu montis Juræ.

Hieracium

Hieracium ex valle Griesbachiana *J. B.* In valle prope rivulum ubi *Cirsium Bardanæ* capite oritur.

Hieracium montanum *λεπτομακρόφυλλον Col.* montanum hirsutum minus *C. B.* Cum priore.

Hieracium foliis longis angustis acutis, per margines æqualibus, tribus aut quatuor in summo floribus. Juxta Salevam montem in rupium fissuris.

Lysimachia galericulata *Teucris folio.* *Teucrium Astragaloides Hort. Reg. Par.* In colle ex adverso *Carthusianorum* coenobii prope *Divionum [Dijon.]*

Nymphaea alba minor Lob. Ger. Park. J. B. C. B. *Small White Water-Lily.* In lacu *Nantux Sabaudorum.*

Orchis palmata montana latifolia, floribus in spica densis, albis, tantillo lutei admixto. In pascuis montis *Juræ.* Caule est sesquipalmari, foliis latis nervosis ima parte 4 aut 5 cincto, uno vel altero supernè adnascente.

Perfoliata montana latifolia C. B. montana Cam. vid. Hist. nost. Broad-leaved mountain Thozom-wax. In monte *Jura.*

Pilosella erecta foliis longis angustis, floribus parvis numerosis in summis caulibus. An *Pilosella major umbellifera macrocaulos montana Col?* Ad Confluentes *Arvæ & Rhodani* fluviorum.

Thalictrum minus foetidissimum C. B. prod. Ad latera montis *Salevæ.*

† *Thlaspi montanum Globulariæ foliis J. B.* Cum *Hieracio* quarto *Fr. Gregorii Col.*

Veronica mas Pyrenaica folio longiore glabro Schol. Bot. In pascuis montis *Juræ.*

Viola Pyrenaica serotina Teucris folio Schol. Bot. Cum priore.

STIRPIUM ORIENTALIUM.

RARIORUM

CATALOGI TRES.

S

L

A
A

A

A

A

*Stirpium Orientalium rariorum Catalogus,
præsertim Graciæ, & Syriæ provinciis
nascentium.*

A.

A Brotanum fœmina verum Dioscoridis *Zanoni* v. He-
liochoyrysum Abrotani fœminæ facie.

Acaciæ foliis frutex Mesopotamicus *Col. Annot.* in
Res medicas *Novæ Hisp. Recchi.* A caciæ similis Me-
sopotamica, minutissimis foliis, filiqua integra cor-
torta, crassa & obtusa, seu Siliquæ Nabathæa *Breyn.*
Prod. 2. Juxta Tigridem fluvium in Mesopotamia, &
Euphratem in Arabia deserta.

Ageratum Persicum *Breyn. Prod.* 2.

Alhagi Maurorum *Rauwolf.* Genista spartium spinosum
foliis Polygoni *C. B.* Spinosum Syriacum *Park.* Agul &
Alhagi Arabibus, planta spinosa Mannam resipiens *J. B.*
Manna in hac arbuscula invenitur *Tereniabin* aut *Trungi-*
bin Arabibus dicta. In Persia & circa Halepum. *Rauw.*
p. 84. 152. 206.

Alcea Indica parvo flore *C. B.* Ægyptia *Clus.* Ægyptiaca
Ger. emac. Bamia *J. B.* Bamia seu Alcea Ægyptia
Park. parad. Trionum Theophrasti *Rauwolf. Lugd.*
app. Non in Ægypto tantum sed etiam in Syria inve-
nitur. *Rauwolf.* p. 167.

Alcea arborescens Syriaca *C. B.* Althæa arborescens glabra,
Ketmia dicta *J. B.* Althæa frutex 2. *Clus.* Frutex flore
albo vel purpureo *Park. Rauwolf.* p. 54. Circa Tripo-
lin Syriæ observavit.

Androsæmum Constantinopolitanum fore maximo *Wheeler.*
Flore & theca quinque capsulari omnium maximis *Morif.*
Hist. p. 473. Non est hoc Ascyron magno flore *C. B. prod.*
Notæ enim non conveniunt. Circa Constantinopolin,
eundo inde ad Pontum Euxinum, secus vias, & alibi co-
piosè.

4 *Catalogus Stirpium Orientalium rariorum.*

- Anemone maxima Chalcedonica Park.* *Latifolia maxima*
versicolor C. B. *Maxima Chalcedonica polyanthos Ger.*
Latifolia pleno flore I. Clus.
- Anetho similis planta semine lato laciniato J. B.* *Gingidi-*
um folio Foeniculi C. B. *Verum, five Syriacum Park.*
Dioscoridis Rauwolf. Lugd. ap. In monte Libano, locis
 præruptis, p. 234.
- Anonis lutea annua filiqua glabra brevior Moris. Hist.*
Halepo transmisit D. Rob. Huntington.
- Apocynum folio subrotundo C. B.* *Folio rotundo, flore*
ex albo pallescente J. B. *Latifolium non repens Park.*
Periploca latifolia Ger. *Syriæ & calidiorum regionum*
incola esse dicitur.
- Apocynum repens & scandens Rauwolf.* Monte Libano ob-
 servavit Autor Itin. p. 233. *Arbores tegit ut Ephedra.*
- Arbutus (Κβυαεε) Dioscoridis vera Wheeleri.* *Folio non*
ferrato C. B. *Adrachne Park.* *Adrach. Theophrasti J. B.*
Ἀδράχνα Græcis modernis, Bellonius multis locis in sua
peregrinatione observavit. D. Wheelerus in Achaia prope
montem Pentelicum.
- Arisarum angustifolium Wheeleri itiner, p. 309.* *Caule fo-*
liso pingitur. Propè Panthæam inter Amphissam &
Naupactum.
- Aristolochia Maurorum C. B.* *Peregrina Rauwolfii Clus.*
Rhasut & Rumigi à Mauris nominata Rauwolf. Lugd. app.
- Aristolochiis similis Rhasut & Rumigi Maurorum J. B.*
- Aristolochia clematidis Attica, foliis in summo bifidis seu*
crenatis Wheeleri. Θερώνγλο Græcis. In monte Hy-
metto.
- Arum auriculis longis, Ovidne dictum, Chalepense Rauwolf.*
p. 104.
- Aster luteus angustifolius Park. J. B.* *Luteus Linariæ ri-*
gido glabro folio C. B. *6 Clusii Ger.* In monte Olympo
Asiæ. Wheel.
- Astragalus Syriacus hirsutus C. B.* *Syriacus Lob. Ger. Park.*
J. B. *Astrag. Dioscoridis, vulgò Christiana radix Rau-*
wolf. Lugd. app. p. 105. D. Wheelerus Itiner. p. 435.
Astragalum quendam describit & depingit, quem in
Græcia propè Megaram invenit, & argenteum vocat.
Qu. An Syriacus sit?
- Atractylis Cypria Ang. Lugd.* *Purpurea C. B.* *Purpurea*
Cypria Park.

Atractylis

Atractylis vera Antiquarum, cujus caulibus profusis utuntur mulieres Græcæ *D. Covel.* An *Atractylidis* & *Cnico sylvestris* similis *C. B.* Calochierni carduus Cretensibus *J. B.* In Thracia prope Constantinopolin. *V. Hist. nost. p. 304.*
Avellana Byzantina J. B. *Pumila Byzantina Clus. Ger. emac.*
Peregrina humilis C. B. *Nux Avellana Macedonica seu Byzantina Park.*
Azadirachta foliis ramosis majoribus Syriaca, seu vulgaris flore majore cœruleo Breyn. *Azedaraeth arbor, Fraxini folio, flore cœruleo C. B.* *Azadaracheni arbor J. B.* *Azadarach Avicennæ Park.* *Zizipha alba Ger.* Fructus hujus arboris venenatus est, & canes interficit. *Rauwolf. p. 51.* In Syriâ & Palestinâ.

B.

Baccharis Dioscoridis Rauwolfio Park. *Gnaphalio montano affinis Ægyptiaca C. B.* *Rauwolfius* in Syria observavit, & Monte Libano, *Itin. p. 233.*
Balsamum verum J. B. *Genuinum Antiquorum Park.* *Rutæ folio, Syriacum C. B.* *Balsamum Alpini Ger. emac.* *Bellonius & Alpinus Arabiam Fœlicem Balsami locum patrium semper fuisse, nunquam Judæam aut Ægyptum, contendunt.*
Behmen abiad, i. e. Ben album Rauwolfii Park. *Serratulæ affinis capitulo squamoso luteo, ut & flore C. B.* *Ad pedem montis Libani humido & umbroso loco, p. 235.*
Bellis Chalepensis præcox Kusan & Surugen dicta Rauwolf, p. 109.
Borago variegata Cretica Wheel. *Muralis variegata flore odorato Cretica Zanoni.* In monte Hymotto Atticæ. *Folia maculis albis variegata sunt: flores (qui candidi) maculis & striis purpureis cœruleisve.*

C.

Calamus aromaticus Syriacus vel Arabicus suppositivus Park. *Syriacus C. B. prod.* A Paludano ex Ægypto reduce habuit *C. Bauhinus.*
Camarronum Rhafis Rauwolf. v. Tithymalus.
Capparis arborescens fructu Juglandis magnitudine C. B. *Arabica non spinosa Park.* *Cappares arborecentes J. B.* In Arabia observavit *Bellonius, Obs. l. 2. c. 20.*

6 *Catalogus Stirpium Orientalium variorum.*

Castanea equina *Ger. Park.* Equina folio multifido *J. B.*
Folio multifido *C. B.* Constantinopoli & in Creta nasci
fertur : certè Constantinopoli ad nos transmissa est.

Catanance Dioscoridis Rauwolf. est *Plantago* quinque nervia
cum globulis albis pilosis *J. B.* Consule *Breynii Prod. 2.*
in *Plantago*.

Caucalis Syriaca cum maximo semine *J. B.* *Gingidium* la-
tifolium *Ger.* *Latifolium Syriacum Park.* Foliis *Pasti-*
nacæ latifoliæ *C. B.* Semen ex Syria allatum *J. Bauhino*
Rauwolfius communicavit.

Cedrus magna conifera Libani Park. Magna five *Libani*
conifera *J. B.* Conifera folio *Laricis C. B.* In monte
Libani, ubi sponte oritur, 24 tantum arbores supputavit
Rauwolfius, nec plures *Melchior Lussy*, ast *Bellonius*, qui
non multo antea peregrinatus est, circiter 28, qui & in
Amano & *Tauro* montibus se *Cedros* observasse scribit ;
ut *Libano* propriæ & peculiare non sint. *V. Rauwolf.*
p. 229.

Cedrus Lycia retusa dicta & nonnullis *Cedrus Phœnicia*, *Gal-*
liæ etiam & *Germaniæ* communis est. *V. Cat. general.*

Chomæleon niger Dioscoridis Rauwolf. p. 51. 233.

Charnubi Arab. i. e. Siliqua, p. 21. *V. Synonyma in Cat.*
gen.

Chondrilla altera Dioscoridis Rauwolf. p. 106. *Clus.* *Co-*
nyza marina Lugd. C. B. J. B. At nostro iudicio de-
scriptio *Rauwolfii* illi non convenit.

Chondrillæ alterius aliud genus Rauwolf. aliud genus *Diosco-*
ridis Lugd. *Bulbosa*, *Conyza* facie major, foliis latoribus
C. B. *Bulbosa altera latiore folio Park.* Qui præceden-
tem *bulbosam Syriacam angustifoliam* vocat. Utramque
invenit *Rauwolfius* circa *Halepum Syriæ*, alteram in arvis,
alteram in locis saxosis, p. 106.

Chrysocome vera. Dioscoridis Zanon, *Helichrysum Persi-*
eum nonnullis.

Chrysocome Syriaca candidissimis floribus Breyn. cent. In
saxosis *Libani montis Rauwolf.* herbar. ficc. *Gnaphalium*
Rauwolf. p. 232.

Chrysogonum Dioscoridis, Rauwolf. Lugd. app. Quibus-
dam *J. B. Pona Ital.* *Leontopetalo* affinis foliis quernis
C. B. In Syria inter segetes *Rauwolf.* p. 108.

Cistus foliis laurinis. In *Olympo Asiæ* monte observavit
Wheelerus. Invenitur prope *Monspelim* & in *Hispania.*
V. Cat. Gen.

Clinoc-

- Clinopodium* Dioscoridis *Rauwolf.* 52.
Cneorum Matth. In Hymetto Atticæ Monte invenit *Wheelerus.*
Colchicum Fritillaricum Chienſe *Park.* Variegatum *Cornut.*
Convolvulus Hederæ foliis *Rauwolf. Itin.* p. 113. Cæruleus
 Hederaceo anguloſo folio C. B. Trifolius ſ. hederaceus
 pupureus *Park.* Cæruleus *Ger.* Nil Arabum quibuſdam
 ſ. *Convolvulus* cæruleus *J. B.* Halepi in hortis.
Convolvulus pupureus folio ſubrotundo C. B. Cæruleus
 major rotundifolius *Park. parad.* Cæruleus folio ſubro-
 tundo *Ger. emac.* Campanula Indica *J. B.* Ex Syria &
 Orientalibus delatum aiunt.
Convolvulus Sagittariæ foliis flore amplo pupureo *Wheeleri.*
Zacynthi ad puteos bituminofos.
Convolvulus Marinus Soldanellæ affinis *J. B.* Soldanella ma-
 ritima major *Park.* Soldanella vel Braſſica maritima
 major C. B. Braſſicæ maritimæ genus *Rauwolf.* p.
 47. *Lugd. app.* In Syria circa Tripolin. Folia in ſum-
 mo bifida ſunt ſeu crenata.
Convolvulus Arabicus ſeu *Ægyptius Alpin. exot.* 186. *Park.*
 Hujus ſemen ex *Ægypto* accepit *Pr.* *Alpinus* *Convolvuli*
 Arabici nomine.
Conyza Syriæ quibuſdam *J. B.* Minor *Rauwolfi* *Park.*
 Major altera C. B. Circa Tripolin Syriæ obſervavit *Dasy-*
lycus. *Conyza* Dioscoridis *Rauwolf.* p. 48.
Conchorus Plinii C. B. *Conchorus* ſive *Melochia J. B.* In
 hortis Halepi *Rauwolf.* p. 67. v. *Cat. Egypt.*
Coris foliis criſpis montis Olympi Aſiæ *Wheeler* p. 220. An
Hypericum foliis parvis criſpis ſeu ſimulatis *Siculum Hiſt.*
noſt. p. 1018.
Coris legitima *Cluſ.* *Hypericoides* quorundam *J. B.* In Hy-
 metto Atticæ monte *Wheeler.* v. *Cat. Cret.*
Corona Imperialis *Ger. Park.* *Cor. Imper.* ſive *Tufai* aliis
J. B. *Lilium* ſive *Corona* Imperialis C. B. Hujus bulbos
 ex Perſia primò Conſtantinopolin delatos ſibi perſuadet
 Cluſius, quoniam cum eos primùm accipiebat, inter reli-
 quas hæc fuit Inſcriptio, *Tufai fior Perſiano roſſo ò diſcolo-*
rito con la Teſta abafſo, h. e. *Tufai* flos Perſicus ruber aut
 decolor nutante Capite.
Cyanus floridus odoratus *Turcicus* major & minor *Park.*
 Variat floris colore albo.
Cyanus floridus odoratus *Turcicus* latifoliis laciniatus *Hort.*
Parif.

8. *Catalogus Stirpium Orientalium rariorum.*

- Cyanus Orientalis* alter seu Constantinopolitanus flo. fistuloso candicante *Hort. Reg. Par.*
- Cyclamen Antiochenum* autumnale flore purpureo duplici *Park.*
- Cyclamen* Autumnale, folio subrotundo lucido molliore & crenato suave-rubente flore, *Syriacum Hort. Reg. Par.*
- Cyclamen* hyemale, orbiculatis foliis, inferius rubentibus, purpurascente flore, *Coum Herbariorum Ejusdem.*
- Cycl.* hyeme & vere florens, folio anguloso, amplo flore albo, basi purpurea, *Perficum dictum Ejusdem.*
- Cycl.* Autumnale, orbiculato, circumroso folio, subtus rubente, odoratissimo flore *Ejusdem.*
- Cyperus rotundus odoratus Syriacus* major *Park.* *Orientalis* major vel *Babylonius Rauwolf.* Rotundus *orientalis* major *C. B.* Rotundus *Syriacus Ger. emac.* *Syriaca* & *Cretica* rotundior *F. B.* In *Babylonia* circa urbem *Bagadet* muscosis humidis copiosè *Rauwolf.* In *Ægypto*, locis paludosis *Alpin.*
- Cyperus rotundus Orientalis* minor *C. B.* Rotundus odoratus *Syriacus* minor *Park.* Minor *Creticus Ger. emac.* In *Syriæ* montosis udis. Reperitur etiam in *Italia.*
- Cytisus* folio argenteo montis *Olympi Wheeler.*

D.

- Daucus Tertius Dioscoridis* *Rauwolf.* p. 105. Folio *Coriandri*, flore luteo *F. B. v. Cat. Cret.* Halepi in colle quodam juxta fluvium observavit *Rauwolfius.* Radices *Zar-neb Melchi* Turcis dicuntur.
- Dictamnus* *Origani* foliis Montis *Stipuli Flo. Bat. fl.* *Origanum* spicatum montis *Sipyli* foliis glabris *Hist. nost.* In monte *Sipylo* copiosè *Wheeler itin.*
- Draba Chalepensis* repens humilior, foliis minus cinereis & quasi viridibus *Morif. Hist. D. Huntingdon.* Hujus semen circa *Chalepum* collectum misit.

E.

- Ephedra v. Polygonum.*
- Eruca Chalepensis*, caulibus & Siliquis hirsutis, foliis inferioribus maculatis *Morif. hist.* *Chalepo* semen à *D. Huntingdon* transmissum est.
- Eruca Chalepensis*, flore dilutè violaceo, siliquis articulatis *Morif.*

Catalogus Stirpium Orientalium rariorum. 9

Morif. hist. Hæc etiam ab eodem missa, & ejusdem loci est.

Eryngium stellatum capitulis cæruleis Rauwolf. Halepi inter segetes observavit Autor p. 107.

F.

Ficus Cypria J. B. Rauwolf. Sycomorus altera seu *Ficus Cypria Park.* *Ficus folio Sycomori*, fructum non in caudice gerens *C. B.* Circa Tripolin p. 50.

Fustick Wood, *Chrysoxylon Wheeleri.* In rupibus Peloponnesiacis.

G.

Garab. f. Garb. v. Salix.

Genista spinosa floribus rubris Wheeler. In Insula Teno.

Genista-spartium spinosum foliis Polygoni C. B. v. Albagi.

Gingidium folio fœniculi C. B. v. Anetho similis, &c.

Glans unguentaria C. B. *Nux Ben* five *Glans unguentaria Park.* *Nux unguentaria J. B.* *Balanus myrepica Ger.* In Arabia prope *Pharagou* in itinere à Cayro ad montem Sinai *Bellon.*

Gnaphalio affinis Ægyptiaca C. B. *Baccharis Rauwolfii Lugd. app. Clus. Hist.* *Dioscoridis Rauwolfio J. B.* *Gnaphalium foliis Auriculæ subrotundis, flore duplici niveo in Monte Libano observavit Rauwolf, p. 232. v. Chryso come.*

H.

Habhel Affis Tripolitanis, five Granum Altzelem Arabum Rauwolfii p. 55. i. e. Trasi veronensium Lob.

Hacub seu *Silybum* quibusdam *J. B.* Circa Halepum locis asperis. p. 66, 67.

Harmala v. Ruta Syriaca.

Heliochrysum Abrotani fœminæ foliis Boccon. *Abrotanum fœmina verum Dioscoridis Zanoni.* Ex semine Perside alato in horto M. Ducis Etruriæ succrevit.

Helichryson Orientale C. B. *Heliochrysum Orientale, five Amarantus luteus Park. parad.* *Stoechas citrina floris & magnitudine & colore speciosa J. B.* An *Chrysocome vera Dioscoridis Zanoni*? *Helychryson Orientale à Cretica specie diversum nobis esse videtur.* Hesperis

10 *Catalogus Scirpium Orientalium rariorum.*

- Hesperis Syriaca* *J. B.* *Syriaca Camerarii Park.* *Peregrina filiquis articulatis C. B.* *Leucoium Melancholicum quibusdam.* In Syriæ montanis oritur teste Clusio.
- Hieracium echiioides*, capitulis *Cardui benedicti majus*, Arabicum, folio sinuato *Hort. Edinburg.*
- Horminum sativum genuinum Dioscoridis Park.* *Sativum C. B.* *Sylv. foliis purpureis Ger.* Comâ purpureo violacea *J. B.* In Insula Lesena & univ. Græcia.
- Horminum Syriacum C. B. prod. Park.* *Gallitrichum exoticum flore magno albo. J. B.* *Bisermas Camerarii Aman quibusdam.* *Paludanus è Syria redux hujus semen attulit.*
- Horminum Syriacum tomentosum foliis Coronopi five profundè laciniatis Breyn. Prod. 2.* *rarum foliis laciniatis Rauwolf. p. 107.*
- Hyacinthus comosus Byzantinus Clus. Ger. Park.* *Comosus albus Byzantinus C. B.* *Comosus Byzantinus candicans cum staminulis purpureis J. B.*
- Hyacinthus racemosus moschatus C. B.* *Botroides major moschatus, five Muscari flore cinericeo Park.* *Odoratissimus dictus Tibcadi & Muscari J. B.* *Muscari obsoletiore flore Clus.* *Muscari Clusii Ger.* E vicinis Constantinopoli hortis, ultra Bosporum in Asia sitis primum Europæ communicata est *Clus.*
- Hyacinthus Orientalis*, quibusdam Constantinopolitanus *J. B.* *Orientalis C. B.* *cujus duodecim aut tredecim recenset species: plures Parkinsonus.* Alii enim latifolii sunt, alii angustifolii. Horum alii floribus purpureis sunt, alii albis vel exalbidis. Utriusque generis alii polyanthes sunt floribus vel in unum latus propendentibus, vel in omnem partem æqualiter sparsis; alii pauciores produunt flores. Circa Halepum copiosiss. *Rauwolf. p. 109.*
- Hyacinthus stellatus Byzantinus J. B.* *Stell. Byzantin. nigra radice Park.* *St. Byz. nig. rad. flore cæruleo Ger.* *Stellaris obsoletè cæruleus vel major C. B.*
- Hyacinthus Stellatus Byzantinus major flore Boraginis Ger.* *St. Byz. alter f. flore Boraginis Park.* *St. Byz. alter elegantissimus serotinus bullatus J. B.* *Stellaris cæruleus amœnus C. B.*
- Hyacinthus eriophorus Park. parad.* *Bulbus eriophorus Clus. Ger.* *Eriophorus Orientalis C. B.* *Constantinopoli sæpius missus est Clus.*
- Hyacinthus Tripolitanus J. B.* *Exoticus flore Phalangii C. B.*
Florebat

Catalogus Stirpium Orientalium rariorum. II

Florebat Aprili Hepali, ubi observavit Rauwolfius. Hyacinthus Halepi *Ayr* dictus Rauwolfii p. 109.

Hyoscyamus Ægyptius cauliculis spinosissimis *Morif. hist. Ægyptius*, cauliculis spinosis C. B. Peculiaris flore purpurascens J. B. Et Hyoscyamus Syriacus *ejusdem* & Cam. Ex semine Halepo à D. *Huntingdon* missò Morifono ortus est. Eundem observavit etiam Rauwolfius in arvis circa Halepum. p. 111.

Hypericon montis Olympi *Wheeler*. An Ascyron magno flore C. B? In Olympo Asiæ monte.

Hypericum Syriacum *Ger.* Syriacum & Alexandrinum J. B. Folio brevior C. B.

I.

Jacea Babylonica C. B. *prod. Park.* Hujus Folium C. Bauhinus ex horto Contareni habuit.

Jacea maxima *Alpin. exot.* Ex seminibus Hierosolymâ delatis enata est.

Jaceam laciniatam capitulis luteis, & Jaceam capitulis purpurascens Monte Libano observavit *Rauwolf.* p. 231, 232. Vide Catalogum generalem.

Jasminum five Sambac Arabum Alpino J. B. Sambac Arabicum f. Gelseminum Arabicum *Alpin. Ægypt.* Syringa Arabica foliis Mali Aurantii C. B.

Jasminum Persicum v. Syringa.

Iris bulbosa Persica *Park. parad.* Persica variegata præcox *Ferrar. Flor.*

Iris Chalcedonica *Ger.* Chalcedonica f. Sufiana major *Park.* Sufiana flore maximo ex albo nigricante C. B. Latifolia major Sufiana vel Chalcedonica, flore majore variegato *Clusio J. B.* Constantinopoli delata est.

Iris Asiatica cærulea *Polyanthos C. B.* Asiatica cærulea omnium amplissima, Dalmaticæ affinis J. B. Constantinopoli accepit *Clusius*.

Iris Byzantina purpureo-cærulea C. B. Major latifolia Byzantina, Dalmaticæ minori similis J. B. Major Latifolia 18. *Clus.*

Iris Asiatica purpurea C. B. Asiat. purp. major latifolia J. B. Major latif. 5. five Asiatica purp. *Clus.*

Iris Damascena polyanthos C. B. Major latifolia 4. f. Damascena *Clus.* Major latif. five Damascena cærulea J. B.

Iris Tripolitana *Clus.* Tripolitana foliis longissimis, flore aureo

12 *Catalogus Stirpium Orientalium rariorum.*

aureo *J. B.* Media longissimis foliis lutea *C. B.*
Iris tuberosa C. B. Ger. Park. Tuberosa Belgarum *J. B.*
 Ex Arabia & regionibus Orientalibus.

K.

Kali Arabum primum genus *Rauwolf. Lugd. app. C. B.* Juxta Tripolin copiosissimum observavit *Rauwolfius* p. 33.
Kali Arabum secundum genus *Rauwolf. Lugd. app.* *Kali geniculatum* alterum vel minus *C. B.* *Kali Arabum* aliud *J. B.* Circa Tripolin Syriæ *Rauwolf. ibid.*
Kisimesen vel *Kelmesen Bellonio.* *Acacalis* quorundam s. *Kelmesen* foliis *Ceratæ J. B.* Siliquæ Sylvestri similis, an *Dioscoridis Acacalis C. B.* Semen hujus Cayrinæ & *Kisimesen* nomine a Paludano ex Syria reduce accepit *C. Bauhinus.*

L.

Lamium moschatum, foliorum marginibus argentatis *Wheeler.* Circa Panthæum inter Amphissam & Naupaetum in Græcia.
Lapathum Chalepense folio acuto, seminum involucris profundè dentatis *Morif. hist.*
Laserpitium Alpin. exot. Bod. à Stapel. Comm. in Theophr. hist. lib. 6. p. 588. Ex seminibus à Thracia delatis ortum est.
Lathyrus ἀμυρῖνος s. supra infrâque terram siliquas gerens *Morif. hist.* An Araco similis planta ex Hispania missa *Bod. à Stapel.* In Asia Syriaque provenit. Semina ab urbe Chalepo à *D. Roberto Huntingdon* ad Morisonum transmissa fuere.
Laurocerasus Clus. Ger. J. B. Cerasus folio Laurino *C. B.* Cerasus Trapezuntina s. Lauro-cerasus *Park.* A Trapezunte primò in Constantinopoli illata dicitur, inde in Europam.
Leontopetalon Ger. Park. C. B. quorundam *J. B.* Affab Syrorum. Circa Halepum *Rauwolfius* reperit. *D. wheelerus* per totam planitiem Atticam inter Athenas & Hymettum *Rauw. p. 108.*
Lepidium Dioscoridis Zanoni, Planta Persica. Maximum Chalepense, primis foliis minoribus & serratis; secundis majoribus & profundè sinuatis, spissis incanis *Morif. hist.*
 Leucoium

- Leucoium** Alyssoides clypeatum majus *C. B.* Alysson Dioscorides. Ad *Conrongeli* pagum in Bythinia *Wheeler*. Monte Libano *Rauwolf*. p. 231.
- Libanotis** latifolia Aquilegiæ folio *C. B. Park. J. B.* Ligusticum *Rauwolfii* foliis Aquilegiæ *J. B.*
- Lilium** album Syriacum *Rauwolfii J. B.* Album Byzantinum *Clus. Park. Ger.* Album floribus dependentibus seu peregrinum *C. B.* Sultan *Zambach* & Martagon Constantinopolitanum flore albo *Clus. hist.* Halepi locis aquosis.
- Lilium** Byzantinum miniatum *C. B.* Flore miniato nutante, sive Hemerocallis Chalcedonica quibusdam *J. B.* Lil. rubrum Byzantinum s. Martagon Constantinopolitanum *Park.*
- Lilium** Sufianum *Clus.* Persicum *Ger. Park. C. B.* Persicum sive Sufianum *J. B.* Sufianum dictum est, quod Suis Persiæ urbe delatum fuerit.
- Linaria** annua Chalepensis, minor, erecta, flore albo, lineis violaceis notato, calyci ex quinque foliis constanti insidente *Morif. hist.* A D. R. *Huntingdon* semen accepit.
- Linariæ** purpurascens duas species Monte Libano observavit *Rauwolf*. p. 232.
- Lupinus** peregrinus pentaphyllos *C. B.* Arabicus, sive Pentaphyllum peregrinum *Ponæ Ital.* Pentaphyllum peregrinum Siliquosum bivalve minus *Morif. hist.* Ex semine Chalepo Syriæ urbe transmissio *Morifono* enata est.
- Lychnidis** Chalcedonicæ umbellâ *Phlomos* Lychnitis altera Syriaca *Lob.* *Phlomos* Lychnitis Syriaca *Ger.* Verbascum acuto *Salviæ* folio *C. B.* Foliis *Salviæ* tenuifoliæ Syriacum *Park.* Verb. Lychn. Syriacum incanum summitate floris Hierosolymitanæ *J. B.*
- Lychnis** Chalcedonica *Ger. Park.* Hirsuta flore coccineo major *C. B.* Flos Constantinopolitanus miniatus, albus & varius *J. B.*
- Lychnis** flore punctato *Wheeleri.* In Insula Zazyntho.
- Lychnis** Sylvestris hirsuta annua, flore minore carneo *Morif. hist.* Semina à D. *Huntington* Chalepo transmissa sunt.
- Lychnis** Chalepensis annua, foliis parum hirtis & angustis, flosculis carneis, pediculis biuncialibus insistentibus, capsulis fere rotundis *Morif. hist.*
- Lycium** Dioscoridis *Rauwolf.* Buxi foliis angustioribus Syriacum *Breyn. Prod. 2.* Hadhad Arabibus & Zaroa incolis montis Libani. p. 233.
- Lycium** Buxi foliis rotundioribus Syriacum vel Persicum *Breyn. Prod. 2.* quem consule. Lycopsis

14 *Catalogus Stirpium Orientalium rariorum.*

Lycopsis Dioscoridis *Rauwolf.* *Lugd. app.* *Lycopsis* Ægyptiaca C. B. p. 109. Circa Halepum in arvis.

M.

Majorana Syriaca vel Cretica C. B. Marum Syriacum *Ad. Lob. Ger.* Syriacum vel Creticum *Park.*

Malva hortensis seu rosea folio subrotundo caulescens, flore simplici minore luteo-pallido Chalepensis *Morif. hist.*

Marrubium villosum Syriacum seu montis Libani *Breyn. Prod.* 2.

Medica trifolia foliis dissectis *Rauwolf.* p. 107.

Medica filiquis compressis viridibus longitudine & latitudine Siliquarum Senæ *Rauwolf.* ibid.

Medium Dioscoridis *Rauwolfii* *J. B.* *Viola* Mariana lacinia-
tis foliis peregrina C. B. Mariana peregrina *Park. v.* *viola.*

Megasac Arabum, i. e. *Poterium* *Matth. Rau.* 106.

Melantzana vel *Melongena* v. *Solanum* pomiferum.

Melilotus curvis filiquis biuncialibus Syriaca f. Chalepensis major *Morif. hist.* D. *Huntington* misit.

Melilotus Syriaca *Park.* Syriaca odora *Ger.* *Melilotus* corniculis reflexis major C. B. Non Syriaca tantum est, sed & Italica, verum in Syriaca filiqua videtur magis curva falcata *Lob.* *Melilotus* filiculis pendentibus longis, curvis ex eodem centro ortis Germanica seu Italica Syriacæ recta *Morif. hist.* D. *Huntingdon* semen ex Halepo transmisit.

Melilotus lutea minor, floribus & filiculis majoribus, spicatum & raro dispositis, foliis angustioribus, maculis sub exortum notatis *Morif. hist.* Hanc etiam speciem semine à D. *Huntington* accepto debemus.

Melilotus minima Syriaca. *Nephel* five *Naphal* *Iben baithar* & *Malasefæ* *Breyn. prod.* 2.

Melissa Turcica *Ger.* Turcica multis dicta *J. B.* Turcica flore cæruleo & albo *Park.* Peregrina folio oblongo C. B. Ex Moldavia ad nos primum deleta est.

Melissa Moluca lævis five Syriaca lævis *Park. Rauwolf.* p. 49.

Mel. Molucca lævis *Ger.* Molucana odorata C. B. Asiaticæ originis est, Constantinopoli primum delata, unde & nonnullis *Melissa* Constantinopolitana dicitur. Eiusdem loci & originis est *Melissa* Molucca asperior; quæ & in Sicilia spontanea est v. *Cat. Sic.*

Melochia v. *Corchorus* *Plinii.*

Mes five *Meisce* *Avicennæ* v. *Mungo.*

Morgani

Morgfani Syrorum *Rauwolf.* i. e. Capparis Portulacæ folio C. B. Capparis fabago Ger. Fabaginea seu Peplis Luteianorum *J. B.* Fabago f. leguminosa *Park.* Telephium Dioscoridis & Plinii *Col.* Circa Tripolin invenit *Rauwolfius*:

Moffelini seu Muslin panni linei è Goffipii quadam specie facti, & à regione *Moffoli* dicta in Mesopotamia denominati.

Mungo *Col. Clus. J. B. Garc.* Fructus niger Coriandro similis C. B. Mes five Meisce Avicennæ *Rauwolf.* p. 68. Nasci ferunt in Palæstina Halepi observavit *Rauwolfius*; ubi semina Turcis in pretio sunt, & cum Oryza mixta in deliciis habentur.

Myagrum Arabicum Rosa Hierichuntina perperam dictum Zanoni v. Rosa Hierichontica.

Myrtus fructu nigro cæruleo, Sorbi magnitudine eduli *Rauwolf.* p. 65. An Myrtus angustifolia Bætica C. B. *Clus. Hist.*

N.

Narcissus Persicus *Clus. Park. Ger.* Colchicum melino flore C. B.

Nasturtium Babylonium *Lob.* Est Draba umbellata f. Draba major capitulis donata C. B.

Negill *Rauwolf.* Gramini rubro loliaceo affine p. 195. Percori exitiale.

O.

Olea sylv. folio molli incano C. B. Zizyphus Cappadocia quibusdam olea Bohemica *J. B.* Zizyphus alba *Bellon.* Scisefun *Rauwolf.* Monte Libano aliisque Syriæ locis observavit *Rauwolfius* p. 101, 226.

Origanum Smyrnæum *Wheeleri hist. nost.* p. 540. Smyrnæ in monte cui Arx inædificatur copiosè.

Ornithogalum Arabicum *Clus. Park.* Majus Arabicum *Ger. emac.* Umbellatum maximum C. B. Lilium Alexandrinum f. Ornithog. maximum Syriacum *J. B.*

Onobrychis major annua, filiculis articulatis, asperis, clypeatis, undulatis (i. e. antrorsum & retrorsum) junctis, flore purpureo-rubente *Moris. hist.* Ex semine Chalepo à D. *Huntington* transmissio in horto Academico Oxoniensi enata est. P.

P.

- Parma major* C. B. *Palma* DaCtylifera *Jonston*. In Syria frequens.
- Panax Syriacum* Theoph. est *Panax Pastinacæ* folio five *Hera-cleum majus*; in Sicilia nobis observatum. v. *Cat. gen.*
- Papaver Corniculatum* flore sanguineo *Wheeleri*. In Attica circa Hymettum.
- Persea* C. B. *J. B.* Arbor *Ger.* Arbor Clusii *Park*. In Persia oriri dicitur & venenosa ibi esse, cum in Ægypto nata innocens sit.
- Periploca latifolia* *Wheeleri* itin. p. 223. Ad vias publicas prope Prusiam Bythinæ urbem.
- Petromarula* Cretica in Monte Parnasso & rupium fissuris exit *Wheeler*.
- Phaseolus Turcicus* flore flavo *Rauwolf*.
p. 49.
- Planta lactaria* Xabra & Camarrorum Rhafis &c. v. *Tithymalus*.
- Pistacea* *Ger. J. B.* *Nux Pistacea* *Park*. *Pistacea Peregrina* fructu racemoso, five *Terebinthus Indica* Theophrasti C. B. Multis Syriæ locis abundat, ut circa *Sermin* urbem, inter Tripolin & Halepum, ubi integræ earum Sylvæ sunt necnon circa Tripolin ipsam p. 59, & 64.
- Polium Gnaphaloides* *Alpin. exor. Park*. *Wheelerus* in Monte Parnasso observavit, unde Plantam à Gnaphalio maritimo vulgari distinctam esse, contra quam aliquando opinati sumus, verisimile est.
- Polygonum bacciferum scandens* C. B. *Ephedra* five *Anabasis Bellonii* *Park*. Ad pedes montis Olympi & in monte Hæmo. item circa Tripolin Syriæ *Rauwolf*. p. 49.
- Polygonum maximum*, longissimis cauliculis & foliis *Morishist*. Circa Halepum Syriæ urbem invenitur.
- Poterium Matth.* i. e. *Tragacanthæ* affinis lanuginosa five *Poterium* C. B. Circa Halepum observavit *Rauwolf*. p. 107. v. *Cat. Hispan.*
- Prunella Spinosa* *Wheeler*. In Atticæ monte Hymetto.
- Pseudo dictamnus acetabulis* Moluccæ C. B. alter Theophrasti Ponæ *Park*. In Cithæra Insula *Wheeler*.
- Pulsatilla rubra* *Ger. J. B.* Flore rubro *Park*. Flore rubro obtuso C. B. Ex Halepo habuit *Lobelius*.

Q.

Quadrifolium annuum Perficuta Zanoni.

R.

Ranunculus Asiaticus grumosa Radice r. *Clus.* Tripolitanus
Ger. Tripolitanus flore Phœnicio *J. B.* Asiaticus sive
Tripolitanus flore rubro *Park.* Grumosa radice, flore
Phœniceo minimo simplici *C. B.*

Ranunculi Asiatici plurimæ seu species, seu varietates in hor-
tis aluntur, quas omnes recensere nimis Longum foret.
Consultantur *Clusius*, *C. Bauhinus*, Hortus Regius Parisi-
ensis, aliiq̃ue.

Raphanistrum monospermon maximum Chalepense, flore
luteo, capsula rotunda striata. *Morif. Hist.*

Rhamnus spinis oblongis, flore candicante *C. B.* Hauset &
Hauségi sive Rhamnus primus *Rauwolf.* Circa Tripolin.

Rhaponticum Thracicum s. Hippolapathum maximum ro-
tundifolium exoticum, Rhabarbarum verum nonnullis
falsò creditum. In Rhodopè Thraciæ monte *Alpin.*

Ribes verum Arabum *J. B.* Arabum, foliis Petasitidis *C. B.*
Lapathum rotundifolium montis Libani semine maximo
Breyn. prod. 2. An Ribes Bellonii de Coniferis? *Rauwolf-*
fius in monte Libano observavit, & figuram ejus exhibuit.
p. 220, 230, 231.

Rosa Hierichontea vulgo dicta *C. B. Park.* Thlaspi Rosa
de Hiericho dictum *Morif. Hist.* Myagrū Arabicum
Rosa Hierichuntina perperam dictum *Zanoni.* Circa
Hiericho nusquam reperitur, sed in Arabia deserta ad li-
tora maris in sabulo. *Bellon.*

Rosæ Hierachontæ altera species sylvestris *C. B. Park.* Mya-
grum Syriacum semine spinoso *Zanoni.* In Syriæ tectis
& rudibus invenit *Rauwolfius.*

Ruta quæ dici solet Harmala *J. B.* Sylvestris Syriaca sive
Harmala *Park.* Sylv. flore magno *C. B.*

Melanthium Syriacum minus frutescens latifolium; Rutæ
flore, fructu tricapsulari *Breyn. Prod. 2.*

Ruta Chalepensis tenuifolia, florum petalis villis scatentibus
Morif. Hist. Cat. Hort. Lugd. Bat.

S.

- Salix Arabica* folio *Atriplicis* C. B. *Humilis Arabica* folio *Atriplicis* Park. *Garab Maurorum*, *Salicis* genus J. B. *Garab Maurorum* *Rauwolf*. *Lugd. app.* p. 101. *Garb Itinerar.* *Rauwolf*. p. 159.
- Salix Syriaca* folio oleagineo argenteo C. B. *Ægyptiaca* & *Syriaca* Park. *Salsaf Syrorum*, *Salicis* species J. B. Circa *Halepum*.
- Salvia Syriaca* *Cisti* fæminæ foliis, acetabulis *moluccæ Breyn. cent.* Hujus meminit *Rauwolfius* in *Hodœporico* p. 108.
- Satureia frutescens Arabica* folio fimbriato hirsuto *Breyn. prod.* 2. *Sathar Arabum* *Rauwolfii*, *Hyssopum montanum Cilicium* quibusdam J. B. *Hyssopus montana angustifolia aspera* C. B. *Montana* vel de *Ciliffa* Park.
- Scabiosa argentea petræa.* In isthmo *Corinthiaco*.
- Scabiosa argentea minor montis Sipyli* *Wheeleri itin.* p. 239.
- Scammonia Syriaca* C. B. *Syriaca legitima* Park. *Syriaca flore majore Convolvuli* J. B. *Scammonium Syriacum Ger.* In calidis pingui solo exit ut in *Asia* & *Syria*, & *Belonio* teste etiam in *Creta*.
- Schamuth Arabum* seu *Schack* *Rauwolf*. p. 103, 152. C. *Bauhino Acacia* *Ægyptiaca* habetur: nobis tamen aliter videtur, ut ex filiquæ descriptione apparet.
- Scorzonera radice rotunda* *Wheeleri.* *Galacorta* Græcis modernis. In *Attica* circa *Hymettum* montem.
- Scorzonera foliis fistulosis, Galacorta* etiam dicta *Wheeler.* Cum priore.
- Scorzonera Orientalis Vestling* notis in *Prosp. Alpin.* de *Plant. Egypt.* In *Palæstina* & finitimis *Ægypti.* An *Scorzonera Chalepensis* flore purpureo *Rauwolf?* p. 104. Alteram *Scorzoneram* floribus luteis monte *Libano* observavit *Rauwolf.* p. 230.
- Scordium lanuginosum alterum verticillatum* C. B. *Scordotis tomentosa Cretica* J. B. Prope *Mandragorui* vicum in *Phrygia* observavit D. *Wheelerus*.
- Sebestena domestica* an *ὀμωαξις* *Athenæo* C. B. *Myxa* five *Sebesten* J. B. *Myxos* five *Sebesten* Park. *Sebestena, Myxa* f. *Myxara* Ger. In *Asia* & *Ægypto* *Rau.* p. 21.
- Secacul Arabum.* v. *Sisarum*.
- Secudes Arabum.* v. *Stœchadi ferratæ* affinis.

Seife-

Seisefun *Rauwolf.* Halepi in locis humidis & sepibus frequens, est Olea Bohemica *Matth. Rauwolf.* p. 101.

Sepha, seu Persea Arbor Venenata *Rauwolf.* p. 197.

Sideritis Persica odorata *Zanoni.* An Herba venti Monspelienfium?

Sisarium Syriacum C. B. Alterum Syriacum *Park.* Secacul Arabum & Mauritanorum, sive Paltinaca Syriaca *Rauwolf.* *Lugd. app.* *J. B. Rau.* p. 66.

Sisyrinchium Persianum C. B. Flos Perficus Sisyrinchio congener *Clus. Hist.*

Sisyrinchium Chalepense *Tharafalis.* dictum *Rauwolf.* p. 104.

Solanum pomiferum fructu incurvo C. B. *J. B.* Melantzana Arabum *Rauwolfii* *Lugd. app.* Halepi. p. 66.

Solanum pomiferum fructu spinoso *J. B.* Melantzana nigra *Rauwolf.* *Lugd. app.*

Sorgi album, Milium Indicum *J. B.* Milium Arundinaceum semine plano & albo C. B. Dora *Rauwolf.* p. 171. In Arabiâ circa Anam.

Spartium alterum monospermon, semine reni simili C. B. Secundum Hispanicum *Clus.* Prope Thyatiram in Asia invenit *D. Wheelerus.* v. *Cat. Hispan.*

Speculum Veneris Thracicum flore amplissimo. Inter segetes propè Constantinopolin invenit *D. Covel SS. Theol. Doctor,* & Collegii Christi in Cantabrigia Præses dignissimus.

Stachys viscosa flore luteo *Wheeleri.* In monte Parnasso.

Stœchadi ferratæ affinis C. B. Tragium alterum Dioscoridis quibusdam, folio Trichomanis *J. B.* Secudes & Sucudus Avicennæ *Rauwolf.* p. 112. *Lugd. app.*

Sycomorus *J. B. Fer.* Sycomorus sive Ficus Ægyptia *Park.*

• Ficus folio Mori, fructum in caudice ferens C. B. In Syria & Palæstina non minùs frequens est quàm in Ægypto. p. 50, 51.

Syringa Persica sive Lilac Persicum incisifoliis. Jasminum Persicum dictum *Park.* Agem Lilag Persarum, s. Lilac incisifolio *Cornuto* Ligustrum foliis laciniatis. C. B. Syringa Persica purpurea duplex, foliis laciniatis, & foliis integris.

T.

Terebinthus Indica major fructu rotundo *J. B.* *Peregrina*, fructu majore. *Pistaciis* simili eduli *C. B.* *latifolia* *Ger. Park.* *Indica* prior *Theophrasti*, major *Rauwolf. Lugd. app.*

Terebinthus Indica, fructu parvo ad cœruleum accedente *J. B.* *Peregrina* fructu minore cœruleo & eduli *C. B.* Hujus fructus *Botn Soagier* illius *Botn quibir* Arabibus dicitur. *Rauwolf.* p. 193. 205. In Persia Mesopotamia & Armenia.

Tereniabin Mannæ genus *v. Alhagi.* *Rauw.* p. 85.

Tharafalis v. Sityrhynchium.

Thlaspi fruticosum *Perficum* foliis *Keiri Zanoni.* Fruticolum *Leueoii* folio *C. B. Park.* *Latifolium* platy carpon *Leucoii* foliis *P. Boccone.*

Thlaspi verum *Dioscoridis* f. *Perficum Zanoni.* *Thlaspi Alexandrinum* *C. B. Park.* *Alexandrinum* *Cortusi* *Joh. Bauhini J. B.*

Thymus verus *Dioscoridis*, *Hasce Arabum Rauwolf.* p. 52.

Tithymalus spinosus *Creticus Alpin.* *Maritimus spinosus* *C. B. Marit. Creticus spinosus Park.* In Græcia, plurimis in locis.

Tithymalus (vel *Tithymalo* affinis) *aphyllos* dictus major *Indicus*, *latifolius*, flore sanguineo *aviculæ capitulum* representante *Breyn.* An *Planta lactaria*, *Xabra* & *Camarorum Rhafis Rauwolf.* & *C. B. pin.*

Tragacantha humilior floribus luteis *C. B. Syriaca flavescens* *Park. Trag. Rauwolfii J. B.* In monte Libano. *Rauwolf.* p. 230.

Tragacantha Syriaca purpurascens *Park. Tertia Rauwolfii.* In eodem monte.

Tragium alterum *Dioscoridis Rauwolf. v. Stœchadi ferratæ* affinis.

Trionum Theophrasti Rauw. Lugd. app. Est *Alcea Indica* parvo flore *C. B. i. e. Bamia. v. Alcea.*

Trunschibil Mannæ genus *Rauw.* p. 84. *v. Alhagi.*

Tulipa Persica *Park. Variegata Persica C. B. Persica præcox Clus. cur. post.*

Tulipam omne genus colorum circa *Halepum* observavit *Rauwolfius* p. 109.

V.

Verbascum subrotundo Salviæ folio Syriacum C. B. Salvifolium exoticum cistoides Park. Sylvestre Salvifolium exoticum, folio rotundiore J. B.

Viola Mariana laciniatis foliis peregrina C. B. Medium Dioscor. & Mindium Rhosis Rauwolf. p. 232. Monte Libano observavit Rauwolf. Trachelii seu Campanulæ species est.

Vitex trifolia minor C. B. Agni casti species multò minor cæteris, tribus tantùm firmis foliis donata Rauwolf. p. 153.

Z.

Zarneb & Zarnabum Arabum v. Salix Saffaf.

Zarneb melchi v. Daucus tertius Dioscoridis.

Zaroa. v. Lycium.

Stirpium Ægyptiacorum Catalogus.

A.

- A** bdellavi v. Melo Ægyptius.
 Abelmosch v. Alcea Ægyptiaca villosa C. B.
 Abrus v. Phaseolus Indicus ruber *Bontii*.
 Absynthium Santonicum Ægyptiacum *Park. C. B.* Ægyptium quibusdam *J. B.* Abrotani foeminae species secunda *Zanoni*.
 Absus seu Lotus Ægyptiaca *Park.* Absus *Alpin. Ægypt. Vestling.* Loto affinis Ægyptiaca C. B.
 Abutilon Avicennae *Pona Ital. Alpin.* Est Abelmosch seu Alcea Indica Moschata.
 Acacalis est Kismesen *Bellon. v. Cat. Orient.*
 Acacia vera *J. B.* Vera five Spina Ægyptiaca *Park.* Dioscoridis *Ger.* Folii scorpioidis leguminosae C. B.
 Achaovan *Alpin. Æg.* Matricaria inodora C. B. *Park.* Parthenium inodorum five Achaovan Ægyptiorum *J. B.*
 Agihalid Ægyptiaca Lycio affinis *Park.* Ægyptium folio buxi, an Lycium? *J. B.* Lycio affinis Ægyptiaca C. B. Uzeg Alpini affinis & similis est, si non eadem.
 Alcanna v. Ligustrum Orientale.
 Alcea Ægyptia villosa C. B. Ægyptia moschata *Park.* Belmuscus Ægyptia *Honor. Bell. J. B.* Ab-el-mosch five Mosch Arabum *Vestling.*
 Alchimelech Ægyptiorum v. Melilotus Ægyptiaca.¹
 Amomum Plinii *Ger.* Solanum fruticosum Americanum, dictum Amomum Plinii *Park.* Fruticosum bacciferum C. B. Strychnodendros *J. B.* In Ægypto passim *Vestling.*
 Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgo colocasia C. B. Ægypt. rotunda & longa radice, vulgo Colocasia dicta *Park.* Colocasia *Clus. J. B.* Ægyptiaca *Ger.*

B.

- Balsamum verum antiquorum nec Ægypti nec Judææ indigena est, sed Arabiæ Fælicis v. Cat. Oriental.
- Bammia *J. B.* Seu Alcea Ægyptiaca *Park. Parad.* Alcea Ægyptiaca *Ger. emac.* Indica parvo flore C. B. In Ægypto frequentissima.
- Ban vel Bon arbor *J. B.* Item Buna, Bunnū & Bunchos Arabum *ejusdem.* Bon arbor cum fructu suo Buna *Park.* Euonymo similis Ægyptiaca, fructu baccis Lauri simili C. B. Malè Ægyptiacam vocat, neque enim spontanea, neque culta in Ægypto invenitur sed in Arabia Fælice tantum Bunnū Rauwolfii, Buna ex qua in Alexandria fit potio [Coffee dicta.]
- Ban seu Calaf *Alpin.* Saffas Syrorum Rauwolf vel eadem est, vel ei valde affinis. v. Cat. Orient.
- Baobab *Alpino,* Baohab five Abavus *Clus. J. B.* Abavo arbor radice tuberosa C. B. Abavi Æthiopicus fructus bello *J. B.* Guanabanus Scaligeri huic Eadem arbor esse videtur, Æthiopiæ natales debet, Ægypto advena est.
- Beidelfar Alpini, seu Apocynum Syriacum *J. B.* Apocynum Syriacum *Clusii Ger. emac.* Lapathum Ægyptiacum lactescens filiqua Asclepiadis C. B. Paul. Hermannus in *Cat. Hort. Leyd.* Plantam hanc ab Apocyno majori recto Syriaco Cornuti. Specie diversam facit; quo cum consentit Commelinus in *Cat. Hort. Amstel.* Jac. Breynius in *Prod.* 2. Vellingum reprehendit quod pro Apocyno hoc Apocynum majus Syriacum rectum Cornuti posuerit. Verum in titulo Apocyni hujus non omnino consentit cum Hermanno & Commelino: Siquidem hi, ut & Scholæ Botaniæ Tournefortii, Apocynum latifolium Ægyptiacum, incanum, erectum, floribus spicatis maximis pallidè violaceis, filiquis folliculatis rugosis hoc vocant: Breynius autem, Apocynum erectum majus latifolium Ægyptiacum flore luteo spicato. Apocynum autem illud latifolium &c. floribus pallidè violaceis &c. *Hermannus* & aliorum. Indicam & distinctam plantam facit, titulo Apocyni erecti majoris latifolii Indici flore concavo amplo carneo suave-rubente & cum antecedenti i. e. Ægyptiaco non confundendam monet.
- Brassica spinosa C. B. Ægyptiaca *Alpin. exot. Park.* In Ægypto, Æthiopia & Syria.

C.

Caova *Alpin.* i. e. Coffee Potio.

Capparis non spinosa fructu majore C. B. *Park.* Alpinus Cappares Alexandria majores quàm alibi inveniantur provenire scribit.

Carob s. Carub i. e. Siliqua dulcis in Syria & Palæstina, & circa Hierosolymam multò frequentior est quàm in Ægypto.

Cassab & Darira *Alp. exot.* Lyfimachia lutea Ægyptiaca *Hist. nost.* p. 1022. In Ægypto, locis humidis, inque judæa circa lacum Gennefareth, & multis Syriæ in locis.

Cassia fistula Alexandrina C. B. Fistula *Ger.* Purgatrix *J. B.* Solutiva vulgaris *Park.* In Ægypto aliisque regionibus calidioribus.

Chate *Alpin.* Cucumis Ægyptius Chate *J. B.* Cucumis Ægyptius rotundifolius C. B.

Caucalis Daucoides Tingitana *Morif. præl.*

Chamædrys arborea Ægyptiaca C. B. Arborea in Insula Corcyra *Alpin.* Nescio cur C. Bauhinus hanc Plantam Ægyptiacam denominet, cùm Alpinus in Ægypto nasci non affirmet, sed in Corcyra insula.

Colocasia v. Arum Ægyptiacum.

Convolvulus Ægyptiacus quinquefolius C. Bauhini *J. B.* Foliis laciniatis, vel quinquefolius C. B. Major Arabicus five Ægyptius *Park.* Ægyptius *Veslingii* qui vix dari cultiorem in Ægypto hortum scribit cui non ornamentum commodet.

Cyperus rotundus Orientalis major in Ægypto etiam copiosè provenit. v. Cat. Orient.

Cyprus i. e. Alcanna seu Elhanne v. Ligustrum Orientale.

D.

Datura v. Stramonium.

E.

Elhanne v. Ligustrum Orientale.

F.

F.

Faba Ægyptia *Bod. à Stapel.* *Faba Ægyptiaca* Dioscoridis affinis *C. B.* Fructus valde elegans, *Faba* fortè Ægypt. Diosc. *J. B.* Alpinus *Fabam Ægyptiam* pro *Colocasia* habet. Nascitur in paludosis & ad fluviorum ripas in India Orientali, an in Ægypto nescio. *Nymphææ* speciem faciunt qui de ea scripserunt.

Felfel-tavil seu *Piper longum Ægyptium* Alpini & *Veslingii* qui in maritimis *Africæ* locis plantam satis frequentem esse ait.

Ferula Tingitana, folio latissimo lucido *Hort. Edinburgh.*

Ficus Ægyptia seu *Sycomorus* *Park.* Folio *Mori* fructum in caudice ferens *C. B.* *Sycomorus* *Ger. J. B.* In Ægypto & Syria copiosè.

G.

Gossipium arboreum caule lævi *C. B.* *Xylon arboreum* *J. B. Park.* In Ægypto invenitur.

Gramen crucis sive *Neiem.* el. salib. Alpini *J. B. Bont.* *dactylon Ægyptiacum* *C. B. Park.* In Ægypto frequens.

Gramen Stellatum Ægyptium *Veslingii.* *Dactylon Ægypt.* *Park.* Qui in præcedentis descriptione hujus quoque meminit. Circa *Heracleam* seu *Rossetum* oppidum.

H.

Hyacinthus Mauritanicus *Chuf. Hist. ap. v.* Oblongo *Flore fusco* *C. B.* Ex ea *Mauritanicæ* parte ubi urbes *Fessa* & *Marochum* sita sunt delatus est.

Hyoscyamus Ægyptius *Park.* Rubello flore *Ger.* Peculiaris flore purpurascens *J. B.* Et *Hyos. Syriacus ejusdem.* Cauliculis spinosissimis *Ægyptiacus* *C. B.* Et rubello flore *ejusdem.* *Hyoscyamus albus Ægyptius* *Alpin. Æg. & Exot. Vesling.* Juxta *Pyramides Ægyptias* majores.

K.

Kali Ægyptiacum foliis valde longis hirsutis *C. B.* An *Psyllium* minus quod *Gottne* rubri & *Botrio* rubro nomine accepit *C. Bauhinus?* *Kali* tertia species *Alpini Æg.*

L.

L.

Lablab seu Leblab Alpini v. Phaeolus.

Lathyrus Tingitanus flore amplo ruberrimo. Semina hujus Plantæ, ut & aliarum rariarum D. Alex. Balam è Tingi urbe Africæ in Angliam primus detulit.

Libanotis cachryophoros semine fulcato lævi *Morif. prælud.*

E Mauritania Tingitana attulit D. Alex. Balam.

Ligustrum Orientale five Cyprus Dioscoridis & Plinii *Park.*

Ligustrum Ægyptiacum latifolium & angustifolium C. B. Alcanna & Elhanna Arabum, nunc Græcis *Schenna Rau-wolfii.*

Lotus Ægyptia *Alpin. exot.* Nymphæa seu Neufar Ægyptium *Vesling.* Nymphæa alba major Ægyptiaca five Lotus Ægyptia *Park.* In aquis.

Luffa Arabum seu Cucumis Ægyptius reticulatus *Vesling.* In horto Arabis cujusdam prope Cayrum vidit *Veslingius.*

Lupinus Ægyptius Sylvestris *Veslingii v. Cat. Oriental.* In villarum sepibus prope Heracleam seu Rossetum.

Lycium Indicum creditum Alpino *Park.* Indicum Alpino putatum *J. B.* Indicum alterum (*Uzeg*) C. B. Supra ripas rami Nili Calig vocati 10. ab Alexandria m. p. invenit *Alpinus.*

Lycopsis Ægyptiaca *Park. v. Cat. Orient.*

M.

Marum Ægyptiorum *Alpin. exot. l. 2. c. 10.* Ægyptiorum Alpino *Park. app. Vesling.*

Musa arbor *J. B. Park.* Musa Serapionis *Ger.* Mauz Musa *Alpin.* Palma humilis longis latisque foliis C. B. In Ægypto frequens.

Melilotus Ægyptiaca *Park.* Ægyptia Alchimelech vocata *J. B.* Corniculis reflexis minor C. B.

Melo Ægyptius C. B. Melones Abdellavi Ægyptii *J. B.*

Melochia *Alpini.* Corchorus *Ger.* Plinii C. B. Cor five Melochia *J. B. Park.* Olus Judaicum nonnullis. In cibis nihil est ea Ægyptiis familiarius aut gratius *Alp.*

Moly Africanum umbella purpurascente C. B. *prod.* Africum umbella purpurascente *Park.*

N.

N.

Nabca folio Rhamni vel Jujubæ *J. B.* Nabca Paliurus Athenæi credita *Alpin.* Oenoplia spinosa & non spinosa *C. B.* *Ger. emac. app.* Spinosa & non spinosa, five Napeca, five Zizyhus alba *Park.* In Ægypto folia per totum annum retinet, at in Creta, observante Bello per hyemem amittit. Ægyptus, Syria & Armenia hac arbore abundant *Bellon.* Nymphæa seu Nuphar *Vest. v.* Lotus.

O.

Ocimum Ægyptium Alpini *Riban.* dictum *Herm. Hort. Acad. Leyd.*

Oenoplia *v.* Nabca.

Oenanthe altera minor Africana *Park.* Item tenuifolia altera Africana *eiusdem* p. 895. E Barbaria Africæ regione attulit *Gulielmus Boelius.*

P.

Paliurus Athenæi Alpino *v.* Nabca.

Palma *Ger. C. B.* vulgaris *Park.* Major *C. B.* Dactylifera major vulgaris *Fonst.* In Ægypto & Syria.

Papyrus Nilotica *Ger. J. B.* Antiquorum Nilotica *Park.* Nilotica seu Ægyptiaca *C. B.* Provenit etiam in Sicilia palustribus *v. Cat.* Sicularum rariorum *P. Boccone.*

Phaseolus indicus ruber *Bontii.* Pisum Americanum coecineum, aliis abrus. *J. B.* Abrus. Alpini *de Plant. Ægypt.* Glyzyrrhiza Indica vulgò.

Phaseolus Lablab Alpini *J. B.*

Phaseolus Ægyptiacus nigro semine *C. B.*

Polium montanum pumilum tenuifolium Africum *Park.* A Guil. Boelio circa Tunisium urbem collectum est.

R.

Ruta Sylvestris quæ dici solet Harmala *J. B.* Juxta Alexandriam *v. Cat.* Orient.

S.

- Sabina Ægyptia Lob. est Abrotanum foemina Sabinæ folio C. B.
- Sebesten v. Cat. Orient. Non enim in Ægypto tantum sed & in Asia provenit.
- Secamone Alpin. Ægypt. Apocynum angusto Salicis folio C. B. Apocyno affinis Secamone flore albo J. B. An Apocyni Secundi species altera Chuf?
- Sena J. B. Ger. Alexandrina Park. Alexandrina five foliis acutis C. B. In Syria, Persia, Arabia nasci aiunt, unde Alexandriam defertur.
- Sesamum J. B. C. B. Park. & aliorum. Myagrum Ægyptiacum Zonani.
- Sesban Alpini Ægypt. Sesban five Securidaca Ægyptia articulata Park. Galega Ægyptiaca filiquis articulatis C. B.
- Sinapi maritimum Ægyptiacum Alpin. exot. l. 2. c. 19. Ex feminibus Ægypto delatis enata est.
- Sonchus fruticulosus Africanus petraeus spinosus Park. In petrosis circa Tunis & Sapphi à Boelio inventus & ad Parkinsonum delatus est.
- Sophera Alpini & Belli J. B. Galegæ affinis Sophera dicta C. B. Sophera seu securidaca Ægyptiaca villosa Park. Hoxocoquamoelit Cam. hort.
- Stramonium minus flore geminato purpurante Park. Fructu rotundo, foliis per ambitum Xanthii modo incisus Col.
- Solanum foetidum pomo spinoso rotundo, semine pallido C. B. Datura Ægyptia Vesting. Contarena Alpin. exot.
- Stratiotes Ægyptia J. B. aquatica vera Dioscoridis & Ægyptiaca Park. Lenticula palustris Ægyptiaca, five Stratiotes aquatica foliis Sedo majore latioribus C. B. Aquis innatat sine radice, ut aiunt.
- Stratiotes Ægyptia Dioscoridis Vesting. Hæc & superior vel Nilo, vel fossis inde deductis supernatat, nec radice in terram demissa firmatur, sed huc illuc fluitat.
- Sycomorus v. Ficus.

T.

Tamarindus *Ger. Park. J. B.* Siliqua Arabica quæ **Tamarindus** *C. B.* Ex Æthiopia in Arabiam & Ægyptum delatam nonnulli volunt.

Tamariscus Ægyptia gallifera *J. B.* **Tamaria** Ægyptia arbor *C. B.* Ægyptia gallas ferens *Park.* In Ægypto locis humidis secus flumina oritur, non raro etiam aridis & sabulosis. *Bellon.*

Thlaspi Alexandrinum *C. B. Park.* Alexandrinum **Cortusi** *J. B.* Verum **Dioscoridis Zanonis**.

U.

Uzeg arbor v. **Lycium Indicum**.

Z.

Zatar-hendi **Origanum Indicum** *Alpini & Vellingii* **Origano** congener **Zatar-hendi** *C. B.* **Zatarendi** herba *J. B.* Planta Ægyptiaca non est, sed ex India illuc deportata, ut nomen arguit. Cæterum. **Zatarendi** *Alpin.*

Stirpium Creticorum rariorum Catalogus.

A.

A Bellicea Cretica five Santalus adulterina *J. B.* Pseudo-santalus Cretica, Abelicea dicta *Park.* Pseudo-santalum Creticum *C. B.* In montibus Leucis, eorúmque jugis altissimis.

B. Absinthium Ponticum Creticum grati odoris *C. B. prod.* In viridi saltem amaritudo nulla percipitur, unde ab Asinis, pecoribus, omnibúsque Brutis valde expetitur.

Acanus Theophrasti *Park. vid.* Agavanus Cretensium.

Acanthus spinosus in agris & juxta semitas frequens est *Bellon.*

Acetosa Cretica femine aculeato *C. B.* Mihi descriptiones utriusque conferenti eadem aliquando visa est cum Acetosa Neapolitana Ocimi folio *βυκεραληφόρω Col.* Verùm peritissimus Botanicus *D. Jacobus Breynius*, qui utrumque coluit, & observavit, nos erroris insinuat, & distinctæ species cùm sint, à me perperam confundi scribit; cui non repugno, cùm nec initio id fidenter, sed timidè affirmaverim.

Achlades *Bellon.* Pyri sylvestris genus.

Adrachnæ *Park.* Theophrasti *J. B.* Arbutus folio non serrato *C. B.* Adracla Græcis. In Creta, montibus Leucis, & alibi inter saxa.

Aga Cretensium *C. B.* i. e. Silybum minus Bæticum *Park.* Carduus lacteus peregrinus Camerarii *J. B.* albis maculis notatus exoticus *C. B.*

Agafuga *Bellon.* i. e. Pyra sylvestria Cretica.

Agavanus Cretensium i. e. Acanus Theophrasti *Park.* Agavanus Cret. fortè Acanys Theophr. *Hon. Belli* ep. 5 ad Clusium, & *Ponæ Ital.* Carduus latifolius echinos obsoletæ purpuræ ferens. *C. B.* Vulgaris est notitiæ in Creta.

Agrico-

- Agriocinara Cretica Pona Ital.* *Cinara Sylvestris Cretica C. B. Park.* *Carduus Agriocinara Cretensium*, ex quo *Costus niger Officinarum J. B.* *Agrioanzinari Cretensium Bello ep. 2.* ad Clusium. An *Cinara sylv. Batica Clus. cur. post?* *Supra Chisami arcem Bellon.*
- Agriomelea Bellonii*, quam in Cretæ montibus invenisse scribit, exiguorum malorum *Pyris* formâ similium feracem, an *Cotoneaster Gesn?* v. *Cat. gen.*
- Agriostari seu Frumentum sylvestre Creticum Pona Ital. Bell.*
- Althæa fruticosa Cretica Park.* *Frutex 3. Clus.* Hanc cum *Althæa frutescente Bryoniæ folio C. B.* s. frutescente folio acuto, flore parvo. *Althæa Olbiæ* perperam dicta, eandem putamus. *V. Cat. Sic.*
- Ammi Creticum Ger. Park.* *Creticum aromaticum Lob.* odore *Origani J. B.* Alterum semine *Apii C. B.* Semen ex *Alexandria Ægypti* adfertur.
- Anchusa humilis Alpin. exot.* *humilis Cretica Park.* In locis montosis & sylvis Cretæ.
- Anemone tenuifolia Cretica albo magno flore C. B. prod.*
- Anthyllis falcata Cretica Park.* *Tritolium falcatum Alpin. exot.*
- Anthyllis Alpin. exot.* In maritimis copiosè. Accedit ad *Anthyllidem à Clusio & J. Bauhino* descriptam.
- Arachyda aut Aracoides Honorii Belli, J. B.* *Cretica Park.* *Viciæ* similis, supra infrâque terram fructum ferens *C. B.*
- Archontoxylon i. e. Ebenus Cretica.*
- Arcturus Creticus Belli v. Blattaria pilosa Cretica.*
- Aristolochia polyrrhizos v. Pistolochia.*
- Aristolochia clematidis serpens C. B.* Reliqua *Synonyma v. in Cat. Hist.* *Arbores scandit Ephedræ aut Smilacis modo. Bellon.*
- Arundo graminea aculeata Alpin. exot.* In locis humidis supra terram serpit.
- Asclepias Cretica Clusii J. B. Park.* *Siliquâ bifido mucrone C. B.*
- Ascolimbros Bellonii* non est (ut puto) *Scolymus chrysanthemus* s. *Eryngium luteum Narbonensium*, sed *Carduus Siculus chrysanthemus* procerior caule eduli *Hist. nost. p. 258.*
- Ascyroides Cretica Alpin. exot.* *Cretica major Park.* Hanc plantam in *Hist. nost.* eandem putavimus cum *Androsæmo*

32 *Catalogus Stirpium Creticorum rariorum.*

mo Constantinopolitano flore maximo *Wheeler*; icon tamen non respondet, at neque descriptio: ut nunc muratâ sententiâ diversam suspicer.
Aspalathus secundus Creticus Alp. v. Cytisus.

B.

Blattaria pilosa Cretica sive *Arctos* quorundam *J. B.* *Verbascum humile Creticum laciniatum C. B.* *Verbasculum sylv. Creticum Alp. exot.* *Blattaria Cretica incana, rotundo laciniato folio Park.* *Arcturus Creticus Belli.* Provenit inter saxa & super parietes.

Blattaria Cretica spinosa Park. *Leucoium Creticum spinosum Clus. J. B.* *Creticum spinosum incanum luteum C. B.* *Spinosum Creticum Ger.* *Spinosum cruciatum Alp. Glastrivida Cretensium Belli.*

Borago Sylvestris annua Cretica Zanoni. *Buglossum procumbens annuum pullo minimo flore Moris. prælud.*

Borago muralis variegata, flore odorato Cretica Zanoni, *Buglossum Lusitanicum bullatis foliis Moris. prælud.* In muris urbis Candix ex ipsis petrarum fissuris exit.

Borago sylvestris Cretica flore rubro cremesino perennis, eadem videtur Echio Cretico latifolio rubro C. B.

Buglossum Creticum verrucosum, perlutum quibusdam Schol. Bot. seu Hort. Reg. Par. Tournefort.

Bryonia Cretica Pon. Ital. *Cretica dicoccos Park.* *Cretica maculata C. B.* *Alba maculata J. B.* In Creta frequens est.

Bupthalmum Creticum Cotulæ facie Breyn. Flore luteo & albo.

C.

Calamintha Cretica Cam. Folio & flore parvo incana *J. B.* *Incana Ocimi foliis C. B.* *Minor incana Park.* *Montana vulgaris Ger.* Ex semine è Creta misso Camerario fucevit. *Lobelius* tamen cautibus *Linguagotticis* calidarumque regionum innasce scriptum reliquit.

Calochiorni carduus Cretensibus J. B. *Atractyli & Cnico sylvestri similis C. B.* Fortè *Atractylis* major è cujus caulibus mulieres fusos efficiunt. *Atractylidi* vulgari similis, not tamen eadem. *Vid. Hist. nost. p. 304.*

Caloschirrida v. Echinus Creticus Alp.

Carduus

- Carduus pinea* Theophrasti *Alpin. exot.* pinea seu *Ixine* Theophrasti *Park.* *Chamæleon albus* gummi ut *mastix* ferens *Bell.*
- Carduus Eryngoides* capite spinoso *Alpin. exot.*
- Caryophyllus arborescens* Creticus *C. B.* *Sylvestris arboreus* *Alpin. exot.* Nostrâ sententiâ. *Betonica coronaria* arborea Cretica *J. B.* In montibus Cretæ oritur.
- Caucalis Cretensium & Græcorum* i.e. *Seseli Creticum.*
- Cerasus Alpina* Cretica. Seu *Idæa* *Alpin. exot.* *Vitis Idæa* Cretica elatior *Park.* *Agrifolii* folio. In monte Idæa Cretæ familiaris est. An *Agriomelea Bellonii*?
- Chamæcerasus Idæa* *Alp. ex.* *Vitis Idæa* Cretica humilior *Park.* In monte Ida nascitur.
- Chamæcistus* *Alpin. exot.* An *Chamæcistus Serpyllifolia* floribus carneis *C. B.*? *Serpylli* folio, flore carneo *J. B.*? *Clus.*?
- Chamædaphnoides* Cretica, seu *Laureola* Cretica humilis *Alp. exot.* *Chamædaphnoides* sive *Laureola* Cretica *Park.* In Cretæ montanis.
- Chamædryas* spinosa Cretica *Park.* Spinosa *C. B.* *J. B.* Ex horto Bembi Patavio accepit *C. B.*
- Chamægenista* Cretica *C. B.* *Park.* *Parkinsonus* pro *Spartio* Cretico *Alp. ex.* hanc habet.
- Chamæpeuce* *Plinii Anguillaræ* v. *Stœbe* fruticosa Cretica.
- Chamæpitys* fruticosa Cretica v. *Stœbe capitata* *Rosmarini* foliis *Ponæ.*
- Chrysocome* Cretica *Clus.* *Elichrysum* Creticum *C. B.* *Santolina* Cretica *Alpin.* Hanc plantam pro *Stœchade* citrina alteri inodora *Lobellii* affini capitulis brevioribus *J. B.* *Vid. Hist. nost. p. 282.* In montosis Cretæ.
- Cichoreum spinosum* Creticum *Park.* *Pon.* In maritimis, inque siccis collibus & arenosis locis. Hanc speciem in *Sicilia* observavimus. v. *Car. gen.*
- Cissampelos* ramosa Cretica *Park.* *Helxine Cissampelos* ramosa Cretica *Ponæ.* *Convolvuli* species.
- Cistus* *Ledon* Cretense *C. B.* *Led.* latifolium Creticum *J. B.* *Ladanifera* *Cypria* *Park.* Item *ladanifera* Cretica vera ejusdem. *Ledon* 4 *Clusii* *Ger.* Descriptionem *vid.* in *Alpin. exot.*
- Clinopodium* Creticum *Alpin. exot.* Per simile est, si odorem excipias *Acino* vulgari.
- Cneoron* album folio *Oleæ* argenteo molli *C. B.* v. *Convolvulus rectus* odoratus *Ponæ.*

34 *Catalogus Stirpium Creticorum rariorum.*

- Cnicus singularis* *Alpin. exot.* alter *Creticus* *Park.*
Colutea Scorpoides *Cretica* odorata. *Alpin. exot.*
Convolvulus ramosus incanus, foliis Pilosellæ *C. B.* *Helxine*
Cissampelos ramosa *Cretica* *Pon. Ital. Park.*
Coris legitima *Cretica* *Dioscoridis*, *Belli Ger. emac. Park.*
 Item *Coris Matthioli ejusdem* : Nos enim has non distinguimus. *C. Hypericoides* quorundam *J. B.* *Lutea* *C. B.* In colibus fœcundis copiosè.
Coronilla frutescens coronata glauco folio *Cretica*, flo. luteo odorato *Breyn. prod. 2.*
Cyanus arborefcens longifolia *Alpin. exot.* In motanis *Cretæ* nascitur.
Cyanus arborefcens altera, *Styracis* folio *Alpin. exot.*
Cyanus tomentosus *Alpin. exot.*
Cyanus lanuginosus spinosus *Creticus*, & *Cyanus* fruticosus *Creticus* v. *Stœbe* fruticosa *Cret.*
Cinara sylvestris *Cretica* *C. B. Park.* *Carduus Agriocinara* *Cretensium*, ex quo *Costus niger* *Officinarum* *J. B.* An *Cinara* sylv. *Bætica* *Clus. cur post.* Supra chisami arcem, &c. v. *Bellon.*
Cynoglossum *Creticum* secundum *clusii* *J. B.* *Creticum* alterum *Ger. Cret. latifolium* *Park.* *Latifolium fœtidum* *C. B.* *Cynoglossæ* alteri mediæ fructu cotylode sive *Lychniode* *Col.* Eadem videtur planta.
Cynoglossum *Creticum* angustifolium *Park.* *Creticum* argenteo angusto folio *C. B.* *Creticum* 1. *Ger.*
Cyperus rotundus odoratus *Creticus* *Cam. Park.*
Cytisus *Creticus*, *Aspalathus* secundus *Alpino* dictus. In loco *Fraschia* dicto propè *Cretam* urbem. *Aspalathus* 2. *Dioscoridis* *Bello* & aliis. *V. Cat. gen. Acacia trifolia.*

D.

- Daucus* *Creticus* *Ger.* *Creticus* verus *Dioscoridis* *Park.* Non videtur diversus à *Dauco* *Cretico* semine hirsuto *J. B.* Seu *Dauco* montano umbellâ candidâ *C. B.* *V. Hist. nost. p. 463.*
Daucus stellatus *Alpin. exot. Park.* Planta à *Dauco* longè diversa est.
Daucus tertius *Dioscoridis* *Bello* *Ponæ* *Park.* Tertius folio *Coriandri*, flore luteo *J. B.* *Creticus* nodosus umbellâ luteâ *C. B.*

Dictamnus

Catalogus Stirpium Creticorum rariorum. 35

Dictamnus Creticus C. B. *Park.* *Dict.* Cretica seu vera *J. B.*
Dictamnium Creticum Ger. In monte Ida ; in scopu-
 lorum fissuris, nec usquam alibi.

Dorycnium Creticum v. *Convolvulus rectus.*

Dorycnium Dioscoridis fortè *Ponæ Park.* *Jaccæ oleæ folio*
affinis C. B. Item *Cneoro albo affinis ejusdem.* Hujus
 semina è Creta ab Honorio Belli ad se missa *Lagochymicæ*
 nomine scribit C. Bauhinus in Pinace.

E.

Ebenus Cretica Alpin. exot. *Cytisus Creticus incanus* five
Ebenus Cretica Belli Park. C. B. Barba Jovis lagopo-
 doides Cretica frutescens incana, flore spicato purpureo
 amplo *Breyn.*

Echinopoda Cretensibus J. B. *Echinop. frutex Creticus*
Park. *Genistaspartium spinosum aphyllum*, tribus acu-
 leis semper junctis, floribus luteis C. B.

Echinus Creticus Park. *Echinus* seu *Tragacantha* alia hu-
 milior & spinosior *Alpin. exot.* Græci *Caloschirrhida*
 vocant.

Echium Creticum latifolium rubrum C. B. *Park.* An
Echium Candix flore pulchre rubente *J. B?* *V. Cat. gen.*

Echium Creticum Alp. exot. *Creticum album Park.* *Echi-*
um pumilum flore luteo C. B. *Park.* h. e. *Echium flavo*
 flore *Clus. cur. post.* huic idem videtur.

Echium nigro flore eleganti *Alp. exot.* *Creticum nigrum*
Park.

Echium Creticum angustifolium rubrum C. B. *Park.* *Cre-*
ticum 2. Clus. Habetz & in Sicilia. *Cat. Gen.*

Equisetum montanum Creticum Park. *Alpin. exot.* In
 montanis Cretæ. Flores fert circa virgarum geniculos,
 quo ab *Equisetis* differt. Tragi five *Uvæ marinæ* spe-
 cies est.

Eruca maritima Cretica filiquâ articulatâ C. B. E Creta Ho-
 norius Belli misit.

Eryngium trifolium Alpin. exot. Park. In locis asperis.

Erysimum Dioscoridis Zanoni *Erysimi annui Creticæ* no-
 mine missum.

F.

- Fœnum Græcum* sylvestre polyceration majus Creticum
Breyn. Cent.
Frutex pulcherrimus Belli i. *Stœbe fruticosa latifolia* Cre-
tica.
Fumaria major Cretica Park. Altera tenuior *Syriaca Cam.*
minor folio oblongo capillaceo *C. B.* *Capnos Cretica Clus.*
An *Fumaria nostra major scandens*?

G.

- Gaiderothymum v. Stachys spinosa* Cretica.
Galactivida Cretensium prima v. Blattaria spinosa.
— Altera *v. Tithymalus marit. spinosus.*
Gallium montanum Creticum Alpin. exot. Park. In mon-
tanis Cretæ abundat.
Genista arborea Cretica, foliis semper virentibus Zanoni.

H.

- Habbures Cam. i. e. Leontopodium Creticum aliud.*
Hedysarum argenteum, Alpin. exot. argenteum Creticum
Park.
Hieracium majus Creticum Park. Majus folio *Sonchi*, fe-
mine curvo *C. B.* Item *Sonchus asper laciniatus Creti-*
cus ejusdem. *Chondrillæ Creticæ nomine missa, fe-*
mine crispo J. B. *Sonchus Creticus foliis laciniatis*
vulgò.
Hieracium parvum Creticum Park. Clus. Minor flore ex
albo carneo *C. B.* *Intybaceum, non ramosum Pona.*
Hieranzune Cretensium est Lotopisum Belli. v. Cat. gen.
Hippomarathrum Creticum C. B. prod. Park. *Daucus*
3 Creticus, aliis Sefeli nodosum & Hippomarathrum
Ponæ. Ital. Κρυόπος vulgo, i. e. Pedes corvini. Fœni-
culum magnum five Hippomarathrum J. B. Libanotis
cacryoph. sem. sulcato aspero Moris. Hist.

Holosteum

Catalogus Stirpium Creticarum rariorum. 37

Holosteum sive Leontopodium Creticum C. B. Park. Ger.

Leontopodium Cretense Clus.

Holosteum *Alpin. exot.* quod ab Holosteio Salmanticensi Clusii differre contendit. Plantago angustifolia minor lanuginosa Cretica vel Syriaca, pediculis & capitulis maturitate ad terram inflexis *Breyn. prod. 2.*

Horminum comâ rubrâ *J. B.* vulgo Horm. Creticum.

Horminum minus supinum Creticum *Clus. C. B. Park.*

Hyoscyamus Creticus luteus major C. B. Luteus minor *J. B.* Creticus *Park.* Creticus alter *Clus.* Hæc species in Italia & Gallia Narbonensi occurrit. *v. Cat. gen.*

Hyoscyamus aureus *Alp. exot.* Creticus luteus minor C. B. 4. f. albus Creticus *Clus.* Albus Creticus *Ger. emac.*

Hyssopus Græcorum *Alpin. exot.* An Hyssopus Origani folio *Dalech. J. B. ?*

I.

Jacea incana Cretica, flore luteo medio purpureo, squamis in molliores spinas abeuntibus *Herman. Hort. Lugd. Bat.*

Jacea Cretica *Park.* laciniata squammata C. B. Squammata Cretica, quibusdam Scabiosa Cretica dicta *J. B.*

L.

Lachryma *Jobi* Sesamum annuum *Zanon,* in Creta copios.

Lagochymica Cretensium est Dorycnium Dioscoridis *Ponæ.*

Bellonius Heliochryson vulgò *Lagochymithia* dictum scribit, quòd leporibus cubilia grata præbeat.

Lamium fruticosum non maculatum Creticum *Zanon.*

Laurus Sylvestris Cretica *Alpin. exot. Park.*

Lazegiri Cretensium i. e. Lycium Creticum alterum.

Leontopetalon crassa radice *Bellon.* In Ida monte hyeme floret.

Leontopodium Creticum *Clus. v. Holosteum.*

Leucoium Creticum Thlaspiifolium C. B. Marinum Creticum majus *Park.* Marinum Creticum 1. *Clus.*

Leucoium Creticum floribus minoribus C. B. Creticum minus *Park.* Marinum Creticum 2. *Clus.*

38 *Catalogus Stirpium Creticorum variorum.*

- Leucoium Creticum* foliis oblongis crenatis *C. B.* *Creticum* oblongis foliis crenatis *Park.* *Creticum* 3. *Clusf.*
Leucoium Creticum minimum folio subrotundo *C. B.* *Creticum* caeruleum marinum *Alpin. exot. Park.*
Leucoium album odoratissimum folio viridi *C. B. prod.*
Leucoium Creticum luteum utriculato semine *Alp. exot. Park.*
Leucoium spinosum Creticum Clusf. Est *Blattaria spinosa* seu *Glastrivida*.
Libanotis Apii folio semine aspero *C. B.* *Theophrasti Apii* folio *Cretica Park.* *Rosmarinis* foliis *Selino* similibus *Bell.*
Linaria Cretica latifolia major Clusf. Park. *Latifolia tryphilla* major *C. B.*
Linaria Cretica angustifolia Clusf. Park. *Quadrifolia*, exiguis flosculis cinereis *C. B.*
Linaria perennis fruticosa Cretica C. B. prod. Cui & *Linaria latifolia Dalmatica* magno flore dicitur.
Linum arboreum Alpini exot. *Arboreum Creticum luteum Park.*
Lotus πολυκέφαλος *Cretica* fruticosa argentea, Siliquis longissimis propendentibus rectis *Morif. Hist.*
Lotopisum Belli i. *Lotus* edulis *Creticus v. Cat. gen.*
Lutea maxima Cretica Honor. Belli J. B. *Luteola* herba folio *Cannabino C. B.* *Maxima Cretica* fecunda & sterilis *Park.* *Cannabis lutea* fertilis & sterilis. *Contareni Alpin. exot.* Inter montes in *Aquis* nascitur, loco quodam *Ὀπίσσω* dicto, tertio ab urbe *Cydonia* lapide *Bell.*
Lychnis Cretica angustifolia Park. *Hirsuta angustifolia Cret. C. B.* *Ocymoides* flore rubro minus *Creticum J. B. sylv. 7. Clusf.*
Lychnis Auricula urfi facie *C. B.* *Sylv. latifolia Clusii* sive *Muscipula Cretica Auriculæ urfi* facie *J. B. Sylv. latifolia Clusii Ger. emac.*
Lychnis viscaria maxima Cretica Alpini. *Viscaria maxima Cretica Alpini Park.*
Lycium Cretense sive *Berberis Cretica J. B.* *Creticum primum Belli Park.* *Berberis Alpina Cretica C. B.* *Lycium Creticum* s. *Berberis Alpina Belli Bon.* In montium altissimorum convallibus.
Lycium Creticum alterum Park. *Λαζυγία & Πέλο-αμύγδαλα* i. e. *Amygdala Petrea*, licet cum *Amygdalis* nullo commune habeat *Bell. Ep. 1.*

M.

- Majorana** Cretica vel Syriaca *C. B.* Marum Creticum *Alp. exot.* Syriacum *A. Lob. Ger.* Syriacum vel Creticum *Park.*
- Mandragora** mas & foemina *Bellon.* In monte Ida quæ quamvis in Hispania etiam & Italia sponte proveniant, quia tamen rariores sunt omittere nolui. vid. *Cat. Hispan.*
- Marrubium** Creticum *Ger. Park.* Album angustifolium peregrinum *C. B.* Album angustiore folio *J. B.*
- Marrubium** Creticum angustifolium inodorum *Park.* Album peregrinum brevibus & obtusis foliis *C. B.*
- Marrubium** nigrum Creticum *Alp. exot. Park.* Planta Alpino descripta imperfecta erat, absque flore & semine.
- Melilotus** quædam Cretica *Alpin. exot.* Est Lotus Siliquis singularibus vel binis tenuis *J. B.*
- Melilotus** vesicaria Cretica *Hort. Altdorf.*
- Meum** alexiterium Creticum *Park. Alpin. exot.*
- Millefolium** Creticum *J. B.* Incanum Creticum *C. B. Park.* Stratiotes Millefolia *Belli ep. 2.* ad Clusium *Alpin. exot.* Parkinsonus ex hac planta duas facit: priorem Millefolium incanum Creticum vocat, posteriorem Stratioten Millefoliam Creticam.
- Muscipula** Cretica &c. v. *Lychnis.*
- Myrrhis** sylv. Cretica nodosa, seminibus asperis annua, semine striato aspero oblongo, nodosa *Morif.*

N.

- Napus** Sylvestris Cretica *Park. C. B.* Bunias agrestis *Belli*, qui ad *C. Bauhinum* è Creta misit.
- Nardus** montana Cretica *Alpin. exot.* An *Valeriana* Cretica tuberosa *Park?* *Nardus* Cretica *Belli.* Cretica *Filipendulæ* radice *C. B?* *Nardus* tamen Cretica *Belli* diversa videtur à *Nardo* montana Cretica *Alpini.*
- Nigella** Cretica *C. B.* *Melanthium* simplici flore Creticum *Clus.* *Nigella* Cretica inodoro semine *Park.*

40 *Catalogus Stirpium Creticarum rariorum.*

Nigella Cretica latifolia odorata *Park. Pona Ital.* Alba simplici flore *Alpin. exot.*

Nigella Cretica altera tenuifolia odorata *Park.* Cretica folio *Fœniculi C. B.*

Nigella Cretica odorata, foliis Lini, seminibus biformibus *Park.* Male inscribitur *Nigella.* *Melanthium* odoratum *Alpin. exot.*

O.

Oenanthe stellata Cretica *Alpin. exot. Park.*

Oenanthe Cretica prolifera *Park.* *Apula* prolifera *C. B.*

Oleander Creticus fruticosus major foetidus *Zanon.*

Origanum Creticum *J. B. Ger.* *Sylvestre Syriacum Lob.* *O-nites C. B. Matth.*

Ornithogalum Creticum & *Pannonicum* flore albo *J. B.*

P.

Pæonia duo genera candida flore *Beñon.* *Græcis Psiphædile.*
In omnibus humidis vallibus montis *Idæ.*

Pastinaca tenuifolia Cretica, radiis umbellæ *Gingidii* longioribus *Morif.*

Petromarula Cretica i. e. *Rapunculus* Creticus.

Petroselinum Creticum *C. B. Park.* *Agriopastinaca* vulgò in *Creta Bello* ep. 5. ad *Clusium*, cui *Busefinon* *Plinii* videtur. In montibus *Cretæ* & *Dalmatiæ.* Duplex genus est, radice nigra, & rad. ruffa.

Phyllitis alata five ramosa *Alpini* an & quomodo ab *Hemionitide* multifida differat inquirendum *Alpini* icon plantam distinctam repræsentare videtur: & *Jac. Breynius* longè diversam esse ait.

Pistolochia Cretica *C. B.* Cretica semper virens *Par.* *Aristolochia* *Pistolochia* altera *J. B.* Diversa est à *Pistolochia Virginiana.* *Polyrrhizos* dicta, ex accurata observatione & descriptione ad me missa incomparabilis *Botanici D. Joan. Banister,* tristissimo casu nuper in *Virginia* rebus humanis erepti.

Polium

Catalogus Stirpium Creticarum rariorum. 41

- Polium latifolium incanum Creticum* *C. B. Park.* Ad *Polium montanum luteum* vulgare proximè accedere videtur Circa *Cydoniam urbem*.
- Polium angustifolium Creticum* *C. B. Park.* Erectum Creticum & fortè frutescens *Dioscoridis Ponæ.* In *Creta* ad maris littora frequens.
- Polium gnaphaloides Alpin. exot. Park.* *Gnaphalii marini* species est. In maritimis *Cretæ.* *Gnaphalium marinum Clusii* esse pernegat.
- Polygonum Creticum Thymi folio* *C. B. Park.* Non multum abludivit à *Polygono nostrate parvo,* flore albo verticillato.
- Pimpinella spinosa Park.* *Poterio* affinis folio, *Pimpinella spinosa C. B.* *Poterium* quibusdam, sive *Pimpinella spinosa J. B.* *Poterion Lobelii* sive *Pimpinella spinosa Camerarii Ger.* Stæbe legitima *Dioscoridis Bello.* In *Creta* perpetuo viret, & multos annos durat.
- Poterium Alpini.* *Tragacanthæ* species multis *Cretæ Insulæ* in locis invenitur.
- Pseudostachys Cretica v. Stachys.*
- Pseudocistus Ledum Alpin. exot. 1. Park.*
- Pseudocistus Ledon alterum Alpin. exot. 2. Park.*
- Pseudodictamnus Cydoniæ* seu *Pl. 2. Theophrasti Ponæ i. e.*
- Pseudod. acetabulis Mollucæ C. B.*

R.

- Ranunculus echinatus Creticus Park.* *Stellatus echinatus Creticus C. B.* *Creticus echinatus latifolius Alpin. exot.*
- Ranunculus Creticus albo flore,* majore quam *Papaveris Rhœados J. B.*
- Ranunculus Creticus latifolius Clus. Park. Ger. Emac.* *Asphodeli radice Creticus C. B.*
- Ranunculus Creticus grumosa radice,* flore niveo *Clus. Grumosa radice,* flore niveo *C. B.*
- Ranunculus Creticus seu Pyramidalis alter C. B.* *Creticus Petromarula J. B.* *Petrom. Cretica* sive *Ranunculus Creticus Park.* *Petromarula* s. *Lactuca petræa Pon. Ital. Bell.*
- Rosmarinus Selini folio Bell. v. Libanotis &c.*

Rosma-

42 *Catalogus Stirpium Creticorum variorum.*

Rosmarinum Stæchadis facie *Alpin. exot.* Potius Euphrasia Stæchadis facie.

Rubia argentea Cretica *Alpin. exot. Park.* Cruciata argentea.

Rubia arborefcens Cretica *Alpin. exot.* Lævis arborefcens Cretica *Park.* An & quomodo à Rubia Sylvatica lævi *J. B.* differat inquirendum.

S.

Salvia Cretica pomifera *Clus. Ger.* Baccifera *C. B.* Gallifera *J. B.* Major Cretica latifolia & angustifolia, aurita & non aurita, pomifera & non pomifera, nam specie conveniunt, Bellonius poma hæc efui apta effe fcribit, eaque rusticos legere folere, iisque plenos Saccos in proximas urbes venum deferre: quod mirum, cum nihil aliud sint quàm Gallæ, feu morbofi tumores ab Insectis excitati *Park.*

C. Salvia Cretica angustifolia *Clus.* Tenuifolia *J. B.* Angustif. ferrata *C. B.* Angustif. non aurita *Park.* Semine è Creta accepto nata est.

Sandalida Cretica est Lotus filiquis quadripinnat. in *Catal. general.*

Santolina Cretica *Alpini v. Chrysocome.*

Satureia Cretica *C. B. Ger. emac.* Cretica legitima *Park.* Thymbra Græca *J. B.* Hoc genus Alpinus Tragoriganum effe contendit, non Thymbram, cujus rationes vide.

Satureia Cretica spinosa *Ponæ.*

Saxifraga Cretica prior *Park.* Saxifraga *Alpin. exot.*

Saxiphraga altera *Alpin. exot.* Cretica altera *Park.*

Scabiosa arborea *Alpin. exot.* Arborea Cretica *Pon.* Peregrina *Ger.* Fruticosa, folio non diffecto peregrina *J. B.* Stellata folio non diffecto *C. B.*

Scammonea macrorrhizos *Alpin. exot.*

Scandix Cretica major *C. B. prod. Park.* Pecten veneris Creticum. *J. B.*

Scordium alterum languinosum verticillatum *C. B.* Scordotis Plinii primi *Park. Ponæ.* Tomentosa Cretica *J. B.*

Scordotis Cretica *C. B. prod.* Altera Plinii *Ponæ. Ital. Park.* Scordotis *Alpin. exot.*

Scrophularia Cretica 1. *Clus.* Cretica latifolia *Park.* Indica *Ger.* Foliis Filicis modo laciniatis, vel Ruta canina latifolia *C. B.* Sefeli

- Seseli Creticum majus C. B. Ger. Creticum, five Tordylium majus Park. An Caucalis Lusitanica Alpin. exot.
- Seseli Creticum minus v. Cat. gen.
- Seseli Cretense nodosum Park. Myrrhis Sylvestris Cretica nodosa, seminibus asperis Hist. nost. p. 432.
- Sideritis viscosa Cretica bitumen redolens Zanoni. Glutinosissima bitumen redolens Moris. prælud.
- C. Siler Creticum quibusdam, foliis Cicutæ, semine longo crispo J. B. Sil. 2. foliis Cicutæ C. B.
- Solanum somniferum Antiquorum Alp. exot. Somniferum Antiquorum verum Park. Item Solanum somniferum Park. Verticillatum J. B. Somniferum verticillatum C. B. In Cretæ locis Maritimis.
- Spartium Creticum Alpin. exot. Park.
- Spartium spinosum Creticum Alpin. exot. Park.
- Spartium spinosum secundum Alpin. exot. Spinosum aliud Creticum Park.
- Spica trifolia Cretica Alpin. exot.
- Stachys Cretica major seu latifolia Hort. Reg. Par. Tournefort. Catal.
- Stachys Cretica C. B. Stachys five Pseudostachys Cretica Park. C. B. prod.
- Stachys spinosa Park. Spinosa Cretica C. B. Ger. Spinosa J. B. Gaidarothymo i. e. Asininum Thymum rusticis Cretensibus.
- Staphis agria in monte Ida passim sponte provenit Bellon. v. Cat. gen.
- Stoebe fruticosa latifolia Cretica Park. Frutex rotundo argenteo folio, Cyani flore C. B. Cyanus fruticosus Creticus Candia Pona Ital. Frutex pulcherrimus Bello ep. 2. ad Clus.
- Stoebe spinosa Cretica Park. Spinosa J. B. Spinosa maritima C. B. Cyanus spinosus Creticus Pona & Alpin.
- Stoebe angustifolia Cretica i. Stoebe capitata Rosmarini foliis Pona. Forte Chamæpucæ Alpin. exot. Chamæpitys fruticosa Cretica Belli. Jacea fruticens Pini folio C. B.
- Stoebe Plantaginis folio Alpin. Park.
- Stratiotes Millefolia Cretica Alpin. v. Millefolium.

T.

Teucrium Creticum Clus. Park. J. B. Creticum incanum C. B. Ex semine à Creta misso chamædryos majoris appellatione Clusio enatum est.

Thlaspi Creticum umbellatum flore albo odorato Park. Umbellatum Creticum flore albo odore minus C. B. Parvum umbellatum flore niveo odorato J. B.

Thlaspi clypeatum arborescens Creticum Alpin. exot. Park. Qu. An non idem sit cum *Thlaspi fruticoso* altero Lob. aut fruticoso folio *Leucoii marini minoris J. B.*

Thymbra v. Satureia.

Thymbra Alp. exot. Cretica vera Alpino *Park.*

Tithymalus cyparissius Creticus Alpin. exot.

Tithymalus arboreus Alpin. Dendroides ex codice Cæsareo *Lugd. Dod.* In hort. Reg. Paris. colitur, & pro distincta à *Tithymalo* Dendroide *Matthioli* specie in *Schol. Bot. Par.* ponitur.

Tithymalus maritimus spinosus C. B. Maritimus Creticus spinosus *Park.* An *Tithymalus spinosus Creticus Alpin?*

Tragacantha altera seu *Poterium* densius ramificatum *Alpin. exot.*

Tragacantha humilior floribus luteis C. B. *Tragacantha Alpin. exot.*

Tragacantha Cretensis aut *Idæa nigra*, tota echinata *Morif.* *Tragacantha altera Alpin. exot.*

Tragacantha humilior & spinosior v. Echinus.

Tragacantha, quarta seu *Spartium spinosum alterum Alpin. exot.* Nec flores nec fructum hujus planta vidit *Alpinus*, proinde ad quod genus referenda sit certò nequit definiri.

Tragoriganum Creticum C. B. Park. Cretense *Ger.* quibusdam nigrius folio duro, flore purpureo *J. B.*

Trifolium spinosum Creticum C. B. Clus. Park. Ger. emac. *Aculeatum Creticum J. B.* Ὀξυτόκροτο Cretensibus *Bell.*

Trifolium peltatum Creticum C. B. J. B. Odoratum peltatum Creticum *Park.* Rusticis Cretensibus *Μαορσελας Bell.*

Trifolium

Trifolium falcatum Creticum *Alpin. exot.* *Anthyllis falcata* Cretica *Park.*

V.

Valeriana Cretica tuberosa *Park.* *Nardus montana* Cretica
Alpin. exot. *Nardus* Cretica *Belli. q. v. Nardus.*
Viscaria Cretica maxima *Alpini v. Lychnis.*

F I N I S.
